

2011. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid

osales 756 nimistut

SVH ennetuse riskigrupi isikud:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2011
40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel määratud glükoos	SVH2	sihtrühmas isikuid	659	65%
		hõlmatud isikuid	430	
40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid	SVH3	sihtrühmas isikuid	651	56%
		hõlmatud isikuid	367	
Pereõe nõustamine 40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel	SVH4	sihtrühmas isikuid	655	62%
		hõlmatud isikuid	404	

II tüüpi diabeedi haiged:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2011
Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin	DIAB2	sihtrühmas isikuid	54 223	69%
		hõlmatud isikuid	37 673	
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis	DIAB3	sihtrühmas isikuid	54 305	70%
		hõlmatud isikuid	38 261	
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool	DIAB4	sihtrühmas isikuid	54 213	72%
		hõlmatud isikuid	38 997	
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul	DIAB5	sihtrühmas isikuid	55 191	85%
		hõlmatud isikuid	46 921	
Diabeet II haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs	DIAB6	sihtrühmas isikuid	43 474	44%
		hõlmatud isikuid	19 234	
Pereõe nõustamine	DIAB7	sihtrühmas isikuid	54 256	66%
		hõlmatud isikuid	35 559	

Hüpertooniatõve haiged:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2011
Madala riskiga haigetel: Glükoos üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-2	sihtrühmas isikuid	92 352	79%
		hõlmatud isikuid	72 857	
Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-3	sihtrühmas isikuid	100 820	79%
		hõlmatud isikuid	79 750	
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-4	sihtrühmas isikuid	100 357	68%
		hõlmatud isikuid	68 439	
Pereõe nõustamine	HYP1-5	sihtrühmas isikuid	99 026	53%
		hõlmatud isikuid	52 517	
Keskmise lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP2-6	sihtrühmas isikuid	146 538	66%
		hõlmatud isikuid	96 284	
Kolesterooli fraktsioonid	HYP2-7	sihtrühmas isikuid	146 365	60%
		hõlmatud isikuid	88 055	
Glükoos	HYP2-8	sihtrühmas isikuid	120 783	64%
		hõlmatud isikuid	77 815	
Kreatiniin	HYP2-9	sihtrühmas isikuid	146 697	64%
		hõlmatud isikuid	93 350	
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP2-10	sihtrühmas isikuid	148 272	75%
		hõlmatud isikuid	111 679	
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga	HYP2-11	sihtrühmas isikuid	134 115	37%
		hõlmatud isikuid	49 959	
Kõrge või ülikõrge lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP3-12	sihtrühmas isikuid	36 639	70%
		hõlmatud isikuid	25 787	
Kolesterooli fraktsioonid	HYP3-13	sihtrühmas isikuid	36 572	65%
		hõlmatud isikuid	23 644	
Glükoos	HYP3-14	sihtrühmas isikuid	23 913	69%
		hõlmatud isikuid	16 433	
Kreatiniin	HYP3-15	sihtrühmas isikuid	36 715	69%
		hõlmatud isikuid	25 314	
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga	HYP3-16	sihtrühmas isikuid	29 449	41%
		hõlmatud isikuid	11 939	

Infarkti läbi teinud haiged:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2011
Määratud üldkolesterool	INF2	sihtrühmas isikuid	16 136	74%
		hõlmatud isikuid	11 906	
Määratud glükoos	INF3	sihtrühmas isikuid	12 382	73%
		hõlmatud isikuid	9 043	

Hüpotüreooosi haiged:	indikaator		isikuid	hõlmatus 2011
Määratud TSH	E03-2	sihtrühmas isikuid	32 494	69%
		hõlmatud isikuid	22 356	