

**2009. a lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised protsendid**  
osales 678 nimistut

<b>SVH ennetuse riskigrupi isikud:</b>	indikaator		isikuid	hõlmatus 2009
40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel määratud glükoos	SVH2	sihtrühmas isikuid	479	79%
		hõlmatud isikuid	380	
40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid	SVH3	sihtrühmas isikuid	481	73%
		hõlmatud isikuid	350	
Pereõe nõustamine 40-60aastastel riskigrupi kuuluvatel isikutel	SVH4	sihtrühmas isikuid	481	72%
		hõlmatud isikuid	347	

<b>II tüüpi diabeedi haiged:</b>	indikaator		isikuid	hõlmatus 2009
Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin	DIAB2	sihtrühmas isikuid	31 372	70%
		hõlmatud isikuid	21 809	
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis	DIAB3	sihtrühmas isikuid	31 381	69%
		hõlmatud isikuid	21 559	
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool	DIAB4	sihtrühmas isikuid	31 322	71%
		hõlmatud isikuid	22 115	
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul	DIAB5	sihtrühmas isikuid	31 766	86%
		hõlmatud isikuid	27 418	
Diabeet II haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs	DIAB6	sihtrühmas isikuid	31 144	43%
		hõlmatud isikuid	13 254	
Pereõe nõustamine	DIAB7	sihtrühmas isikuid	31 306	62%
		hõlmatud isikuid	19 432	

<b>Hüpertooniatõve haiged:</b>	indikaator		isikuid	hõlmatus 2009
Madala riskiga haigetel: Glükoos üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-2	sihtrühmas isikuid	47 242	86%
		hõlmatud isikuid	40 415	
Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-3	sihtrühmas isikuid	50 734	87%
		hõlmatud isikuid	44 156	
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP1-4	sihtrühmas isikuid	50 741	79%
		hõlmatud isikuid	40 000	
Pereõe nõustamine	HYP1-5	sihtrühmas isikuid	50 138	57%
		hõlmatud isikuid	28 576	
Keskmise lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP2-6	sihtrühmas isikuid	103 868	62%
		hõlmatud isikuid	64 132	
Kolesterooli fraktsioonid	HYP2-7	sihtrühmas isikuid	103 773	55%
		hõlmatud isikuid	56 753	
Glükoos	HYP2-8	sihtrühmas isikuid	88 448	61%
		hõlmatud isikuid	53 783	
Kreatiniin	HYP2-9	sihtrühmas isikuid	103 973	58%
		hõlmatud isikuid	60 398	
EKG üks kord kolme aasta jooksul	HYP2-10	sihtrühmas isikuid	105 148	78%
		hõlmatud isikuid	82 417	
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga	HYP2-11	sihtrühmas isikuid	103 443	33%
		hõlmatud isikuid	33 838	
Kõrge või ülikõrge lisariskiga haigetel: Üldkolesterool	HYP3-12	sihtrühmas isikuid	21 526	69%
		hõlmatud isikuid	14 770	
Kolesterooli fraktsioonid	HYP3-13	sihtrühmas isikuid	21 517	63%
		hõlmatud isikuid	13 629	
Glükoos	HYP3-14	sihtrühmas isikuid	14 892	67%
		hõlmatud isikuid	9 971	
Kreatiniin	HYP3-15	sihtrühmas isikuid	21 584	67%
		hõlmatud isikuid	14 450	
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga	HYP3-16	sihtrühmas isikuid	21 381	39%
		hõlmatud isikuid	8 441	

<b>Infarkti läbi teinud haiged:</b>	indikaator		isikuid	hõlmatus 2009
Määratud üldkolesterool	INF2	sihtrühmas isikuid	8 988	71%
		hõlmatud isikuid	6 386	
Määratud glükoos	INF3	sihtrühmas isikuid	7 259	69%
		hõlmatud isikuid	4 976	

<b>Hüpotüreooosi haiged:</b>	indikaator		isikuid	hõlmatus 2009
Määratud TSH	E03-2	sihtrühmas isikuid	15 338	63%
		hõlmatud isikuid	9 708	