

2008. aastal lisatasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmised hõlmatused

II -tüüpi diabeet

Loetelu II tüüpi diabeedi (E11) haigetest esitatud	loetelu esitanud nimistuid	636
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	48
Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin; 66118	isikuid	27 351
	hõlmatusid	16 710
2008.a. nõutav hõlmatus 56%	hõlmatus	61%
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis; 66102	isikuid	27 364
	hõlmatusid	16 926
2008.a. nõutav hõlmatus 59%	hõlmatus	62%
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool; 66104	isikuid	27 336
	hõlmatusid	17 878
2008.a. nõutav hõlmatus 65%	hõlmatus	65%
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid 1 kord 3 aasta jooksul; 66105 (6503f)	isikuid	27 505
	hõlmatusid	19 632
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	hõlmatus	71%
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs; 66117 või 66207	isikuid	27 291
	hõlmatusid	14 822
2008.a. nõutav hõlmatus 46%	hõlmatus	54%
Pereõe nõustamine; 9015	isikuid	27 329
	hõlmatusid	14 448
2008.a. nõutav hõlmatus 50%	hõlmatus	53%

Hüpertooniatõbi

Loetelu hüpertooniatõve (I10-I15) haigetest esitatud	loetelu esitanud nimistuid	642
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	41
<u>1.astme hüpertooniatõvehaiged</u>	loetelu esitanud nimistuid	632
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	90
Glükoos 1 kord 3 aasta jooksul; 66101 (6500b)	isikuid	53 417
	hõlmatusid	42 528
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	hõlmatus	80%
Üldkolesterool 1 kord 3 aasta jooksul; 66104 (6501f)	isikuid	53 334
	hõlmatusid	42 135
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	hõlmatus	79%
EKG 1 kord 3 aasta jooksul; 6320 või 6322 või 6323	isikuid	53 238
	hõlmatusid	36 313
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	hõlmatus	68%
Pereõe nõustamine; 9015	isikuid	52 816
	hõlmatusid	24 790
2008.a. nõutav hõlmatus 50%	hõlmatus	47%
<u>2.astme hüpertooniatõvehaiged</u>	loetelu esitanud nimistuid	633
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	81
Üldkolesterool ; 66104	isikuid	101 407
	hõlmatusid	56 896
2008.a. nõutav hõlmatus 59%	hõlmatus	56%
Kolesterooli fraktsioonid ; 66105	isikuid	101 251
	hõlmatusid	47 451
2008.a. nõutav hõlmatus 48%	hõlmatus	47%
Glükoos ; 66101	isikuid	101 596
	hõlmatusid	58 800
2008.a. nõutav hõlmatus 62%	hõlmatus	58%
Kreatiniin; 66102	isikuid	101 442
	hõlmatusid	51 743
2008.a. nõutav hõlmatus 52%	hõlmatus	51%
EKG 1 kord 3 aasta jooksul; 6320 või 6322 või 6323	isikuid	102 325
	hõlmatusid	70 659
2008.a. nõutav hõlmatus 80%	hõlmatus	69%
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs; 66117 või 66207	isikuid	101 291
	hõlmatusid	44 221
2008.a. nõutav hõlmatus 48%	hõlmatus	44%

<u>3.astme hüpertooniatõvehaiged</u>	loetelu esitanud nimistuid	558
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	89
Üldkolesterool ; 66104	isikuid	9 859
	hõlmatuid	5 768
2008.a. nõutav hõlmatus 60%	hõlmatus	59%
Kolesterooli fraktsioonid ; 66105	isikuid	9 828
	hõlmatuid	4 892
2008.a. nõutav hõlmatus 52%	hõlmatus	50%
Glükoos ; 66101	isikuid	9 907
	hõlmatuid	6 112
2008.a. nõutav hõlmatus 67%	hõlmatus	62%
Kreatiniin; 66102	isikuid	9 865
	hõlmatuid	5 408
2008.a. nõutav hõlmatus 56%	hõlmatus	55%
EKG; 6320 või 6322 või 6323	isikuid	9 827
	hõlmatuid	4 652
2008.a. nõutav hõlmatus 52%	hõlmatus	47%
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs; 66117 või 66207	isikuid	9 834
	hõlmatuid	4 473
2008.a. nõutav hõlmatus 42%	hõlmatus	45%

Infarkt

Müokardi infarkti (I21, I22, I23, I25.2) läbiteinute loetelu olemas	loetelu esitanud nimistuid	575
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	79
	isikuid	7 786

Hüpotüreos

Hüpotüreosi (E03) diagnoosiga haigete loetelu olemas	loetelu esitanud nimistuid	620
	sh nimistuid koef-ga 1,5*	72
	isikuid	11 810

*perearstile, kelle nimistus on vastava kroonilise haigusega patsiente 2x enam kui Eesti keskmine, arvestatakse nimetatud kroonilise haiguse osa punktid koefitsiendiga 1,5, kuid mitte üle nimetatud tervishoiuteenuse piirhinna