

COVID-19 HAIGESTUMISE KODEERIMINE JA NAKKUSHAIGE TEATIS

NB! Perearstisüsteemi programmides pole eraldi põhidiagnoosi ja kaasuva diagnoosi valimise võimalust. Põhidiagnoosiks arvestatakse esimesele reale sisestatud diagnoosi ning kaasuvateks järgnevalt sisestatud.

U07.1 COVID-19, laboratoorselt kinnitatud

U07.2 COVID-19, laboratoorselt kinnitamata

Märkige ainult kaasuva diagnoosina.

- **Kasutage U07.1 koodi ainult siis, kui COVID-19 haigus on laboratoorselt kinnitatud.**
 - Sümptomite olemasolul kasutage U07.1 kaasuva diagnoosina, põhidiagnoos märkige **vastavalt sümptomitele, nt J06.9; J12.8 vm.**
 - Kui haigus on laboratoorselt kinnitatud ja sümptomid puuduvad, märkige põhidiagnoosiks **Z22.8.**
- **Kasutage U07.2 koodi, kui COVID-19 viirusele pole laboratoorselt kinnitust või kui laboratoorselt testi pole võimalik teha, aga on selge kliiniline pilt ja/või epidemioloogiline kahtlus, sh võimalik kokkupuude.**
 - Kasutage U07.2 kaasuva diagnoosina, märkides põhidiagnoosi **vastavalt sümptomitele, nt J06.9; J12.8 vm.**
- **Koduse isolatsiooni määramisel, kui inimese lähikontaktne on kinnitatud COVID-19 haigusega, kasutage põhidiagnoosina koodi Z29.9 (Täpsustamata profülaktikameede) ja kaasuvaks märkige koodi U07.2 (COVID-19, laboratoorselt kinnitamata).**

Nakkushaige teatise koostamine.

Nakkushaiguse teatis tuleb edastada järgnevatel juhtudel:

- a) Laboratoorselt kinnitatud SARS-CoV2 positiivsetele (nii sümptomaatilistele kui asümptomaatilistele).
- b) Laboratoorselt kinnitamata COVID-19 haigetele, kui neid ei ole võimalik testida või kui nad keelduvad testist
- c) Ülemiste hingamisteede viirushaiguse sümptomaatikaga patsientidele, kes keelduvad testimisest ning SARS-CoV2 nakkust ei saa välistada

U08 COVID-19 anamneesis

U08.9 COVID-19 anamneesis, täpsustamata

Märkige ainult kaasuva diagnoosina.

Seda koodi ei kasutata surma algpõhjuse kodeerimiseks.

- Kasutage koodi inimese tervise seisundi kirjeldamiseks kinnitatud või tõenäoliselt läbipõetud COVID-19 dokumenteerimisel, **kui puuduvad sümptomid, aga juhtum on seotud läbipõetud COVID-19ga;**
- Koodi võib kasutada ka patsiendi ühest raviasutusest teise üleviimisel pärast nakkusohtliku perioodi möödumist. Aitab eristada patsiente, kes ei vaja täiendavat testimist vastavalt Terviseameti COVID-19 isolatsiooninõuete kriteeriumite juhendile (https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/covid-19_isolatsiooninouete_kriteeriumid_02.02.2021.pdf).

U09 COVID-19 järgne seisund

U09.9 COVID-19 järgne seisund, täpsustamata

Märkige ainult kaasuva diagnoosina.

- Kasutage koodi **COVID-19 põdemise järgselt** inimese terviseprobleemi kirjeldamisel. Koodi ei kasutata juhtudel, kui inimene on praegusel hetkel COVID-19 haige.
- **Kasutage põhidiagnoosina COVID-19 põdemise järgselt tervise seisundi kirjeldamiseks koode: nt R06.0 hingeldus, R43.0 anosmia ehk haistmisvõimetus jne.**

U10 COVID-19 tekkeline süsteemne põletikuline sündroom

U 10.9 Koodi kasutatakse eriarstiabis.

U10.9 COVID-19 tekkeline süsteemne põletikuline sündroom, täpsustamata

Hüpertoksiline sündroom (tsütokiin torm)

Kawasaki-tüüpi sündroom

Lapsee süsteemne põletikuline sündroom (PIMS MIS-C)

Täiskasvanute süsteemne põletikuline sündroom (MIS-A)

- Märkige täiskasvanul vastavalt seisundile kas põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina ning lastel märkige põhidiagnoosina.
- Kui ei ole selget seost COVID-19ga, kasutage M30.3 limaskesta-naha-lümfisõlme sündroomi (Kawasaki).

U11 Immuniseerimise vajadus COVID-19 vastu

U11.9 Immuniseerimise vajadus COVID-19 vastu, täpsustamata

Märkige põhidiagnoosina, kui vastuvõtul teostati ainult vaksineerimine.

Kaasuva diagnoosina märkige juhul, kui vastuvõtul tegeleti peamiselt muu tervises seisundiga.

Ärge kasutage koodi surma algpõhjuse kodeerimiseks.

- Kasutage koodi, kui inimene kohtub tervishoiuteenuse osutajaga profülaktiliseks immuniseerimiseks COVID-19 vastu.
- Juhul kui inimene tuli küll vastuvõtule, aga COVID-19 vastu immuniseerimine jäi teostamata, kasutage teostamata immuniseerimise koodi, nt Z28.

U12 COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju

U12.9 COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata

Märkige ainult kaasuva diagnoosina.

- Seda koodi kasutage kaasuva diagnoosina, kui COVID-19 vaktsiini korrektne profülaktiline manustamine põhjustas soovimatu mõju.
- **Põhidiagnoosina kasutage mõne teise peatüki koodi, mis kirjeldab soovimatu mõju olemust (näiteks palavik, nõrkus, valu jm).**
- Kasutage välispõhjuse kodeerimiseks analoogselt Y59.0 Muud ja täpsustamata vaktsiinid ja bioloogilised ained: viirusvaktsiinid.