

Tervise- ja tööministri 28. märtsi 2022. a määrus  
nr 29

"Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr  
112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise"

Lisa

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määrus nr  
112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu"

Lisa

## EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1734768         | abirateroon, 500mg               | L02BX03  | ZYTIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | metastaseerunud<br>kastratsioonresistentse<br>eesnäärmevähi raviks<br>patsientidele, kes ei<br>ole enne haiguse<br>metastaseerumist<br>saanud ravi teise<br>põlvkonna<br>androgeenireseptori<br>inhibiitoriga, kes on<br>asümptomaatilised või<br>kergelt<br>sümptomaatilised<br>peale ebaõnnestunud<br>androgeenide<br>deprivatsioonravi, ning<br>kellel kemoteraapia ei<br>ole veel kliiniliselt<br>näidustatud või heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>1 või valusündroomist<br>tingitud ECOG 2)<br>patsientidele, kelle<br>haigus on eelneva<br>dotsetakseeli sisaldava<br>kemoteraapia vältel või<br>pärast seda<br>progresseerunud.<br>Ravimi kasutamisele ei<br>või eelneda<br>metastaatilise haiguse<br>ravi ensalutamiidiga<br>või abiraterooniga<br>varasemas ravireas,<br>kuid lubatud on ravimi<br>vahetus talumatute<br>kõrvaltoimete<br>ilmnemisel. |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloo hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1766662     | adalimumab, 20mg 0.2ml        | L04AB04  | HUMIRA, süstelahus süstlis, 0.2ml 2TK | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 100          | L40-L40  | Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel<br>mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteetilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel mõõduka kuni<br>raske (Hurley II ja III<br>staadium) supuratiivse<br>hidradeniidi korral<br>tingimusel, et patsiendi<br>haigus on resistentne<br>senistele<br>konventsionaalsetele<br>ravimeetoditele<br>(paikne klindamütsiin 3<br>kuud, süsteemne<br>tetratsükliin vähemalt<br>10 nädalat, süsteemne<br>atsitretiin 6 kuud) või<br>on need talumatud või<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1816398         | adalimumab, 20mg<br>0.4ml        | L04AB04  | HYRIMOZ, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10–30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või<br>valulikkus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                         |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb<br/>I–III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-<br>H44.1, H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0, H30-<br>H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel<br>mitteinfektsioosse<br>intermediaalse,<br>posterioorse ja<br>panuveidi raviks<br>täiskasvanud<br>patsiendil ja<br>anterioorse uveidi<br>raviks lapsel, kelle<br>ravivastus<br>kortikosteroididele on<br>ebapiisav, kes vajavad<br>kortikosteroidi annuse<br>vähendamist või<br>kellele<br>kortikosteroidravi on<br>sobimatu ning kelle<br>ravivastus<br>immunosupressantidel<br>e (tsüklosporiin,<br>asatiopriin,<br>metotreksaat või<br>kloorambutsiil) on<br>ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1695090     | adalimumab, 40mg 0.4ml        | L04AB04  | HUMIRA, süstelahus süstlis, 0.4ml 2TK | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 100          | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteetilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |                                 |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine   |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitreiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1715251         | adalimumab, 40mg<br>0.4ml        | L04AB04  | HUMIRA, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.4ml 2TK | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 maksimaalses<br>annuses mittesteroidse<br>valu- ja<br>põletikuvastase<br>ravimiga (perifeerse<br>artriidi korral vähemalt<br>4 kuu jooksul<br>sulfasalasiini 2,0 g/die<br>või teis(t)e<br>sünteeilis(t)e haigust<br>modifitseeriva(te)<br>ravimi(te)ga<br>adekvaatses annuses<br>ja perifeerse artriidi<br>ja/või entesiitide korral<br>kahekordse lokaalse<br>glükokortikosteroidideg<br>a süsteraviga) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>modifitseeritud New<br>Yorgi diagnostika-<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor $\geq 4$ ja<br>hommikune<br>alaseljavalu ja -jäikus<br>vähemalt 1 tund ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>väljendunud<br>tendoentesopaatia<br>vähemalt 4 enteesi<br>piirkonnas ja/või tõsine<br>ekstrapinaalne ja<br>ekstraartikulaarne |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injeksiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteesilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstraspinaalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 6 kuud<br>kestnud kombineeritud<br>ravi kokku vähemalt 3<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>ja suukaudse<br>glükokortikosteroidiga<br>on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks, halva<br>prognoosiga<br>(autoantikehade<br>(reumatoidfaktor ja/või<br>aCCP) olemasolu, eriti<br>kõrges tiitris; kõrge<br>põletiku aktiivsus (SR,<br>CRP); kõrge turses<br>liigeste arv; mõõdukas-<br>kõrge haiguse<br>aktiivsus vastavalt<br>komposiitskoorile<br>(DAS28); eelnevate<br>kombinatsioonid;<br>erosioonide olemasolu<br>varajases haiguse<br>staadiumis) patsientide<br>korral 3 kuud kestnud<br>ravi 1 sünteetilise<br>haigust modifitseeriva<br>ravimiga on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>ACR/EULAR 2010<br>klassifikatsiooni<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: esineb I-<br>III astme |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1867596         | adalimumab, 40mg<br>0.4ml        | L04AB04  | HUKYNDRA, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 1TK | Stada Arzneimittel AG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv;<br/>möödukaskõrge<br/>haiguse aktiivsus<br/>vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb<br/>I–III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

[illegible]



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 maksimaalses<br>annuses mittesteroidse<br>valu- ja<br>põletikuvastase<br>ravimiga (perifeerse<br>artriidi korral vähemalt<br>4 kuu jooksul<br>sulfasalasiini 2,0 g/die<br>või teis(t)e<br>sünteetilis(t)e haigust<br>modifitseeriva(te)<br>ravimi(te)ga<br>adekvaatses annuses<br>ja perifeerse artriidi<br>ja/või entesiitide korral<br>kahekordse lokaalse<br>glükokortikosteroidideg<br>a süsteraviga) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>modifitseeritud New<br>Yorgi<br>diagnostikakriteeriumid<br>ele ning järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja<br>hommikune<br>alaseljavalu ja -jäikus<br>vähemalt 1 tund ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>väljendunud<br>tendoentesopaatia<br>vähemalt 4 enteesi<br>piirkonnas ja/või tõsine<br>ekstrapinaalne ja |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1–2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10–30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valuja<br>põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel mõõduka kuni<br>raske (Hurley II ja III<br>staadium) supuratiivse<br>hidradeniidi korral<br>tingimusel, et patsiendi<br>haigus on resistentne<br>senistele<br>konventsionaalsetele<br>ravimeetoditele<br>(paikne klindamütsiin 3<br>kuud, süsteemne<br>tetratsükliin vähemalt<br>10 nädalat, süsteemne<br>atsitretiin 6 kuud) või<br>on need talumatud või<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1867608         | adalimumab, 40mg<br>0.4ml        | L04AB04  | HUKYNDRA, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Stada Arzneimittel AG | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 maksimaalses<br>annuses mittesteroidse<br>valu- ja<br>põletikuvastase<br>ravimiga (perifeerse<br>artriidi korral vähemalt<br>4 kuu jooksul<br>sulfasalasiini 2,0 g/die<br>või teis(t)e<br>sünteesilis(t)e haigust<br>modifitseeriva(te)<br>ravimi(te)ga<br>adekvaatses annuses<br>ja perifeerse artriidi<br>ja/või entesiitide korral<br>kahekordse lokaalse<br>glükokortikosteroidideg<br>a süsteraviga) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>modifitseeritud New<br>Yorgi<br>diagnostikakriteeriumid<br>ele ning järgmiste<br>tingimuste: BASDAI<br>skoor >=4 ja<br>hommikune<br>alaseljavalu ja -jäikus<br>vähemalt 1 tund ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>väljendunud<br>tendoentesopaatia<br>vähemalt 4 enteesi<br>piirkonnas ja/või tõsine<br>ekstrapinaalne ja<br>ekstraartikulaarne |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m <sup>2</sup> (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1–2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10–30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 6 kuud<br>kestnud kombineeritud<br>ravi kokku vähemalt 3<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>ja suukaudse<br>glükokortikosteroidiga<br>on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks, halva<br>prognoosiga<br>(autoantikehade<br>(reumatoidfaktor ja/või<br>aCCP) olemasolu, eriti<br>kõrges tiitris; kõrge<br>põletiku aktiivsus (SR,<br>CRP); kõrge turses<br>liigeste arv;<br>mõõdukaskõrge<br>haiguse aktiivsus<br>vastavalt<br>komposiitskoorile<br>(DAS28); eelnevate<br>kombinatsioonid;<br>erosioonide olemasolu<br>varajases haiguse<br>staadiumis) patsientide<br>korral 3 kuud kestnud<br>ravi 1 sünteetilise<br>haigust modifitseeriva<br>ravimiga on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>ACR/EULAR 2010<br>klassifikatsiooni<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: esineb |



[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1867620         | adalimumab, 40mg<br>0.4ml        | L04AB04  | HUKYNDRA, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.4ml 1TK | Stada Arzneimittel AG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 6 kuud<br>kestnud kombineeritud<br>ravi kokku vähemalt 3<br>sünteeetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>ja suukaudse<br>glükokortikosteroidiga<br>on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks, halva<br>prognoosiga<br>(autoantikehade<br>(reumatoidfaktor ja/või<br>aCCP) olemasolu, eriti<br>kõrges tiitris; kõrge<br>põletiku aktiivsus (SR,<br>CRP); kõrge turses<br>liigeste arv;<br>möödukaskõrge<br>haiguse aktiivsus<br>vastavalt<br>komposiitskoorile<br>(DAS28); eelnevate<br>kombinatsioonid;<br>erosioonide olemasolu<br>varajases haiguse<br>staadiumis) patsientide<br>korral 3 kuud kestnud<br>ravi 1 sünteeetilise<br>haigust modifitseeriva<br>ravimiga on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>ACR/EULAR 2010<br>klassifikatsiooni<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: esineb<br>I–III astme |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valuja<br>põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteetilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi<br/>diagnostikakriteeriumid<br/>ele ning järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1–2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10–30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |                                 |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine   |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitreiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1867631         | adalimumab, 40mg<br>0.4ml        | L04AB04  | HUKYNDRA, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Stada Arzneimittel AG | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi<br/>diagnostikakriteeriumid<br/>ele ning järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor <math>\geq 4</math> ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteeetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv;<br/>mõõdukaskõrge<br/>haiguse aktiivsus<br/>vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteeetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | I–III astme funktsionaalne liigesepuudulikkus; vähemalt 6 turses ja 6 valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt 1 tund või reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm; ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödunud vähemalt 2 kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m <sup>2</sup> (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1–2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10–30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |             |                           |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine   |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valuja<br>põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injeksiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotreksaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstraspinaalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1742251         | adalimumab, 40mg<br>0.8ml        | L04AB04  | AMGEVITA, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 2TK | Amgen Europe B.V. | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-<br>H44.1, H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0, H30-<br>H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel<br>mitteinfektsioosse<br>intermediaalse,<br>posterioorse ja<br>panuveidi raviks<br>täiskasvanud<br>patsiendil ja<br>anterioorse uveidi<br>raviks lapsel, kelle<br>ravivastus<br>kortikosteroididele on<br>ebapiisav, kes vajavad<br>kortikosteroidi annuse<br>vähendamist või<br>kellele<br>kortikosteroidravi on<br>sobimatu ning kelle<br>ravivastus<br>immunosupressantidele<br>on ebapiisav (tsüklosporiin,<br>asatiopriin,<br>metotreksaat või<br>kloorambutsiil) on<br>ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteetilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 mittesteroidse valu-<br/>ja põletikuvastase<br/>ravimiga<br/>maksimaalses<br/>raviannuses või<br/>(perifeerse artriidi või<br/>entesopaatia korral)<br/>vähemalt 2 steroidi<br/>injeksiooniga ja<br/>vähemalt 2 psoriartriidi<br/>ravis kasutatava<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>maksimaalses<br/>annuses mono- või<br/>kombineeritud<br/>teraapiana (sh<br/>metotrekstaat kuni 25<br/>mg nädalas) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor <math>\geq 4</math> ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>vähemalt 4 tugeva<br/>valulikkusega enteesi<br/>ja/või tõsine<br/>ekstraartikulaarne ja<br/>ekstrasпинаalne<br/>haaratus</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1742295         | adalimumab, 40mg<br>0.8ml        | L04AB04  | AMGEVITA, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.8ml 2TK | Amgen Europe B.V. | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 maksimaalses<br>annuses mittesteroidse<br>valu- ja<br>põletikuvastase<br>ravimiga (perifeerse<br>artriidi korral vähemalt<br>4 kuu jooksul<br>sulfasalasiini 2,0 g/die<br>või teis(t)e<br>sünteeilis(t)e haigust<br>modifitseeriva(te)<br>ravimi(te)ga<br>adekvaatses annuses<br>ja perifeerse artriidi<br>ja/või entesiitide korral<br>kahekordse lokaalse<br>glükokortikosteroidideg<br>a süsteraviga) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>modifitseeritud New<br>Yorgi diagnostika-<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor $\geq 4$ ja<br>hommikune<br>alaseljavalu ja -jäikus<br>vähemalt 1 tund ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>väljendunud<br>tendoentesopaatia<br>vähemalt 4 enteesi<br>piirkonnas ja/või tõsine<br>ekstrapinaalne ja<br>ekstraartikulaarne |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

[illegible]



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1777305         | adalimumab, 40mg<br>0.8ml        | L04AB04  | HYRIMOZ, süstelahus süstlis,<br>0.8ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel mõõduka kuni<br>raske (Hurley II ja III<br>staadium) supuratiivse<br>hidradeniidi korral<br>tingimusel, et patsiendi<br>haigus on resistentne<br>senistele<br>konventsionaalsetele<br>ravimeetoditele<br>(paikne klindamütsiin 3<br>kuud, süsteemne<br>tetratsükliin vähemalt<br>10 nädalat, süsteemne<br>atsitreiin 6 kuud) või<br>on need talumatud või<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: mõõduka<br>ja raske ägenemise<br>korral, kui<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) ja/või<br>kortikosteroidravi on<br>toimeta,<br>vastunäidustatud või<br>talumatu; Crohni tõve<br>fistlitega vormi korral,<br>kui antibiootikumid<br>ja/või<br>immuunsupresseeriv<br>ravi (asatiopriin või 6-<br>merkaptopuriin või<br>metotreksaat) on<br>toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 6 kuud<br>kestnud kombineeritud<br>ravi kokku vähemalt 3<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>ja suukaudse<br>glükokortikosteroidiga<br>on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks, halva<br>prognoosiga<br>(autoantikehade<br>(reumatoidfaktor ja/või<br>aCCP) olemasolu, eriti<br>kõrges tiitris; kõrge<br>põletiku aktiivsus (SR,<br>CRP); kõrge turses<br>liigeste arv; mõõdukas-<br>kõrge haiguse<br>aktiivsus vastavalt<br>komposiitskoorile<br>(DAS28); eelnevate<br>kombinatsioonid;<br>erosioonide olemasolu<br>varajases haiguse<br>staadiumis) patsientide<br>korral 3 kuud kestnud<br>ravi 1 sünteetilise<br>haigust modifitseeriva<br>ravimiga on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>ACR/EULAR 2010<br>klassifikatsiooni<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: esineb I-<br>III astme |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstraspinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1777338         | adalimumab, 40mg<br>0.8ml        | L04AB04  | HYRIMOZ, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.8ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriartriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstraspinaalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-<br>H44.1, H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0, H30-<br>H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel<br>mitteinfektsioosse<br>intermediaalse,<br>posterioorse ja<br>panuveidi raviks<br>täiskasvanud<br>patsiendil ja<br>anterioorse uveidi<br>raviks lapsel, kelle<br>ravivastus<br>kortikosteroididele on<br>ebapiisav, kes vajavad<br>kortikosteroidi annuse<br>vähendamist või<br>kellele<br>kortikosteroidravi on<br>sobimatu ning kelle<br>ravivastus<br>immunosupressantidel<br>e (tsüklosporiin,<br>asatiopriin,<br>metotrekstaat või<br>kloorambutsiil) on<br>ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |



[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja                 | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1792571     | adalimumab, 40mg 0.8ml        | L04AB04  | IDACIO, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Fresenius Kabi Deutschland GmbH | 100          | L73.2-L73.2 | Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |                  |                                |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-<br>H44.1, H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0, H30-<br>H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel<br>mitteinfektsioosse<br>intermediaalse,<br>posterioorse ja<br>panuveidi raviks<br>täiskasvanud<br>patsiendil ja<br>anterioorse uveidi<br>raviks lapsel, kelle<br>ravivastus<br>kortikosteroididele on<br>ebapiisav, kes vajavad<br>kortikosteroidi annuse<br>vähendamist või<br>kellele<br>kortikosteroidravi on<br>sobimatu ning kelle<br>ravivastus<br>immunosupressantidel<br>e (tsüklosporiin,<br>asatiopriin,<br>metotrekstaat või<br>kloorambutsiil) on<br>ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                     |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstraspinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |   |                                     |                  |          |             |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
| 1412334         | agomelatiin, 25mg                | N06AX22  | VALDOXAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Les Laboratoires<br>Servier         | 50               |          |             |        |           |            |                                |
| 1738469         | agomelatiin, 25mg                | N06AX22  | ZILBEA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Zentiva k.s.                        | 50               |          |             |        |           |            |                                |
| 1738762         | agomelatiin, 25mg                | N06AX22  | AGOMELATINE MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 50               |          |             |        |           |            |                                |
| 1738919         | agomelatiin, 25mg                | N06AX22  | AGOMELATINE TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK  | Teva B.V.                           | 50               |          |             |        |           |            |                                |
| 1763872         | agomelatiin, 25mg                | N06AX22  | LAMEGOM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 50               |          |             |        |           |            |                                |
| 1590106         | aklidiinium, 322mcg<br>1annust   | R03BB05  | BRETARIS GENUAIR,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK       | AstraZeneca AB                      | 50               |          |             |        |           |            |                                |
|                 |                                  |          |   |                                     | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1593312         | aksitiniib, 1mg                  | L01EK01  | INLYTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine aksitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1593345         | aksitiniib, 5mg                  | L01EK01  | INLYTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG   | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine aksitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
| 1739437         | alektiniib, 150mg                | L01ED03  | ALECENSA, kõvakapsel,<br>224TK                       | Roche Registration<br>GmbH | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | anaplastilise<br>lümfoomkinaas-<br>positiivse<br>kaugelearenenud<br>varem ravimata<br>mitteväikerakk-<br>kopsuvähi raviks heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>2) täiskasvanud<br>patsientidele   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1300026         | alendroonhape, 70mg                                | M05BA04  | ALENDRONIC ACID<br>ACCORD 70MG, tablett, 4TK               | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1835401         | alendroonhape, 70mg                                | M05BA04  | SEDRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK           | UAB Ideal Trade Links     | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                           | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1339141         | alendroonhape+koleka<br>ltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB03  | FOSAVANCE, tablett, 4TK                                    | N.V. Organon              | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                           | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1695067         | alendroonhape+koleka<br>ltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB03  | ALENDRONIC<br>ACID/COLECALCIFEROL<br>ZENTIVA, tablett, 4TK | Zentiva k.s.              | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1696204         | alendroonhape+koleka<br>ltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB03  | ALENDRONIC ACID/<br>COLECALCIFEROL<br>SANDOZ, tablett, 4TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 75               | M80-M80                  |                                  |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1207493         | alfadarbepoetiin,<br>100mcg 0.5ml                  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK                  | Amgen Europe B.V.              | 100              | D63-D63, T86-T86         | Uroloog, Nefroloog,<br>Pediaater |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1207527         | alfadarbepoetiin,<br>150mcg 0.3ml                  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK                  | Amgen Europe B.V.              | 100              | D63-D63, T86-T86         | Uroloog, Nefroloog,<br>Pediaater |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1176218         | alfadarbepoetiin,<br>20mcg 0.5ml                   | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK                  | Amgen Europe B.V.              | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D63-D63, T86-T86         | Nefroloog,<br>Pediaater, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
| 1207314         | alfadarbepoetiin,<br>30mcg 0.3ml                   | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK                  | Amgen Europe B.V.              | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D63-D63, T86-T86         | Nefroloog, Uroloog,<br>Pediaater |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1207370         | alfadarbepoetiin,<br>40mcg 0.4ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK     | Amgen Europe B.V.                     | 50               |                      |                                  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D63-D63, T86-T86     | Uroloog, Pediaater,<br>Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207415         | alfadarbepoetiin,<br>50mcg 0.5ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK     | Amgen Europe B.V.                     | 50               |                      |                                  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D63-D63, T86-T86     | Uroloog, Pediaater,<br>Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |  |
| 1207437         | alfadarbepoetiin,<br>60mcg 0.3ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK     | Amgen Europe B.V.                     | 50               |                      |                                  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D63-D63, T86-T86     | Pediaater, Uroloog,<br>Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |  |
| 1207471         | alfadarbepoetiin,<br>80mcg 0.4ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK     | Amgen Europe B.V.                     | 100              | D46-D46, D47.1-D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |                      |                                  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | D63-D63, T86-T86     | Uroloog, Nefroloog,<br>Pediaater |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1022960         | alfadornaas, 1mg 1ml             | R05CB13  | PULMOZYME, nebuliseeritav<br>lahus, 2.5ml 6TK | Roche Eesti Osaühing                  | 100              | E84-E84              | Pediaater,<br>Pulmonoloog        | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |                      |                                  |        |           |            |  |
| 1704260         | alfaefmoroktokog,<br>1000RÜ      | B02BD83  | ELOCTA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66              | Pediaater,<br>Hematoloog         |        |           |            |  |
| 1704271         | alfaefmoroktokog,<br>1500RÜ      | B02BD83  | ELOCTA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66              | Pediaater,<br>Hematoloog         |        |           |            |  |
| 1704282         | alfaefmoroktokog,<br>2000RÜ      | B02BD83  | ELOCTA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66              | Hematoloog,<br>Pediaater         |        |           |            |  |
| 1704237         | alfaefmoroktokog,<br>250RÜ       | B02BD83  | ELOCTA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66              | Pediaater,<br>Hematoloog         |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1704293         | alfaefmoroktokog, 3000RÜ         | B02BD83  | ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK   | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66                  | Hematoloog, Pediaater |        |           |            |  |
| 1704248         | alfaefmoroktokog, 500RÜ          | B02BD83  | ELOCTA, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK   | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 100              | D66-D66                  | Hematoloog, Pediaater |        |           |            |  |
| 1644904         | alfafollitropiin, 150RÜ 0.25ml   | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.25ml 1TK  | Gedeon Richter Plc.                | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                       |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |                       |        |           |            |  |
| 1644915         | alfafollitropiin, 225RÜ 0.375ml  | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.375ml 1TK | Gedeon Richter Plc.                | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                       |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |                       |        |           |            |  |
| 1173855         | alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml    | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK   | Merck Europe B.V.                  | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                       |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |                       |        |           |            |  |
| 1628636         | alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml    | G03GA05  | OVALEAP, süstelahus, 0.5ml 1TK               | Theramex Ireland Limited           | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                       |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |                       |        |           |            |  |
| 1644926         | alfafollitropiin, 300RÜ 0.5ml    | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 1TK   | Gedeon Richter Plc.                | 50               |                          |                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                       |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1213513         | alfafollitropiin, 450RÜ<br>0.75ml | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.75ml 1TK  | Merck Europe B.V.           | 50               |                              |        |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |        |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1628647         | alfafollitropiin, 450RÜ<br>0.75ml | G03GA05  | OVALEAP, süstelahus,<br>0.75ml 1TK               | Theramex Ireland<br>Limited | 50               |                              |        |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |        |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1644937         | alfafollitropiin, 450RÜ<br>0.75ml | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.75ml 1TK  | Gedeon Richter Plc.         | 50               |                              |        |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |        |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1035784         | alfafollitropiin, 75RÜ            | G03GA05  | GONAL-F, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK   | Merck Europe B.V.           | 50               |                              |        |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |        |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1644892         | alfafollitropiin, 75RÜ<br>0.125ml | G03GA05  | BEMFOLA, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.125ml 1TK | Gedeon Richter Plc.         | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |        |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
|                 |                                   |          |  |                             | 50               |                              |        |        |           |            |  |
| 1173866         | alfafollitropiin, 900RÜ<br>1.5ml  | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 1.5ml 1TK   | Merck Europe B.V.           | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |        |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
|                 |                                   |          |  |                             | 50               |                              |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1628658         | alfafollitropiin, 900RÜ<br>1.5ml                | G03GA05  | OVALEAP, süstelahus, 1.5ml<br>1TK                                  | Theramex Ireland<br>Limited | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                          |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                              |                          |        |           |            |  |
| 1327834         | alfafollitropiin+alfalutro-<br>piin, 150RÜ+75RÜ | G03GA30  | PERGOVERIS, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Merck Europe B.V.           | 50               |                              |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                          |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1580969         | alfakooriongonadotropi-<br>in, 250mcg 0.5ml     | G03GA08  | OVITRELLE, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.5ml 1TK                   | Merck Europe B.V.           | 50               |                              |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                          |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1046810         | alfalutropiin, 75RÜ                             | G03GA07  | LUVERIS, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                     | Merck Europe B.V.           | 50               |                              |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                          |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks |
| 1657593         | alfasimoktokog,<br>1000RÜ                       | B02BD81  | NUWIQ, süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                       | Octapharma AB               | 100              | D66-D66                      | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
| 1657571         | alfasimoktokog,<br>250RÜ                        | B02BD81  | NUWIQ, süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                       | Octapharma AB               | 100              | D66-D66                      | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
| 1657582         | alfasimoktokog,<br>500RÜ                        | B02BD81  | NUWIQ, süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                       | Octapharma AB               | 100              | D66-D66                      | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            |  |
| 1633508         | alfaturoktokog,<br>1000RÜ                       | B02BD80  | NOVOEIGHT, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                   | Novo Nordisk A/S            | 100              | D66-D66                      | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
| 1064247         | alfusosiin, 10mg                                | G04CA01  | XATRAL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Groupe       | 50               |                              |                          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1278176         | alfusosiin, 10mg                 | G04CA01  | ALFUZOSIN-TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1698127     | alirokumab, 150mg 1ml         | C10AX14  | PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK | Sanofi-Aventis Groupe | 75           | E78.0-E78.0 | Kardioloog | esmane |           |            | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | I25.2-I25.2, I21-I21,<br>I22-I22 | Kardioloog | esmane |           |            | ravi alustamine ägeda<br>südamelihase infarkti<br>järgselt (möödunud<br><=12 kuud)<br>kombinatsioonis statiini<br>ja esetimiibiga<br>patsientidel, kellel<br>vaatamata 1-3 kuud<br>kestnud ravile<br>maksimaalses<br>talutavas annuses<br>statiini ja esetimiibiga<br>ei ole saavutatud LDL-<br>kolesterooli<br>eesmärgväärtust<br>(<1,4mmol/L) ning<br>patsiendi LDL-C<br>väärtus on seejuures<br>>=3,0 mmol/L või<br>kellele statiin/esetimiib<br>on vastunäidustatud<br>ning patsiendi LDL-C<br>väärtus on seejuures<br>>=3,0 mmol |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1698150     | alirokumab, 75mg 1ml          | C10AX14  | PRALUENT, süstelahus pen-süstlis, 1ml 2TK | Sanofi-Aventis Groupe | 75           | E78.0-E78.0 | Kardioloog | esmane |           |            | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I25.2-I25.2, I21-I21, I22-I22 | Kardioloog | esmane |           |            | ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärgväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol |
| 1001619         | allopurinool, 100mg              | M04AA01  | ALLOPURINOL ORIFARM, tablett, 50TK                                   | Orifarm Healthcare A/S      | 50               |                               |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | M10-M10, N20-N23              |            |        |           |            |   |
| 1685505         | allopurinool, 100mg              | M04AA01  | ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 50TK                                    | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |                               |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | M10-M10, N20-N23              |            |        |           |            |   |
| 1001686         | allopurinool, 300mg              | M04AA01  | ALLOPURINOL ORIFARM, tablett, 50TK                                   | Orifarm Healthcare A/S      | 50               |                               |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | M10-M10, N20-N23              |            |        |           |            |   |
| 1685628         | allopurinool, 300mg              | M04AA01  | ALLOPURINOL SANDOZ, tablett, 100TK                                   | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |                               |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | M10-M10, N20-N23              |            |        |           |            |   |
| 1754131         | allopurinool, 300mg              | M04AA01  | ALLOPURINOL ACCORD, tablett, 50TK                                    | Accord Healthcare B.V.      | 50               |                               |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | M10-M10, N20-N23              |            |        |           |            |   |
| 1064517         | amantadiin, 100mg                | N04BB01  | AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Ratiopharm GmbH             | 100              | G20-G20                       | Neuroloog  | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                               |            |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1349872         | ambrisentaan, 10mg               | C02KX02  | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |             |  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1775011         | ambrisentaan, 10mg               | C02KX02  | AMBRISENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | UAB Norameda    | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |             |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1797071         | ambrisentaan, 10mg               | C02KX02  | AMBRISENTAN ZENTIVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |             |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1798555         | ambrisentaan, 10mg               | C02KX02  | AMBRISENTAN MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |             |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1349850         | ambrisentaan, 5mg                | C02KX02  | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1774975         | ambrisentaan, 5mg                | C02KX02  | AMBRISENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | UAB Norameda    | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1797060         | ambrisentaan, 5mg                | C02KX02  | AMBRISENTAN ZENTIVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 50               |             |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|---|
| 1798533         | ambrisentaan, 5mg                | C02KX02  | AMBRISENTAN MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 100              | I27.0-I27.0   | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |   |  |        |           |            |   |
| 7017959         | aminohapped,                     |          | Neocate Junior, pulber, 400g<br>N6                              | Nutrimedical OÜ                     | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-<br>L27.2, L50-L50,<br>T78.1-T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-K90.4,<br>T78.2-T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-T78.0 | Pediaater  |        | 1,00      | 2,00       | lehmapiimavalgu<br>talumatusega 1-2-<br>aastastele lastele, kes<br>on esimesel eluaastal<br>tarvitanud<br>aminohapete segu<br>ning kes täielikult<br>hüdrolüüsitud<br>piimasegu ei talu.<br>Jätkuv vajadus<br>aminohapete segule<br>peab olema tõestatud<br>preparaadi esmasel<br>määramisel ja 6 kuu<br>möödudes   |
| 1016244         | amiodaroon, 200mg                | C01BD01  | CORDARONE 200 MG,<br>tablett, 30TK                              | Sanofi-Aventis Groupe               | 75               | I47-I49   | Pediaater,<br>Kardioloog                                 | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |   |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1044616         | amiodaroon, 200mg                | C01BD01  | AMIOKORDIN, tablett, 60TK                                      | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I47-I49   | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1041141         | amisulpriid, 200mg               | N05AL05  | SOLIAN, tablett, 30TK  | Sanofi-Aventis Groupe  | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | F20-F29, F30-F31  | Psühhiaater              |        |           |            |          |
| 1342213         | amisulpriid, 200mg               | N05AL05  | AMISAN 200 MG, tablett, 30TK                                   | Pro.med.cs Praha a.s.  | 100              | F20-F29, F30-F31  | Psühhiaater              |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |   |                          |        |           |            |          |
| 1343438         | amisulpriid, 400mg               | N05AL05  | AMISAN 400 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK          | Pro.med.cs Praha a.s.  | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | F20-F29, F30-F31  | Psühhiaater              |        |           |            |          |
| 1107391         | amitriptülin, 10mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | AS Grindeks            | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0   |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012475         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK | AS Grindeks               | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | G63-G63, G43-G43,<br>G62.0-G62.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1068634         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE ORIFARM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | Orifarm Healthcare<br>A/S | 75               | G63-G63, G43-G43,<br>G62.0-G62.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1109900         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AGEN 10MG, tablett, 30TK   | Zentiva k.s.              | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1122972         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | HIPRES, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1147003         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPIN-RATIOPHARM<br>10 MG, tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1241514         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIGAMMA 10MG,<br>tablett, 30TK           | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1243088         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLOCARD 10MG, tablett,<br>60TK              | Hexal AG                       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1318946         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett,<br>30TK            | Teva Pharma B.V.               | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1445396         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 30TK      | Vitabalans Oy                  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1445408         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 60TK      | Vitabalans Oy                  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1445419         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 100TK     | Vitabalans Oy                  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1551406         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | HIPRES, tablett, 60TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1087871         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLOCARD 5 MG, tablett,<br>30TK              | Hexal AG                       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1109775         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5<br>MG, tablett, 30TK  | Ratiopharm GmbH                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1109887         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AGEN 5MG, tablett, 30TK                      | Zentiva k.s.                   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1122961         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | HIPRES, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1241424         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK   | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1242863         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLOCARD 5 MG, tablett, 60TK   | Hexal AG                    | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1318834         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1445307         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK                                  | Vitabalans Oy               | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1551383         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | HIPRES, tablett, 60TK  | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1008919         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Ratiopharm GmbH             | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |           | 16,00      |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1066058         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | AMOXICILLIN SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK             | Sandoz GmbH                 | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |           | 16,00      |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1066463         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |           | 16,00      |          |
| 1306921         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                        | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |           | 16,00      |          |
| 1000551         | amoksitsilliin, 500mg            | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK  | Ratiopharm GmbH             | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |           | 16,00      |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1066047         | amoksitsilliin, 500mg                                | J01CA04  | AMOXICILLIN SANDOZ,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 12TK                | Sandoz GmbH                    | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      |  |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1066496         | amoksitsilliin, 500mg                                | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      |  |
| 1306820         | amoksitsilliin, 500mg                                | J01CA04  | OSPAMOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                           | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      |  |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1000382         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml                          | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM<br>TS, suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK       | Ratiopharm GmbH                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      |  |
| 1182002         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml                          | J01CA04  | OSPAMOX 250 MG/5 ML,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK             | Sandoz GmbH                    | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      |  |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1000450         | amoksitsilliin, 750mg                                | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 750 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | Ratiopharm GmbH                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      |  |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1066722         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 500mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                        | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1066711         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | AMOKSIKLAV, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 70ml<br>1TK                       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1701155         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | MEDOCLAV, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 70ml<br>1TK                         | Medochemie Limited             | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1718333         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1822700         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK | First Pharma OÜ                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1840722         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK | UAB Ideal Trade Links                          | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1066700         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                 | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |  |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1066733         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK        | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited           | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1175431         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV, disperseeruv<br>tablett, 14TK                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                 | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1635230         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | BETAKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1660474         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AMOXICILLIN/CLAVULANIC<br>ACID ACTAVIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1723092         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                              | First Pharma OÜ                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |   |          |  |                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1743971         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | MEDOCLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                               | Medochemie Limited             | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1840700         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                              | UAB Ideal Trade Links          | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1009572         | amorolfiin, 50mg 1ml                          | D01AE16  | LOCERYL, ravimküünelakk,<br>2.5ml 1TK  | Galderma International         | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1736580         | amorolfiin, 50mg 1ml                          | D01AE16  | EXOLORFIN,<br>ravimküünelakk, 2.5ml 1TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1860555         | amorolfiin, 50mg 1ml                          | D01AE16  | LOCERYL, ravimküünelakk,<br>2.5ml 1TK  | UAB Ideal Trade Links          | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1208359         | anagreliid, 0,5mg                | L01XX35  | XAGRID, kõvakapsel, 100TK | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 100              | D47.3-D47.3 | Hematoloog |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüüurea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1765649         | anagreliid, 0,5mg                | L01XX35  | ANAGRELIDE MYLAN,<br>kõvakapsel, 100TK                                      | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited    | 100              | D47.3-D47.3 | Hematoloog                            |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>esmavaliku ravi<br>(hüdroksüüurea<br>annuses vähemalt 2g<br>päevas vähemalt 3 kuu<br>jooksul või<br>alfainterferoon) on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning esineb<br>trombotsütoos<br>1000x109/l või on<br>ilmnenud<br>trombohemorraagilised<br>juhud |
| 1033546         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ARIMIDEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | Laboratoires Juvise<br>Pharmaceuticals | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
| 1240490         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE<br>SANOSWISS 1 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB SanoSwiss                          | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | C50-C50     | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
| 1244438         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE-TEVA 1MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Teva Pharma B.V.                       | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | C50-C50     | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
| 1293870         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE ACCORD<br>1MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Accord Healthcare<br>B.V.              | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | C50-C50     | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299023         | anastroool, 1mg                  | L02BG03  | AXASTROL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | AS Grindeks                         | 50               |                                       |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 100              | C50-C50                               | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1836705         | anastroool, 1mg                  | L02BG03  | ANASTROZOLE ACCORD<br>1MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | UAB Ideal Trade Links               | 100              | C50-C50                               | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                                       |                                       |        |           |            |  |
| 1531437         | apiksabaan, 2,5mg                | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                   | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer EEIG | 50               |                                       |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks  |
| 1531448         | apiksabaan, 2,5mg                | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer EEIG | 75               | I48-I48                               |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                                       |                                       |        |           |            |  |
| 1603741         | apiksabaan, 5mg                  | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer EEIG | 50               |                                       |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 75               | I48-I48                               |                                       |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1504808         | apomorfiin, 10mg 1ml             | N04BC07  | APO-GO, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK | Stada Arzneimittel AG                        | 100              | G20-G20          | Neuroloog   |        |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>patsientidele, kellel<br>esineb vaatamata<br>optimaalsele<br>suukaudsele ravile<br>raskekujuline<br>motoorikahäire<br>kestvate või sagedaste<br>motoorsete<br>fluktuatsioonidega<br>(MDS UPDRS III skoor<br>off-perioodis on >40<br>punkti, off-perioodi<br>kestus >25%<br>ärkvelolekuajast) ning<br>ravivastus<br>apomorfiinile on hea<br>(MDS-UPDRS III skoor<br>paraneb >40%) |
| 1649796         | aripiprasool, 10mg               | N05AX12  | ZYKALOR, tablett, 30TK                      | Medochemie Limited                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
| 1649819         | aripiprasool, 10mg               | N05AX12  | ZYKALOR, tablett, 60TK                      | Medochemie Limited                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
| 1203578         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ABILIFY, tablett, 28TK                      | Otsuka<br>Pharmaceutical<br>Netherlands B.V. | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
| 1649651         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ARIPIPRAZOLE TEVA,<br>tablett, 28TK         | Teva B.V.                                    | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1649853         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ZYKALOR, tablett, 30TK                      | Medochemie Limited                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
| 1650271         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ARISPPA, tablett, 60TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                    | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
| 1691962         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ARIPIPRAZOLE ZENTIVA,<br>tablett, 28TK      | Zentiva k.s.                                 | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1703630         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ARIPIPRAZOLE ACCORD,<br>tablett, 28TK                 | Accord Healthcare<br>S.L.U.     | 100              | F20-F29, F30-F31                  | Psühhiaater  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |                                   |  |        |           |            |          |
| 1650349         | aripiprasool, 30mg               | N05AX12  | ARISPPA, tablett, 30TK                                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto       | 50               |                                   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | F20-F29, F30-F31                  | Psühhiaater  |        |           |            |          |
| 1004500         | asatiopriin, 50mg                | L04AX01  | IMURAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Aspen Pharma Trading<br>Limited | 50               |                                   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46     | Reumatoloog,<br>Pediaater                                      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | K50-K51, K73-K74                  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | L20-L20                           | Dermatoveneroloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | L12-L12, L13.0-<br>L13.0, L10-L10 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | N00-N08                           | Nefroloog, Pediaater   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | L40-L40                           | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86                  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | G70-G70                           | Neuroloog,<br>Pediaater  | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1667325         | asatiopriin, 50mg                | L04AX01  | ATSIMUTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Bausch Health Ireland<br>Limited | 50               |                                   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | L12-L12, L13.0-<br>L13.0, L10-L10 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | L40-L40                           | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-T86                  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | G70-G70                           | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | L20-L20                           | Dermatoveneroloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | K50-K51, K73-K74                  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46     | Reumatoloog,<br>Pediaater                                      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | N00-N08                           | Nefroloog, Pediaater   |        |           |            |          |
| 1865099         | asatiopriin, 50mg                | L04AX01  | IMURAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | UAB Ideal Trade Links            | 75               | L10-L10, L13.0-<br>L13.0, L12-L12 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | K50-K51, K73-K74                  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | L20-L20                           | Dermatoveneroloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 50               |                                   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | L40-L40                           | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35     | Pediaater,<br>Reumatoloog                                      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | G70-G70                           | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-T86                  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                  | 75               | N00-N08                           | Pediaater, Nefroloog   |        |           |            |          |
| 1005736         | aselaiinhape, 200mg<br>1g        | D10AX03  | SKINOREN, kreem, 30g 1TK                                 | LEO Pharma A/S                   | 50               |                                   |  |        |           |            |          |
| 1831979         | aselaiinhape, 200mg<br>1g        | D10AX03  | SKINOREN, kreem, 30g 1TK                                 | UAB "Lex ano"                    | 50               |                                   |  |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1850060         | aselaiinhape, 200mg<br>1g        | D10AX03  | SKINOREN, kreem, 30g 1TK   | UAB Ideal Trade Links     | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1019809         | asitromütsiin, 20mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 20ml<br>1TK                 | Teva Pharma B.V.          | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1019775         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | SUMAMED, kõvakapsel, 6TK   | Teva Pharma B.V.          | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1614439         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 6TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1168130         | asitromütsiin, 40mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED FORTE,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 15ml 1TK           | Teva Pharma B.V.          | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1267309         | asitromütsiin, 40mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED FORTE,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 30ml 1TK           | Teva Pharma B.V.          | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1019797         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | SUMAMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK                      | Teva Pharma B.V.          | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1113398         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITROX 500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK               | Zentiva k.s.              | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1184992         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN SANDOZ<br>500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK | Sandoz GmbH               | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1549548         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK     | AS Grindeks               | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1563342         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | ZYLUMIT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK                      | Rivopharm Limited         | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1614451         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1045796         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | NOVORAPID PENFILL,<br>süstelahus kolbampullis, 3ml<br>5TK                  | Novo Nordisk A/S | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
| 1084788         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AD05  | NOVOMIX 30 FLEXPEN,<br>süstesuspensioon pen-süstlis,<br>3ml 5TK            | Novo Nordisk A/S | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
| 1092541         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | NOVORAPID FLEXPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                   | Novo Nordisk A/S | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1736917         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | FIASP, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK                                 | Novo Nordisk A/S | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
| 1736940         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | FIASP, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                                 | Novo Nordisk A/S | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1007851         | atenolool, 100mg                 | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>100MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH  | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49                     |        |        |           |            |          |
| 1007895         | atenolool, 25mg                  | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>25MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Ratiopharm GmbH  | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49                     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1007873         | atenolool, 50mg                  | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Ratiopharm GmbH  | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49                     |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1610536         | atomoksetiin, 10mg               | N06BA09  | ATOMINEX 10MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmane<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |             |             |        |           |            | vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid   |
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1610615     | atomoksetiin, 18mg            | N06BA09  | ATOMINEX 18MG, kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmane<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivne või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1610693         | atomoksetiin, 25mg               | N06BA09  | ATOMINEX 25 MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmane<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |             |             |        |           |            | vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid   |
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1610772     | atomoksetiin, 40mg            | N06BA09  | ATOMINEX 40 MG, kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmane<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivne või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1610851     | atomoksetiin, 60mg            | N06BA09  | ATOMINEX 60 MG, kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmane<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |   |                             |                  |   |        |        |           |            | metüülfenidaat on vastunäidustatud, ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1138047         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | KRKA, d.d., Novo mesto      | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |        |        |           |            |   |
| 1180213         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Zentiva k.s.                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
| 1397741         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
| 1410657         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1541911         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK    | TAD Pharma GmbH           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1707892         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1138058         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1180235         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TORVACARD 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK     | Zentiva k.s.              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1397909         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1397932         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1410792         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.               | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1542057         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK  | TAD Pharma GmbH                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1626140         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ZENTIVA<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.              | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1626184         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ZENTIVA<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Zentiva k.s.              | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | E10-E11, Z45-Z45,<br>I63-I63, Z95-Z95,<br>I21-I21, I65-I66, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I70.2-I70.2,<br>I11-I12  |        |        |           |            |          |
| 1708062         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK          | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1220993         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1410927         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.          | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1542192         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK    | TAD Pharma GmbH           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1708220         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1124996         | atorvastatiin, 80mg              | C10AA05  | SORTIS 80 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Upjohn EESV               | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1768316         | atorvastatiin+esetimiib,<br>10mg+10mg | C10BA05  | TORZELIP, tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                       |          |                         |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                       |          |                         |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |                                       |          |                         |                 | 50               |   |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1768349         | atorvastatiin+esetimiib,<br>20mg+10mg | C10BA05  | TORZELIP, tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |                                       |          |                         |                 | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                         |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                       |          |                         |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1768372         | atorvastatiin+esetimiib,<br>40mg+10mg | C10BA05  | TORZELIP, tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                         |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |                                       |          |                         |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                       |          |                         |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1768406         | atorvastatiin+esetimiib,<br>80mg+10mg     | C10BA05  | TORZELIP, tablett, 30TK       | Zentiva k.s.                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |   |          |                               |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust  |
|                 |   |          |                               |                             | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>atorvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |   |          |                               |                             | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1733767         | atorvastatiin+perindopr<br>iil, 40mg+10mg | C10BX15  | EUVASCOR, kõvakapsel,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |            | kui samaaegselt on<br>täidetud atorvastatiini<br>kõrgema<br>soodusmääraga (75%<br>või 100%)<br>väljakirjutamise<br>tingimused  |
|                 |   |          |                               |                             | 50               |   |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1733677         | atorvastatiin+perindopr<br>iil, 40mg+5mg | C10BX15  | EUVASCOR, kõvakapsel,<br>30TK            | Les Laboratoires<br>Servier      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                                      |                                 |        |           |            | kui samaaegselt on<br>täidetud atorvastatiini<br>kõrgema<br>soodusmääraga (75%<br>või 100%)<br>väljakirjutamise<br>tingimused |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
| 1039250         | atsetüülsüsteiin,<br>600mg               | R05CB01  | ACC LONG, kihisev tablett,<br>10TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater       | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 50               | J84-J84  |                                 |        |           |            |   |
| 1515248         | atsetüülsüsteiin,<br>600mg               | R05CB01  | MUCOVIT, kihisev tablett,<br>12TK        | PharmaEstica<br>Manufacturing OÜ | 50               | J84-J84  |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog       | esmane |           |            |   |
| 1778542         | atsikloviir, 30mg 1g                     | S01AD03  | ACICLOVIR AGEPHA,<br>silmasalv, 4.5g 1TK | AGEPHA Pharma s.r.o              | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
| 1165384         | atsikloviir, 400mg                       | J05AB01  | ACIC 400 MG, tablett, 35TK               | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | D60-D64  | Hematoloog,<br>Pediaater        |        |           |            |   |
| 1738289         | atsikloviir, 400mg                       | J05AB01  | ACIC 400 MG, tablett, 35TK               | Globalex Pharma OÜ               | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | D60-D64  | Hematoloog,<br>Pediaater        |        |           |            |   |
| 1836413         | atsikloviir, 400mg                       | J05AB01  | ACIC 400 MG, tablett, 35TK               | UAB "Lex ano"                    | 100              | D60-D64  | Hematoloog,<br>Pediaater        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
| 1000731         | atsitreiin, 10mg                         | D05BB02  | NEOTIGASON, kõvakapsel,<br>30TK          | Actavis Group PTC ehf            | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                  | 75               | L40-L40, Q82.8-<br>Q82.8, L86-L86,<br>M07-M07, Q80-Q80,<br>L43-L43 | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------|------------------|--|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1834365         | atsitreiin, 10mg                           | D05BB02  | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK                   | First Pharma OÜ         | 75               | L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43 | Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                         | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1019483         | batsitrasiin+neomütsiin, 250RÜ+5000RÜ 1g   | D06AX80  | BANEOCIN, salv, 20g 1TK                        | Sandoz GmbH             | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1117640         | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml          | L03AB07  | REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK          | Merck Europe B.V.       | 100              | G35-G35  | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks   |
| 1430671         | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml          | L03AB07  | REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK      | Merck Europe B.V.       | 100              | G35-G35  | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks   |
| 1591286         | beeta-1a-interferoon, 60mcg 1ml            | L03AB07  | AVONEX PEN, süstelahus pen-süstlis, 0.5ml 4TK  | Biogen Netherlands B.V. | 100              | G35-G35  | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks   |
| 1657953         | beeta-1a-peginterferoon, 125mcg 0.5ml      | L03AB13  | PLEGRIDY, süstelahus, 0.5ml 2TK                | Biogen Netherlands B.V. | 100              | G35-G35  | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1657975         | beeta-1a-peginterferoon, 63mcg/94mcg 0.5ml | L03AB13  | PLEGRIDY, süstelahus, 1TK / 1TK                | Biogen Netherlands B.V. | 100              | G35-G35  | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1071245         | beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml           | L03AB08  | BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK | Bayer AG                | 100              | G35-G35  | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi raviks   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1361393         | beeta-1b-interferoon,<br>300mcg                   | L03AB08  | EXTAVIA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 15TK | Novartis Europharm<br>Limited        | 100              | G35-G35                  | Neuroloog                        | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks |
| 1205435         | beetaepoetiin,<br>10000RÜ 0.6ml                   | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 6TK   | Roche Registration<br>GmbH           | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                      | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                      | 100              | D63-D63, T86-T86         | Pediaater, Uroloog,<br>Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral                    |
| 1236912         | beetahistiin, 16mg                                | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS,<br>tablett, 60TK           | Actavis Group PTC ehf                | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1480878         | beetahistiin, 16mg                                | N07CA01  | VERTIMED 16MG, tablett,<br>60TK                 | Medochemie Limited                   | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1115738         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETASERC, tablett, 50TK                         | Mylan Healthcare SIA                 | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1480957         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | VERTIMED 24MG, tablett,<br>50TK                 | Medochemie Limited                   | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1515833         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS,<br>tablett, 50TK           | Actavis Group PTC ehf                | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1620245         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETASERC, suus<br>dispergeeruv tablett, 60TK    | Mylan IRE Healthcare<br>Limited      | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1741834         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETAHISTINE ACCORD,<br>tablett, 50TK            | Accord Healthcare<br>B.V.            | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1827064         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETASERC, tablett, 60TK                         | UAB "Lex ano"                        | 50               | H81-H81                  |                                  |        |           |            |   |
| 1004870         | beetametasoon, 1mg<br>1g                          | D07AC01  | BETNOVATE CREAM,<br>kreem, 15g 1TK              | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1007514         | beetametasoon+fusidii<br>nhape, 1mg+20mg 1g       | D07CC80  | FUCICORT, kreem, 15g 1TK                        | LEO Pharma A/S                       | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1062403         | beetametasoon+salitsü<br>ülhape, 0,5mg+20mg<br>1g | D07BC80  | DIPROSALIC, nahalahus,<br>50ml 1TK              | N.V. Organon                         | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1286197         | betaiin, 1g 1g                   | A16AA06  | CYSTADANE, suukaudne pulber, 180g 1TK           | Recordati Rare Diseases             | 100              | E72.1-E72.1 | Kardioloog,<br>Neuroloog,<br>Pediaater,<br>Endokrinoloog,<br>Sisearst | esmane |           |            | lisaraviks tsüstationiini beetasüntaasi, 5,10-metüleentetrahydrofoladi reduktaasi, kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral patsientidele, kelle ravi vitamiin B6, foolhappe, vitamiin B12 ja eridieediga pole piisav   |
| 1034042         | betaksolool, 2,5mg 1ml           | S01ED02  | BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK   | SIA Novartis Baltics                | 100              | H40-H42     | Oftalmoloog   | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |             |   |        |           |            |  |
| 1012194         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Laboratoires Juvise Pharmaceuticals | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 100              | C61-C61     | Onkoloog, Uroloog   |        |           |            | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258017         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMIDE - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Teva Pharma B.V.      | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1266173         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMID ACTAVIS<br>150MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1776900         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMIDE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>B.V.              | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | kui haigus on pärast<br>kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoossest<br>kastratsioonist)         |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |                   |        |           |            |  |
| 1026560         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Laboratoires Juvise<br>Pharmaceuticals | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoossest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |                   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1257803         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMIDE - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK         | Teva Pharma B.V.      | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1265891         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMID ACTAVIS<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|--|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1293791         | bicalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMIDE ACCORD<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | C61-C61                                | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1258983         | bisoprolool, 10mg                | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 30TK                                   | Vitalans Oy               | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |                   |        |           |            |   |
| 1259029         | bisoprolool, 10mg                | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 100TK                                  | Vitalans Oy               | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |                   |        |           |            |   |
| 1596427         | bisoprolool, 10mg                | C07AB07  | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1683952         | bisoprolool, 10mg                | C07AB07  | BISOPROLOL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK           | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |                   |        |           |            |   |
| 1804115         | bisoprolool, 10mg                | C07AB07  | BISOPROLOL ZENTIVA,<br>tablett, 30TK                                      | Zentiva k.s.              | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |                   |        |           |            |   |
| 1683794         | bisoprolool, 2,5mg               | C07AB07  | BISOPROLOL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK           | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|--|
| 1258905         | bisoprolool, 5mg                 | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 30TK                                   | Vitabalans Oy             | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |  |        |           |            |  |
| 1258949         | bisoprolool, 5mg                 | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 100TK                                  | Vitabalans Oy             | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |  |        |           |            |  |
| 1596326         | bisoprolool, 5mg                 | C07AB07  | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |  |        |           |            |  |
| 1683873         | bisoprolool, 5mg                 | C07AB07  | BISOPROLOL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK           | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |  |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |  |        |           |            |  |
| 1804058         | bisoprolool, 5mg                 | C07AB07  | BISOPROLOL ZENTIVA,<br>tablett, 30TK                                      | Zentiva k.s.              | 50               |  |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, I47-I49 |  |        |           |            |  |
| 1586718         | bosentaan, 125mg                 | C02KX01  | BOSENTAN NORAMEDA<br>125 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | UAB Norameda              | 50               |  |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                            | Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafiliil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1628759         | bosentaan, 125mg                 | C02KX01  | BOSENTAN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK              | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafiliil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1586684         | bosentaan, 62,5mg                | C02KX01  | BOSENTAN NORAMEDA<br>62,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | UAB Norameda              | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafiliil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1628737         | bosentaan, 62,5mg                | C02KX01  | BOSENTAN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |             |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1612055         | bosutiniib, 100mg                | L01EA04  | BOSULIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>hematoloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>patsientidele, kellele<br>on näidustatud<br>tsütogeneetilist vastust<br>indutseeriv ravi, eelnev<br>ravi imatiniibiga<br>annuses 600mg on<br>ebaõnnestunud või<br>osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on<br>põhjustanud III või IV<br>astme kõrvaltoime või<br>üle 3 kuu püsinud II<br>astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni<br>järgi) ning ravi<br>alustatakse kuni<br>kolmanda rea ravina;<br>ravi võib jätkata kuni<br>hematoloogilise<br>ravivastuse püsimiseni<br>(haigus ei<br>progresseeru<br>bosutiniibravi foonil).<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>bosutiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1.07.2016. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1612077         | bosutiniib, 500mg                | L01EA04  | BOSULIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>hematoloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>patsientidele, kellele<br>on näidustatud<br>tsütogeneetilist vastust<br>indutseeriv ravi, eelnev<br>ravi imatiniibiga<br>annuses 600mg on<br>ebaõnnestunud või<br>osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on<br>põhjustanud III või IV<br>astme kõrvaltoime või<br>üle 3 kuu püsinud II<br>astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni<br>järgi) ning ravi<br>alustatakse kuni<br>kolmanda rea ravina;<br>ravi võib jätkata kuni<br>hematoloogilise<br>ravivastuse püsimiseni<br>(haigus ei<br>progresseeru<br>bosutiniibravi foonil).<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>bosutiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1.07.2016. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1783289         | brigatiniib, 180mg                         | L01ED04  | ALUNBRIG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Takeda Pharma A/S                | 100              | C34-C34          | Onkoloog                    |        |           |            | anaplastilise<br>lümfoomkineaaspositiivs<br>e kaugelearenenud<br>varem ravimata<br>mitteväikerakkopsuvä<br>hi raviks heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>2) täiskasvanud<br>patsientidele |
| 1806870         | brigatiniib, 30mg                          | L01ED04  | ALUNBRIG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Takeda Pharma A/S                | 100              | C34-C34          | Onkoloog                    |        |           |            | anaplastilise<br>lümfoomkineaaspositiivs<br>e kaugelearenenud<br>varem ravimata<br>mitteväikerakkopsuvä<br>hi raviks heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>2) täiskasvanud<br>patsientidele |
| 1042782         | brinsolamiid, 10mg 1ml                     | S01EC04  | AZOPT, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                  | Novartis Europharm<br>Limited    | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                 | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1581230         | brinsolamiid, 10mg 1ml                     | S01EC04  | BRINZOLAMIDE ELVIM,<br>silmatilgad, suspensioon, 5ml<br>1TK  | SIA Elvim                        | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                 | esmane |           |            |  |
| 1723047         | brinsolamiid, 10mg 1ml                     | S01EC04  | BRINZOLAMIDE SANDOZ,<br>silmatilgad, suspensioon, 5ml<br>1TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                 | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1657694         | brinsolamiid+brimonidii<br>n, 10mg+2mg 1ml | S01EC80  | SIMBRINZA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK              | Novartis Europharm<br>Limited    | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                 | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1531459         | bromofenak, 0,9mg<br>1ml                   | S01BC11  | YELLOX, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                       | Bausch + Lomb Ireland<br>Limited | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1008098         | bromokriptiin, 2,5mg                       | G02CB01  | BROMOCRIPTIN-RICHTER,<br>tablett, 30TK                       | Gedeon Richter Plc.              | 100              | E24-E24, E22-E22 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 100              | G20-G20          | Neuroloog                   | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1038316         | budesoniid, 0,25mg<br>1ml                  | R03BA02  | PULMICORT, nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK           | AstraZeneca AB                   | 75               | J45-J45          |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                  |                             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused        |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1124390         | budesoniid, 200mcg               | R03BA02  | MIFLONIDE BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK           | SIA Novartis Baltics                       | 75               | J45-J45                               |                                    |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
| 1174160         | budesoniid, 200mcg<br>1annust    | R03BA02  | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annust 1TK                   | Orion Corporation                          | 75               | J45-J45                               |                                    |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
| 1124413         | budesoniid, 400mcg               | R03BA02  | MIFLONIDE BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK           | SIA Novartis Baltics                       | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | J45-J45                               |                                    |        |           |            |                 |
| 1174182         | budesoniid, 400mcg<br>1annust    | R03BA02  | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annust 1TK                   | Orion Corporation                          | 75               | J45-J45                               |                                    |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
| 1011070         | budesoniid, 50mcg<br>1annust     | R01AD05  | BUDESONID SANDOZ,<br>ninasprei, suspensioon,<br>200annust 1TK               | Sandoz GmbH                                | 75               | J30-J30                               |                                    |        |           | 17,00      |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
| 1643655         | budesoniid, 9mg                  | A07EA06  | BUDESONIDE FERRING,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Ferring GmbH                               | 75               | K51-K51                               | Gastroenteroloog                   |        |           |            |                 |
| 1232660         | bupropioon, 150mg                | N06AX12  | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited       | 50               | F33-F33, F32-F32                      |                                    |        |           |            |                 |
| 1232693         | bupropioon, 300mg                | N06AX12  | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited       | 50               | F33-F33, F32-F32                      |                                    |        |           |            |                 |
| 1005006         | busulfaan, 2mg                   | L01AB01  | MYLERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                      | Aspen Pharma Trading<br>Limited            | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | C00-D48                               | Hematoloog,<br>Pediaater, Onkoloog |        |           |            |                 |
| 1343382         | dabigatraaneteksilaat,<br>110mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                    |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |
| 1343393         | dabigatraaneteksilaat,<br>110mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                    |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I48-I48                               |                                    |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                       |                                    |        |           |            |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1343405         | dabigatraaneteksilaat, 110mg     | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 60TK   | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75               | I48-I48                           |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |   | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17 |          |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |                                  |          |                             |   | 50               |                                   |          |        |           |            |   |
| 1538759         | dabigatraaneteksilaat, 150mg     | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 60TK   | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50               |                                   |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |   | 75               | I48-I48                           |          |        |           |            |   |
| 1343360         | dabigatraaneteksilaat, 75mg      | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK   | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50               |                                   |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |   | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-S72.7, M16-M17 |          |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
| 1624160         | dabrafeniib, 75mg                | L01EC02  | TAFINLAR, kõvakapsel, 120TK | Novartis Europharm Limited              | 100              | C43-C43                           | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1598654         | dapaglifloosin, 10mg             | A10BK01  | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | AstraZeneca AB  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel on vähenenud<br>vasaku vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF≤40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikraviga<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1598609         | dapaglifloosin, 5mg              | A10BK01  | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | AstraZeneca AB  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel on vähenenud<br>vasaku vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikraviga<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1814699         | darolutamiid, 300mg              | L02BB06  | NUBEQA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Bayer AG        | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | konsiiliumi (kaks<br>onkoloogi ja uroloog)<br>otsuse alusel<br>mittemetastaatilise<br>kastratsioonresistentse<br>eesnäärmevähi raviks<br>heas üldseisundis<br>(ECOG 0-1)<br>patsientidele, kellel on<br>kõrge risk<br>(PSADT<=10 kuud)<br>metastaatilise haiguse<br>tekkeks ja kes ei ole<br>saanud eelnevalt ravi<br>teise põlvkonna<br>androgeeniretseptori<br>inhibiitoriga või on see<br>ravi katkestatud<br>kõrvaltoimete tõttu.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>darolutamiidiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1.01.2022. a |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1275768         | dasatiniib, 50mg                 | L01EA02  | SPRYCEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi(vähemalt 3<br>hematoloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>patsientidele,kellele on<br>näidustatud<br>tsütogeneetilist vastust<br>indutseeriv ravi, eelnev<br>ravi imatiniibiga<br>annuses 600mg on<br>ebaõnnestunud või<br>osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on<br>põhjustanud III või IV<br>astme kõrvaltoime või<br>üle 3 kuu püsinud II<br>astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni<br>järgi) ning ravi<br>alustatakse kuni<br>kolmanda rea ravina;<br>ravi võib jätkata kuni<br>hematoloogilise<br>ravivastuse püsimiseni<br>(haigus ei<br>progresseeru<br>dasatiniibravi foonil).<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>dasatiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2009.<br>a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1713956         | deferasiroks, 180mg              | V03AC03  | EXJADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on >1000<br>mcg/l; esineb jätkuv<br>regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1809570         | deferasiroks, 180mg              | V03AC03  | DEFERASIROX ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on<br>>1000mcg/l; esineb<br>jätkuv regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1713989         | deferasiroks, 360mg              | V03AC03  | EXJADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on >1000<br>mcg/l; esineb jätkuv<br>regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1809615         | deferasiroks, 360mg   | V03AC03  | DEFERASIROX ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on<br>>1000mcg/l; esineb<br>jätkuv regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vere loome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |
| 1605574         | degludek-insuliin,<br>100ühik 1ml                           | A10AE06  | TRESIBA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK                     | Novo Nordisk A/S            | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1         |            |        |           |            |   |
| 1605619         | degludek-insuliin,<br>200ühik 1ml                           | A10AE06  | TRESIBA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 3TK                     | Novo Nordisk A/S            | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1         |            |        |           |            |   |
| 1607295         | degludek-<br>insuliin+aspart-insuliin,<br>70ühik+30ühik 1ml | A10AD06  | RYZODEG, süstelahus, 3ml<br>5TK                                  | Novo Nordisk A/S            | 100              | E10-E11, E13-E14   |            |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1014972         | deksametasoon,<br>0,5mg          | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>tablett, 10TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto             | 75               | L12-L12, L23-L23,<br>L13.0-L13.0, L10-<br>L10, L20-L20     | Dermatoveneroloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog                                    | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | C00-D48  |  |        |           |            |          |
| 1647143         | deksametasoon,<br>0,985mg 1g     | S01BA01  | DEXAGEL, silmageel, 5g 1TK                    | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |  |  |        |           |            |          |
| 1007479         | deksametasoon, 1mg<br>1ml        | S01BA01  | OFTAN DEXA, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK    | Santen Oy                             | 50               |  |  |        |           |            |          |
| 1124288         | deksametasoon, 1mg<br>1ml        | S01BA01  | MAXIDEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | SIA Novartis Baltics                  | 50               |  |  |        |           |            |          |
| 1671780         | deksametasoon, 20mg              | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>tablett, 20TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto             | 75               | L12-L12, L23-L23,<br>L13.0-L13.0, L10-<br>L10, L20-L20     | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog                                    | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | C00-D48  |  |        |           |            |          |
| 1792874         | deksametasoon, 20mg              | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>tablett, 20TK           | First Pharma OÜ                       | 50               |  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | C00-D48  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 75               | L12-L12, L23-L23,<br>L13.0-L13.0, L10-<br>L10, L20-L20     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater                                    | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1808748         | deksametasoon, 20mg              | H02AB02  | NODEXON, tablett, 20TK           | UAB Norameda           | 100              | T86-T86, C00-D48, Z94-Z94                           |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Pediaater, Endokrinoloog                             | esmane |           |            |          |
| 1671667         | deksametasoon, 4mg               | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK | KRKA, d.d., Novo mesto | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                    |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog, Pediaater                             | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 100              | C00-D48   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 50               |   |  |        |           |            |          |
| 1792773         | deksametasoon, 4mg               | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK | First Pharma OÜ        | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                    |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog, Pediaater                             | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                        | 100              | C00-D48   |  |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|------------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1808669         | deksametasoon, 4mg                               | H02AB02  | NODEXON, tablett, 20TK                  | UAB Norameda           | 100              | T86-T86, C00-D48, Z94-Z94                           |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Pediaater, Endokrinoloog                             | esmane |           |            |          |
| 1862669         | deksametasoon, 4mg                               | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA, tablett, 20TK        | UAB "Lex ano"          | 100              | T86-T86, C00-D48, Z94-Z94                           |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Dermatoveneroloog, Pediaater, Allergoloog-immunoloog |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Pediaater, Endokrinoloog                             | esmane |           |            |          |
| 1008414         | deksametasoon, 4mg<br>1ml                        | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 100              | C00-D48   |  |        |           |            |          |
| 1808704         | deksametasoon, 8mg                               | H02AB02  | NODEXON, tablett, 20TK                  | UAB Norameda           | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Pediaater, Endokrinoloog                             | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 100              | T86-T86, C00-D48, Z94-Z94                           |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                        | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
| 1044379         | deksametasoon+kloor<br>amfenikool, 1mg+2mg<br>1g | S01CA82  | OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK  | Santen Oy              | 50               |   |  |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1044368         | deksametasoon+kloor<br>amfenikool, 1mg+2mg<br>1ml                        | S01CA82  | OFTAN DEXA-CHLORA,<br>silmatilgad, lahus, 10ml 1TK                   | Santen Oy                 | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1124301         | deksametasoon+neom<br>ütsiin+polümüksiin B,<br>1mg+3500RÜ+6000R<br>Ü 1ml | S01CA80  | MAXITROL, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                       | SIA Novartis Baltics      | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1150276         | deksametasoon+tobra<br>mütsiin, 1mg+3mg 1g                               | S01CA81  | TOBRADEX, silmasalv, 3.5g<br>1TK                                     | SIA Novartis Baltics      | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1124266         | deksametasoon+tobra<br>mütsiin, 1mg+3mg 1ml                              | S01CA81  | TOBRADEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                       | SIA Novartis Baltics      | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1481857         | denosumab, 60mg 1ml  | M05BX04  | PROLIA, süstelahus süstlis,<br>1ml 1TK                               | Amgen Europe B.V.         | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                           | 75               | M80-M80     |                             |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna ja kellel<br>esineb kaasvalt raske<br>neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia,<br>striktuur, düskineesia<br>või põletik (N17-19;<br>K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20) |
| 1653937         | desloratadiin, 0,5mg<br>1ml  | R06AX27  | DES LorATADINE<br>SOPHARMA, suukaudne<br>lahus, 120ml 1TK            | Sopharma AD               | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1550797         | desloratadiin, 5mg   | R06AX27  | DASSELTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1554140         | desloratadiin, 5mg   | R06AX27  | DES LorATADINE ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf     | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1064348         | desmopressiin, 10mcg<br>1annust  | H01BA02  | MINIRIN, ninasprei, lahus,<br>2.5ml 1TK                              | Ferring GmbH              | 100              | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                           | 50               |             |                             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1225594         | desmopressiin,<br>120mcg   | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne<br>lüofilisaat, 30TK                       | Ferring GmbH                    | 100              | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1225561         | desmopressiin, 60mcg   | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne<br>lüofilisaat, 30TK                       | Ferring GmbH                    | 50               |             |                             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 100              | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1063303         | desogestreel, 75mcg  | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK       | N.V. Organon                    | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1505450         | desogestreel, 75mcg  | G03AC09  | DESIRETT 75 MCG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB "Exeltis Baltics"           | 50               |             |                             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1656143         | desogestreel, 75mcg  | G03AC09  | DELAMONIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.  | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1861882         | desogestreel, 75mcg  | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK       | UAB Ideal Trade Links           | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1062920         | desogestreel+etünnüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,02mg                | G03AA09  | NOVYNETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK       | Gedeon Richter Plc.             | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1062931         | desogestreel+etünnüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,03mg                | G03AA09  | REGULON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK         | Gedeon Richter Plc.             | 50               |             |                             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1161458         | desogestreel+etünnüülö<br>stradiool,<br>25mcg+40mcg/125mc<br>g+30mcg | G03AB05  | GRACIAL, tablett, 21TK /<br>45TK                              | Aspen Pharma Trading<br>Limited | 50               |             |                             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1208045         | detemir-insuliin,<br>100ühik 1ml                   | A10AE05  | LEVEMIR FLEXPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                | Novo Nordisk A/S                   | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |            |        |           |            |   |
| 1007659         | diasepaam, 10mg<br>2.5ml                           | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 5TK                                | Desitin Arzneimittel<br>GmbH       | 50               |  |            |        |           |            |   |
| 1007682         | diasepaam, 5mg 2.5ml                               | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 5TK                                | Desitin Arzneimittel<br>GmbH       | 50               |  |            |        |           |            |   |
| 1385276         | dienogest, 2mg                                     | G03DB08  | VISANNETTE, tablett, 28TK   | Bayer AG                           | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | N80-N80  | Günekoloog |        |           |            |   |
| 1587146         | dienogest+etünüülöstr<br>adiool,<br>0+0/2mg+0,03mg | G03AA16  | SIBILLA PLUS, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK<br>/ 21TK      | Gedeon Richter Plc.                | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | Z30-Z30  |            |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1066834         | dienogest+etünüülöstr<br>adiool, 2mg+0,03mg        | G03AA16  | JEANINE, kaetud tablett,<br>21TK                                      | Bayer AG                           | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | Z30-Z30  |            |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1305818         | dienogest+etünüülöstr<br>adiool, 2mg+0,03mg        | G03AA16  | AMMILY 2 MG / 0,03 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK   | UAB Orivas                         | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | Z30-Z30  |            |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1070592         | digoksiin, 0,25mg                                  | C01AA05  | DIGOXIN-GRINDEKS, tablett,<br>50TK                                    | AS Grindeks                        | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | I50-I50  |            |        |           |            |   |
| 1222209         | digoksiin, 0,25mg                                  | C01AA05  | DIGOXIN ORIFARM 0,25<br>MG, tablett, 60TK                             | Orifarm Healthcare<br>A/S          | 75               | I50-I50  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 50               |  |            |        |           |            |   |
| 1222197         | digoksiin, 62,5mcg                                 | C01AA05  | DIGOXIN ORIFARM 62,5<br>MCG, tablett, 60TK                            | Orifarm Healthcare<br>A/S          | 50               |  |            |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | I50-I50  |            |        |           |            |   |
| 1361786         | dihüdrokodeiin, 60mg                               | N02AA08  | DHC CONTINUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 10TK | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 50               |  |            |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1016109         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOBERL RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK      | Berlin-Chemie AG               | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1017133         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>100 MG, rektaalsuposiit, 10TK                            | Ratiopharm GmbH                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1032589         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOMELAN RETARD 100<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH               | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1039632         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | OLFEN DEPOCAPS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 20TK        | Teva B.V.                      | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1078163         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLAC 100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1594425         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | NAKLOFEN SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1594436         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | NAKLOFEN SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1071920         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 20TK             | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1071942         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 100TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1072280         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>UNO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Ratiopharm GmbH                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1032590         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOMELAN 50 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>10TK                                | G.L. Pharma GmbH               | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1072213         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>50MG, gastroresistentne<br>tablett, 50TK                      | Ratiopharm GmbH                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos                  | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1012048     | diklofenak, 75mg                 | M01AB05  | OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK      | Teva B.V.                     | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 50           |                           |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 100          | C00-D48                   |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 75           | M15-M19                   |                       |        | 63,00     |            |  |
| 1071986     | diklofenak, 75mg                 | M01AB05  | DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK   | Sandoz Pharmaceuticals d.d.   | 75           | M15-M19                   |                       |        | 63,00     |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 100          | C00-D48                   |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 75           | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 50           |                           |                       |        |           |            |  |
| 1614372     | diklofenak+omeprasool, 75mg+20mg | M01AB82  | DICLOPRAM, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK       | Bausch Health Ireland Limited | 50           |                           |                       |        |           |            |  |
| 1031634     | diltiaseem, 180mg                | C08DB01  | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH              | 50           |                           |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 100          | I27.0-I27.0               |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 75           | I47-I49                   | Pediaater, Kardioloog | esmane |           |            |  |
| 1031645     | diltiaseem, 90mg                 | C08DB01  | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH              | 100          | I27.0-I27.0               |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 50           |                           |                       |        |           |            |  |
|             |                                  |          |  |                               | 75           | I47-I49                   | Kardioloog, Pediaater | esmane |           |            |  |
| 1638693     | dimetüülfumaraat, 120mg          | L04AX07  | TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK                          | Biogen Netherlands B.V.       | 100          | G35-G35                   | Neuroloog             | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks |
| 1638705     | dimetüülfumaraat, 240mg          | L04AX07  | TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK                          | Biogen Netherlands B.V.       | 100          | G35-G35                   | Neuroloog             | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks |
| 1028214     | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK   | Upjohn EESV                   | 50           |                           |                       |        |           |            |  |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------------|--------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1071391     | doksasosiin, 2mg              | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo mesto | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1028225     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK  | Upjohn EESV            | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1071379     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo mesto | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1129799     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Upjohn EESV            | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1205895     | doksasosiin, 4mg              | C02CA04  | DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK        | Stada Arzneimittel AG  | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1018303     | doksütsükliin, 100mg          | J01AA02  | DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK                                   | Stada Arzneimittel AG  | 100          | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                        | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1065877     | doksütsükliin, 100mg          | J01AA02  | DOXYCYCLINE VITABALANS, tablett, 10TK                             | Vitabalans Oy          | 100          | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                        | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1065899     | doksütsükliin, 100mg          | J01AA02  | DOXYLAN, tablett, 10TK  | G.L. Pharma GmbH       | 50           |          |                   |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                        | 100          | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
| 1144976     | doksütsükliin, 100mg          | J01AA02  | DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK                           | Ratiopharm GmbH        | 50           |          |                   |        |           |            |          |
|             |                               |          |   |                        | 100          | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
| 1240366     | domperidoon, 10mg             | A03FA03  | DOMPERIDON ACTAVIS, tablett, 30TK                                 | Actavis Group PTC ehf  | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1292206     | donepesiil, 10mg              | N06DA02  | DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Actavis Group PTC ehf  | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1391217     | donepesiil, 10mg              | N06DA02  | DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | Accord Healthcare B.V. | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1453924     | donepesiil, 10mg              | N06DA02  | YASNAL Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 28TK                     | KRKA, d.d., Novo mesto | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1292105     | donepesiil, 5mg               | N06DA02  | DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Actavis Group PTC ehf  | 50           |          |                   |        |           |            |          |
| 1391116     | donepesiil, 5mg               | N06DA02  | DONEPEZIL ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | Accord Healthcare B.V. | 50           |          |                   |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1453823         | donepesiil, 5mg                                       | N06DA02  | YASNAL Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto        | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1014961         | dorsolamiid, 2%                                       | S01EC03  | TRUSOPT, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                        | Santen Oy                        | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
| 1420108         | dorsolamiid, 20mg 1ml                                 | S01EC03  | DORZOLAMIDE ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 5ml 1TK              | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                  | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1755480         | dorsolamiid, 20mg 1ml                                 | S01EC03  | VIZIDOR, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                        | Bausch Health Ireland<br>Limited | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
| 1454093         | dronedaroon, 400mg                                    | C01BD07  | MULTAQ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK           | Sanofi-Aventis Groupe            | 50               |          | Kardioloog  | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>kardioloogil siinusrütmi<br>säilitamiseks kodade<br>virvendusarütmia<br>puhul pärast<br>kardioversiooni, kui<br>teised antiarütmikumid<br>on ebasobivad (IC<br>klassi antiarütmikumid<br>ja sotalool on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>amiodaroon on<br>vastunäidustatud) ning<br>patsiendil ei esine<br>südamepuudulikkust<br>ega vasaku vatsakese<br>düsfunksiooni |
| 1316090         | drospirenoon+etünüülö<br>stradiool,<br>0+0/3mg+0,02mg | G03AA12  | YAZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK<br>/ 24TK        | Bayer AG                         | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1331378         | drospirenoon+etünüülö<br>stradiool,<br>0+0/3mg+0,02mg | G03AA12  | MARIONELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK<br>/ 21TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 75               | Z30-Z30  |             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
|                 |   |          |  |                                  | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1453766         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiool,<br>0+0/3mg+0,02mg | G03AA12  | DAYLETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK<br>/ 24TK      | Gedeon Richter Plc.            | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1220487         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiool, 3mg+0,02mg        | G03AA12  | YASMINELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK          | Bayer AG                       | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1330759         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiool, 3mg+0,02mg        | G03AA12  | MADELEINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1331019         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiool, 3mg+0,02mg        | G03AA12  | JANGEE 0,02 MG/3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK | UAB "Exeltis Baltics"          | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1043536         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiool, 3mg+0,03mg        | G03AA12  | YARINA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK              | Bayer AG                       | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1331053         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiool, 3mg+0,03mg        | G03AA12  | JANGEE 0,03 MG/3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK | UAB "Exeltis Baltics"          | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1165711         | drospirenoon+östradio<br>ol, 2mg+1mg                   | G03FA17  | ANGELIQ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Bayer AG                       | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1670745         | dulaglutiid, 1,5mg<br>0.5ml      | A10BJ05  | TRULICITY, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.5ml 4TK            | Eli Lilly Nederland B.V.  | 75               | E14-E14, E11-E11             |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               | E14-E14, E11-E11             |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |
| 1195624         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | CYMBALTA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK          | Eli Lilly Nederland B.V.  | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1660643         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | DULSEVIA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
| 1661677         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | DULOXETINE ACCORD,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1661701         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | DULOXGAMMA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK         | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
| 1670419         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | ONELAR, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                | Medochemie Limited             | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1694921         | duloksetiin, 30mg                | N06AX21  | DULOXETINE ZENTIVA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK | Zentiva k.s.                   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
| 1195635         | duloksetiin, 60mg                | N06AX21  | CYMBALTA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK           | Eli Lilly Nederland B.V.       | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G63.2-G63.2                  |             |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1660733         | duloksetiin, 60mg                | N06AX21  | DULSEVIA, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK          | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                          |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                        | 75               | G63.2-G63.2              |             |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                        | 75               | G43-G43                  |             |        |           |            |   |
| 1661699         | duloksetiin, 60mg                | N06AX21  | DULOXETINE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 75               | G43-G43                  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                        | 75               | G63.2-G63.2              |             |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1661745         | duloksetiin, 60mg                | N06AX21  | DULOXGAMMA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | G63.2-G63.2                  |             |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1670510         | duloksetiin, 60mg                | N06AX21  | ONELAR, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK        | Medochemie Limited             | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G63.2-G63.2                  |             |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1694954         | duloksetiin, 60mg                                | N06AX21  | DULOXETINE ZENTIVA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK  | Zentiva k.s.                                   | 75               | G43-G43   |                              |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 50               |   |                              |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | G63.2-G63.2   |                              |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |  |          |   |  | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3                          | Psühhiaater                  | esmane |           |            |   |
| 1155440         | dutasteriid, 0,5mg                               | G04CB02  | AVODART, pehmekapsel,<br>30TK                                 | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1539929         | dutasteriid, 0,5mg                               | G04CB02  | DUTASTERIDE TEVA,<br>pehmekapsel, 30TK                        | Teva Pharma B.V.                               | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1707241         | dutasteriid, 0,5mg                               | G04CB02  | DUTRYS, pehmekapsel,<br>30TK                                  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                      | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1787137         | dutasteriid, 0,5mg                               | G04CB02  | DUTASTERIDE ELVIM,<br>pehmekapsel, 30TK                       | SIA Elvim                                      | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1054752         | düdrogesteroon, 10mg                             | G03DB01  | DUPHASTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK       | Mylan Healthcare SIA                           | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana  |
|                 |  |          |   |  | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1013803         | düdrogesteroon+östra<br>diool,<br>0+1mg/10mg+1mg | G03FB08  | FEMOSTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK / 14TK | Mylan Healthcare SIA                           | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana  |
|                 |  |          |   |  | 50               |   |                              |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1375332         | düdrogesteroon+östra<br>diol, 2,5mg+0,5mg | G03FA14  | FEMOSTON CONTI 0,5<br>MG/2,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Mylan IRE Healthcare<br>Limited | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog       | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
|                 |   |          |   |                                 | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1082528         | düdrogesteroon+östra<br>diol, 5mg+1mg     | G03FA14  | FEMOSTON CONTI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Mylan Healthcare SIA            | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                 | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog       | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
| 1077937         | ebastiin, 20mg                            | R06AX22  | KESTINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                         | Almirall S.A.                   | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1691546         | edoksabaan, 30mg                          | B01AF03  | LIXIANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                         | Daiichi Sankyo Europe<br>GmbH   | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                 | 75               | I48-I48   |                                    |        |           |            |  |
| 1691658         | edoksabaan, 60mg                          | B01AF03  | LIXIANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                         | Daiichi Sankyo Europe<br>GmbH   | 75               | I48-I48   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                 | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1020373         | ekonasool, 150mg                          | G01AF05  | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 3TK  | Karo Pharma<br>Aktiebolag       | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1039036         | ekonasool, 50mg                           | G01AF05  | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                                       | Karo Pharma<br>Aktiebolag       | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1011148         | eksemestaan, 25mg                         | L02BG06  | AROMASIN, kaetud tablett,<br>30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG        | 100              | C50-C50   | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks                                 |
|                 |   |          |   |                                 | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1392780         | eksemestaan, 25mg                         | L02BG06  | ESCEPRAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto       | 100              | C50-C50   | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks                                 |
|                 |   |          |   |                                 | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1392960         | eksemestaan, 25mg                         | L02BG06  | EXEMESTANE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK               | Accord Healthcare<br>B.V.       | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                 | 100              | C50-C50   | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1423134         | eksemestaan, 25mg                     | L02BG06  | EXEMESTANE ZENTIVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | Zentiva k.s.                | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |                             | 100              | C50-C50          | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1453632         | eksemestaan, 25mg                     | L02BG06  | EXEMESTANE SANOSWISS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | UAB SanoSwiss               | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |                             | 100              | C50-C50          | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1533787         | eksenatiid, 2mg                       | A10BJ01  | BYDUREON, toimeainet<br>prolongeeritult vabastava<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti pen-süstlis, 4TK | AstraZeneca AB              | 50               | E14-E14, E11-E11 |                                       |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud   |
|                 |                                       |          |  |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                       |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
| 1725870         | elbasviir+grasopreviir,<br>50mg+100mg | J05AP54  | ZEPATIER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist    |        |           |            | 1. ja 4. genotüübi<br>kroonilise<br>progresseeruva<br>Cviirushepatiidi raviks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1462003         | eltrombopaag, 25mg               | B02BX05  | REVOLADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D69.4-D69.4 |        |        |           |            | patsientidele, kelle ravi<br>alustamine on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu<br>suukaudne ravi<br>(kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga<br>) on osutunud<br>ebaefektiivseks või on<br>vastunäidustatud,<br>splenektoomia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või on<br>vastunäidustatud (sh<br>splenektoomia<br>ettevalmistamiseks, kui<br>intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole<br>piisavalt tõhus) ning<br>esineb<br>trombotsütopeenia <20<br>000/µl |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1765784         | emitsizumab, 150mg<br>1ml        | B02BX06  | HEMLIBRA, süstelahus, 0.4ml<br>1TK | Roche Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            | hüübimisfaktori<br>inhibiitorite esinemise<br>korral  |
|                 |                                  |          |                                    |                            | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            | verejooksu episoodide<br>ennetamiseks raske A-<br>hemofiiliaga<br>patsientidele (VIII<br>faktori tase <1%<br>normiväärtusest)<br>järgnevatele<br>rühmadele: lapsed ja<br>alla 19-aastased<br>noorukid kellel on<br>raskendatud<br>veenisiseste süstete<br>teostamine ja<br>probleemse<br>veeniteega<br>täiskasvanud (kellel<br>veenisisene ravi on<br>võimalik vaid<br>meditsiinipersonali<br>poolt teostatult) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1765795         | emitsizumab, 150mg<br>1ml        | B02BX06  | HEMLIBRA, süstelahus, 0.7ml<br>1TK | Roche Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            | hüübimisfaktori<br>inhibiitorite esinemise<br>korral  |
|                 |                                  |          |                                    |                            | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            | verejooksu episoodide<br>ennetamiseks raske A-<br>hemofiiliaga<br>patsientidele (VIII<br>faktori tase <1%<br>normiväärtusest)<br>järgnevatele<br>rühmadele: lapsed ja<br>alla 19-aastased<br>noorukid kellel on<br>raskendatud<br>veenisiseste süstete<br>teostamine ja<br>probleemse<br>veeniteega<br>täiskasvanud (kellel<br>veenisisene ravi on<br>võimalik vaid<br>meditsiinipersonali<br>poolt teostatult) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1765807         | emitsizumab, 150mg<br>1ml        | B02BX06  | HEMLIBRA, süstelahus, 1ml<br>1TK | Roche Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            | hüübimisfaktori<br>inhibiitorite esinemise<br>korral  |
|                 |                                  |          |                                  |                            | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            | verejooksu episoodide<br>ennetamiseks raske A-<br>hemofiiliaga<br>patsientidele (VIII<br>faktori tase <1%<br>normiväärtusest)<br>järgnevatele<br>rühmadele: lapsed ja<br>alla 19-aastased<br>noorukid kellel on<br>raskendatud<br>veenisiseste süstete<br>teostamine ja<br>probleemse<br>veeniteega<br>täiskasvanud (kellel<br>veenisisene ravi on<br>võimalik vaid<br>meditsiinipersonali<br>poolt teostatult) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1765773         | emitsizumab, 30mg<br>1ml         | B02BX06  | HEMLIBRA, süstelahus, 1ml<br>1TK | Roche Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            | verejooksu episoodide<br>ennetamiseks raske A-<br>hemofiiliaga<br>patsientidele (VIII<br>faktori tase <1%<br>normiväärtusest)<br>järgnevatele<br>rühmadele: lapsed ja<br>alla 19-aastased<br>noorukid kellel on<br>raskendatud<br>veenisiseste süstete<br>teostamine ja<br>probleemse<br>veeniteega<br>täiskasvanud (kellel<br>veenisisene ravi on<br>võimalik vaid<br>meditsiinipersonali<br>poolt teostatult) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1649000         | empaglifloosiin, 10mg            | A10BK03  | JARDIANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | patsiendile, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikraviga<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1649134         | empagliflozin, 25mg              | A10BK03  | JARDIANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | E11-E11, E14-E14              |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF≤40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |        |        |           |            |   |
| 1010620         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENAHXAL 10 MG, tablett,<br>30TK                         | Hexal AG                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |        |        |           |            |   |
| 1013599         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | BERLIPRIL 10 MG, tablett,<br>30TK                       | Berlin-Chemie AG                           | 50               |                               |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1133929         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1359974         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK  | Vitabalans Oy          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1360011         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK | Vitabalans Oy          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1010631         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK        | Hexal AG               | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1013601         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK       | Berlin-Chemie AG       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1133952         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1360033         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK  | Vitabalans Oy          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1360077         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 100TK | Vitabalans Oy          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1074080         | enalapriil, 5mg                  | C09AA02  | BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK        | Berlin-Chemie AG       | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1133895         | enalapriil, 5mg                  | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1359918         | enalapriil, 5mg                  | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK  | Vitabalans Oy          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1359952         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS,<br>tablett, 100TK       | Vitabalans Oy             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1147564         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 30TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1147575         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 60TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147597         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | ENAP-H, tablett, 30TK                         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147609         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | ENAP-H, tablett, 60TK                         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1074888         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | CO-RENITEC, tablett, 28TK                     | N.V. Organon              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1129159         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | ENAHEXAL COMP 20<br>MG/12,5 MG, tablett, 30TK | Hexal AG                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1151389         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 30TK                        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1619175         | ensalutamiid, 40mg               | L02BB04  | XTANDI, pehmekapsel, 112TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, kes on asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised peale ebaõnnestunud androgeenide deprivatsioonravi, ning kellel kemoteraapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud või heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi ensalutamiidiga või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel. |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|---------------------------------------|----------|---|----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1247509     | entekaviir, 0,5mg                     | J05AF10  | BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100          | B18.0-B18.1   | Gastroenteroloog, Infektsionist |        |           |            | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                  |
| 1247510     | entekaviir, 1mg                       | J05AF10  | BARACLUDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100          | B18.0-B18.1   | Gastroenteroloog, Infektsionist |        |           |            | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                  |
| 1588844     | epinefriin (adrenaliin), 150mcg 0.3ml | C01CA24  | EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK           | SIA Meda Pharma                  | 100          | T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0                                    |                                 |        |           |            |  |
| 1588866     | epinefriin (adrenaliin), 300mcg 0.3ml | C01CA24  | EPIPEN, süstelahus pen-süstlis, 2ml 1TK           | SIA Meda Pharma                  | 100          | T88.6-T88.6, T78.0-T78.0, T88.2-T88.2, T80.5-T80.6, T78.2-T78.3, L50.0-L50.0                                    |                                 |        |           |            |  |
| 7017667     | eritoitesegu,                         |          | COMIDA PKU C Formula, pulber, 500g N1             | UAB Pharm House                  | 100          | E70.0-E70.1   |                                 |        |           |            |  |
|             |                                       |          |   |                                  | 50           |   |                                 |        |           |            |  |
| 7004955     | eritoitesegu,                         |          | MONOGEN, pulber, 400g                             | Nutricia Ltd                     | 100          | E71.3-E71.3   |                                 |        |           |            | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beeta-oksüdatsiooni defektide korral |
| 7004911     | eritoitesegu,                         |          | Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g        | Vitaflo                          | 100          | E71.3-E71.3   |                                 |        |           |            | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral  |
| 7017960     | eritoitesegu,                         |          | Neocate Syneo, pulber, 400g N6                    | Nutrimedical OÜ                  | 75           | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |                                 |        |           | 1,00       |  |
| 7017656     | eritoitesegu,                         |          | COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1      | UAB Pharm House                  | 100          | E70.0-E70.1   |                                 |        |           |            |  |
|             |                                       |          |   |                                  | 50           |   |                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1767539         | ertuglifloosin, 15mg             | A10BK04  | STEGLATRO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks<br>rasvumisega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> );<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1767483         | ertuglifloosin, 5mg              | A10BK04  | STEGLATRO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks<br>rasvumisega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> );<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1422335         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                        |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |
|                 |                                  |          |                        |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |                        |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1681174         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust                                       |
|                 |                                  |          |                                 |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust  |
|                 |                                  |          |                                 |                        | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                 |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1818323         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 30TK | First Pharma OÜ | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust;   |
|                 |                                  |          |                        |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |                                  |          |                        |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |                        |                 | 50               |   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1861714         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 30TK | UAB Ideal Trade Links | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust                                       |
|                 |                                  |          |                        |                       | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                        |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust;   |
|                 |                                  |          |                        |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärgväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1861747         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 60TK | UAB Ideal Trade Links | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |                                  |          |                        |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust;   |
|                 |                                  |          |                        |                       | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                        |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust;   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1862704         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 30TK                  | UAB "Lex ano"   | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                       |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                       |
| 1087949         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK | AstraZeneca AB  | 75               | K25-K27   |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega  |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1087950         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK            | AstraZeneca AB                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1337891         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1337914         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1395985         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 14TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1396009         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1396032         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1542338         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | ESOMEPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf          | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1830574         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                  | UAB "Lex ano"                  | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1087972         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                  | AstraZeneca AB                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1087983         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                  | AstraZeneca AB                 | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1337981         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1338005         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK       | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1338027         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1396111         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1542462         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | ESOMEPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK        | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1325023         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1331648         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK    | Teva Pharma B.V.               | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1336676         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESLOREX 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Zentiva k.s.                   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1336687         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESLOREX 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK        | Zentiva k.s.                   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1400218         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ELICEA 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1484018         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | CIRASET 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                              |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1488540         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACCORD<br>10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1543137         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESTAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                        | Medochemie Limited        | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1559987         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ELICEA Q-TAB 10MG, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1325225         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK         | Actavis Group PTC ehf     | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1331907         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK            | Teva Pharma B.V.          | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1400320         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ELICEA 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1488595         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACCORD<br>20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1560046         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ELICEA Q-TAB 20MG, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |             |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügi-<br>loa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1011665         | etanertsept, 25mg                | L04AB01  | ENBREL, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 4TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kehtnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteeetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kehtnud<br/>ravi 1 sünteeetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme<br/>funktsionaalne</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                     |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|             |                               |          |                       |                 |              |          |        |        |           |            | valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine |
|             |                               |          |                       |                 |              |          |        |        |           |            |  |

[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |             |                           |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injeksiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstraspinaalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1265600         | etanertsept, 25mg                | L04AB01  | ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | M08-M08  | Pediaater, Reumatoloog |        |           |            | suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m2 (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1-2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10-30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole 3 kuu jooksul olnud tõhus või talutav. Patsient vastab järgmistele tingimustele: süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm; viimase 6 kuu jooksul vähemalt 5 liigesel turse ning vähemalt 3 liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                         |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI >=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteesilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 mittesteroidse valu-<br/>ja põletikuvastase<br/>ravimiga<br/>maksimaalses<br/>raviannuses või<br/>(perifeerse artriidi või<br/>entesopaatia korral)<br/>vähemalt 2 steroidi<br/>injektsiooniga ja<br/>vähemalt 2 psoriartriidi<br/>ravis kasutatava<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>maksimaalses<br/>annuses mono- või<br/>kombineeritud<br/>teraapiana (sh<br/>metotrekstaat kuni 25<br/>mg nädalas) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor <math>\geq 4</math> ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>vähemalt 4 tugeva<br/>valulikkusega enteesi<br/>ja/või tõsine<br/>ekstraartikulaarne ja<br/>ekstrapinaalne<br/>haaratus</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1748482         | etanertsept, 25mg                | L04AB01  | ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater, Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt 2 steroidi injektsiooniga ja vähemalt 2 psoriaatriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sh metotrekstaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: BASDAI skoor >=4 ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või vähemalt 4 tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstrapinaalne haaratus |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteetilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstraspinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |                                 |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus   |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitreiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügi-<br>loa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1265644         | etanertsept, 50mg                | L04AB01  | ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Reumatoloog, Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud kestnud kombineeritud ravi kokku vähemalt 3 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks, halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivus (SR, CRP); kõrge turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral 3 kuud kestnud ravi 1 sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: esineb I-III astme funktsionaalne</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |



[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteesilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstrapinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1460191         | etanertsept, 50mg                | L04AB01  | ENBREL, süstelahus pen-<br>süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | vähemalt 3 kuud<br>kestnud ravi vähemalt<br>2 mittesteroidse valu-<br>ja põletikuvastase<br>ravimiga<br>maksimaalses<br>raviannuses või<br>(perifeerse artriidi või<br>entesopaatia korral)<br>vähemalt 2 steroidi<br>injektsiooniga ja<br>vähemalt 2 psoriaatriidi<br>ravis kasutatava<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>maksimaalses<br>annuses mono- või<br>kombineeritud<br>teraapiana (sh<br>metotrekstaat kuni 25<br>mg nädalas) on<br>osutunud ebatõhusaks<br>või talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: BASDAI<br>skoor >=4 ja/või<br>vähemalt 3 turses ja<br>valusat liigest ja/või<br>vähemalt 4 tugeva<br>valulikkusega enteesi<br>ja/või tõsine<br>ekstraartikulaarne ja<br>ekstrasпинаalne<br>haaratus |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstraspinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 6 kuud<br>kestnud kombineeritud<br>ravi kokku vähemalt 3<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>ja suukaudse<br>glükokortikosteroidiga<br>on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks, halva<br>prognoosiga<br>(autoantikehade<br>(reumatoidfaktor ja/või<br>aCCP) olemasolu, eriti<br>kõrges tiitris; kõrge<br>põletiku aktiivsus (SR,<br>CRP); kõrge turses<br>liigeste arv; mõõdukas-<br>kõrge haiguse<br>aktiivsus vastavalt<br>komposiitskoorile<br>(DAS28); eelnevate<br>kombinatsioonid;<br>erosioonide olemasolu<br>varajases haiguse<br>staadiumis) patsientide<br>korral 3 kuud kestnud<br>ravi 1 sünteetilise<br>haigust modifitseeriva<br>ravimiga on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>ACR/EULAR 2010<br>klassifikatsiooni<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: esineb I-<br>III astme |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1708680         | etanertsept, 50mg                | L04AB01  | BENEPALI, süstelahus pen-<br>süstlis, 4TK | Samsung Bioepis NL<br>B.V. | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitretiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstraspinaalne ja</p> |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                       |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 6 kuud<br>kestnud kombineeritud<br>ravi kokku vähemalt 3<br>sünteetilise haigust<br>modifitseeriva ravimiga<br>ja suukaudse<br>glükokortikosteroidiga<br>on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks, halva<br>prognoosiga<br>(autoantikehade<br>(reumatoidfaktor ja/või<br>aCCP) olemasolu, eriti<br>kõrges tiitris; kõrge<br>põletiku aktiivsus (SR,<br>CRP); kõrge turses<br>liigeste arv; mõõdukas-<br>kõrge haiguse<br>aktiivsus vastavalt<br>komposiitskoorile<br>(DAS28); eelnevate<br>kombinatsioonid;<br>erosioonide olemasolu<br>varajases haiguse<br>staadiumis) patsientide<br>korral 3 kuud kestnud<br>ravi 1 sünteetilise<br>haigust modifitseeriva<br>ravimiga on osutunud<br>ebatõhusaks või<br>talumatuks.<br>Ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>ACR/EULAR 2010<br>klassifikatsiooni<br>kriteeriumidele ning<br>järgmistele<br>tingimustele: esineb I-<br>III astme |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 mittesteroidse valu-<br/>ja põletikuvastase<br/>ravimiga<br/>maksimaalses<br/>raviannuses või<br/>(perifeerse artriidi või<br/>entesopaatia korral)<br/>vähemalt 2 steroidi<br/>injektsiooniga ja<br/>vähemalt 2 psoriartriidi<br/>ravis kasutatava<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>maksimaalses<br/>annuses mono- või<br/>kombineeritud<br/>teraapiana (sh<br/>metotrekstaat kuni 25<br/>mg nädalas) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor <math>\geq 4</math> ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>vähemalt 4 tugeva<br/>valulikkusega enteesi<br/>ja/või tõsine<br/>ekstraartikulaarne ja<br/>ekstrapinaalne<br/>haaratus</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1748527         | etanertsept, 50mg                | L04AB01  | ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater, Reumatoloog |        |           |            | vähemalt 3 kuud kestnud ravi vähemalt 2 maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt 4 kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. Ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient modifitseeritud New Yorgi diagnostika-kriteeriumidele ning järgmistele tingimustele: BASDAI skoor $\geq 4$ ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt 1 tund ja/või vähemalt 3 turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt 4 enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstrapinaalne ja ekstraartikulaarne |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | haaratus |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |          |



[illegible]

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | suukaudne<br>metotrekstaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |                                 |        |           |            | valulikkus või<br>süsteemsete nähtude<br>esinemine  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor $\geq 10$ ja/või<br>DLQI $\geq 10$ ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitreiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1748561         | etanertsept, 50mg                | L04AB01  | ERELZI, süstelahus pen-<br>süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | suukaudne<br>metotreksaat doosis<br>15 mg/m2 (või<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>algannuses 1-2<br>mg/kg/die suu kaudu,<br>ainult suukaudsest<br>manustamisest<br>soovitud raviefekti<br>puudumisel vajaduse<br>korral lisaks 10-30<br>mg/kg/dosi<br>intravenoosse<br>pulssravina<br>süsteemsete<br>nähtudega<br>haigusvormi korral) ei<br>ole 3 kuu jooksul olnud<br>tõhus või talutav.<br>Patsient vastab<br>järgmistele<br>tingimustele:<br>süsteemne,<br>polüartrikulaarne,<br>laienev<br>oligoartrikulaarne,<br>psoriaatiline,<br>entesopaatiline või<br>muu artriidi (JIA<br>klassifikatsiooni alusel<br>artriidid, mille puhul<br>esineb mitme<br>haigusvormi<br>tunnuseid)<br>haigusvorm; viimase 6<br>kuu jooksul vähemalt 5<br>liigesel turse ning<br>vähemalt 3 liigesel<br>liikuvuse piiratus või<br>valulikkus või |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                         |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------------------------------|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | süsteemsete nähtude<br>esinemine |
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            |                                  |

[illegible]



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 6 kuud<br/>kestnud kombineeritud<br/>ravi kokku vähemalt 3<br/>sünteetilise haigust<br/>modifitseeriva ravimiga<br/>ja suukaudse<br/>glükokortikosteroidiga<br/>on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks, halva<br/>prognoosiga<br/>(autoantikehade<br/>(reumatoidfaktor ja/või<br/>aCCP) olemasolu, eriti<br/>kõrges tiitris; kõrge<br/>põletiku aktiivsus (SR,<br/>CRP); kõrge turses<br/>liigeste arv; mõõdukas-<br/>kõrge haiguse<br/>aktiivsus vastavalt<br/>komposiitskoorile<br/>(DAS28); eelnevate<br/>kombinatsioonid;<br/>erosioonide olemasolu<br/>varajases haiguse<br/>staadiumis) patsientide<br/>korral 3 kuud kestnud<br/>ravi 1 sünteetilise<br/>haigust modifitseeriva<br/>ravimiga on osutunud<br/>ebatõhusaks või<br/>talumatuks.</p> <p>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>ACR/EULAR 2010<br/>klassifikatsiooni<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: esineb I-<br/>III astme</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | funktsionaalne<br>liigesepuudulikkus;<br>vähemalt 6 turses ja 6<br>valusat liigest,<br>hommikune<br>liigesejäikus vähemalt<br>1 tund või<br>reumatoidartriidi<br>liigesvistseraalne<br>vorm; ESR vähemalt<br>30 mm/h Westergreni<br>järgi ja/või CRP<br>vähemalt 25 mg/l ja/või<br>DAS 28 vähemalt 4,6<br>eeldusel, et viimasest<br>parenteraalsest<br>glükokortikosteroidi<br>manustamisest on<br>möödas vähemalt 2<br>kuud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | <p>vähemalt 3 kuud<br/>kestnud ravi vähemalt<br/>2 maksimaalses<br/>annuses mittesteroidse<br/>valu- ja<br/>põletikuvastase<br/>ravimiga (perifeerse<br/>artriidi korral vähemalt<br/>4 kuu jooksul<br/>sulfasalasiini 2,0 g/die<br/>või teis(t)e<br/>sünteeilis(t)e haigust<br/>modifitseeriva(te)<br/>ravimi(te)ga<br/>adekvaatses annuses<br/>ja perifeerse artriidi<br/>ja/või entesiitide korral<br/>kahekordse lokaalse<br/>glükokortikosteroidideg<br/>a süsteraviga) on<br/>osutunud ebatõhusaks<br/>või talumatuks.<br/>Ekspertkomisjoni<br/>otsusel vastab patsient<br/>modifitseeritud New<br/>Yorgi diagnostika-<br/>kriteeriumidele ning<br/>järgmistele<br/>tingimustele: BASDAI<br/>skoor &gt;=4 ja<br/>hommikune<br/>alaseljavalu ja -jäikus<br/>vähemalt 1 tund ja/või<br/>vähemalt 3 turses ja<br/>valusat liigest ja/või<br/>väljendunud<br/>tendoentesopaatia<br/>vähemalt 4 enteesi<br/>piirkonnas ja/või tõsine<br/>ekstraspinaalne ja</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                               |                 |                  |          |                                 |        |           |            | ekstraartikulaarne<br>haaratus   |
|                 |                                  |          |                               |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel vastab patsient<br>järgmistele<br>tingimustele: haigus on<br>väldanud vähemalt 6<br>kuud, PASI skoor või<br>BSA skoor >=10 ja/või<br>DLQI>=10 ning esineb<br>vähemalt üks<br>järgnevatest:<br>alternatiivne<br>standardne süsteemne<br>ravi (atsitreiin,<br>tsüklosporiin,<br>metotreksaat,<br>kitsakimbu UVB ja<br>Psoralen + UVA<br>fotokemoteraapia) on<br>vastunäidustatud,<br>esinevad ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed või<br>puudub raviefekt<br>vähemalt kahe erineva<br>süsteemse ravi<br>kasutamisel; esineb<br>psoriaasivorm, mis<br>vajab korduvaid<br>hospitaliseerimisi;<br>esineb ebastabiilne,<br>eluohtlik psoriaasi<br>vorm (erütrodermne<br>või pustulaarne<br>psoriaas) |
| 1589171         | etonogestreel, 68mg              | G03AC08  | NEXPLANON, implantaat,<br>1TK | N.V. Organon    | 50               |          |                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1138621         | etonogestreel+etüüül<br>östradiool,<br>120mcg+15mcg 24h | G02BB01  | NUVARING,<br>vaginaalravivahend, 1TK                                       | N.V. Organon              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1712584         | etonogestreel+etüüül<br>östradiool,<br>120mcg+15mcg 24h | G02BB01  | SETLONA,<br>vaginaalravivahend, 1TK  | Viatis Limited            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085352         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | N.V. Organon              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1653241         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ETORICOXIB ZENTIVA 120<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK     | Zentiva k.s.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1653252         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ETORICOXIB ZENTIVA 120<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Zentiva k.s.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1658358         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ETORICOXIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK                  | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1658369         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ETORICOXIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK              | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1699577         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1699588         | etorikoksiib, 120mg                                     | M01AH05  | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085318         | etorikoksiib, 60mg                                      | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | N.V. Organon              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1652824         | etorikoksiib, 60mg                                      | M01AH05  | ETORICOXIB ZENTIVA 60<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | Zentiva k.s.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1658189         | etorikoksiib, 60mg                                      | M01AH05  | ETORICOXIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK              | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1699342         | etorikoksiib, 60mg               | M01AH05  | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085330         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | N.V. Organon              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1653173         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ETORICOXIB ZENTIVA 90<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK     | Zentiva k.s.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1653184         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ETORICOXIB ZENTIVA 90<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Zentiva k.s.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1658268         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ETORICOXIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK                 | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1658279         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ETORICOXIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK             | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1699454         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK                          | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1699465         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1433315         | everoliimus, 10mg                | L01EG02  | AFINITOR, tablett, 30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C78-C78, C25-C25,<br>C34-C34, C16-C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamise<br>näidustatus<br>everoliimusega on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>kõrgelt<br>diferentseerunud<br>(täielikult)<br>mitteresetseeritav<br>progresseeruva kuluga<br>seedetraktist, kopsust<br>või pankreasest<br>lähtunud<br>neuroendokriinne<br>kasvaja ning<br>süsteemne keemiaravi<br>ja/või ravi<br>somatostatiini<br>analoogiga on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1787632         | everoliimus, 10mg                | L01EG02  | EVEROLIMUS NORAMEDA,<br>tablett, 30TK | UAB Norameda    | 100              | C78-C78, C25-C25,<br>C34-C34, C16-C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamise<br>näidustatus<br>everoliimusega on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>kõrgelt<br>diferentseerunud<br>(täielikult)<br>mitteresetseeritav<br>progresseeruva kuluga<br>seedetraktist, kopsust<br>või pankreasest<br>lähtunud<br>neuroendokriinne<br>kasvaja ning<br>süsteemne keemiaravi<br>ja/või ravi<br>somatostatiini<br>analoogiga on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1433281         | everoliimus, 5mg                 | L01EG02  | AFINITOR, tablett, 30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C78-C78, C25-C25,<br>C34-C34, C16-C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamise<br>näidustatus<br>everoliimusega on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>kõrgelt<br>diferentseerunud<br>(täielikult)<br>mitteresetseeritav<br>progresseeruva kuluga<br>seedetraktist, kopsust<br>või pankreasest<br>lähtunud<br>neuroendokriinne<br>kasvaja ning<br>süsteemne keemiaravi<br>ja/või ravi<br>somatostatiini<br>analoogiga on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1787609         | everoliimus, 5mg                 | L01EG02  | EVEROLIMUS NORAMEDA,<br>tablett, 30TK | UAB Norameda    | 100              | C78-C78, C25-C25,<br>C34-C34, C16-C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamise<br>näidustatus<br>everoliimusega on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>kõrgelt<br>diferentseerunud<br>(täielikult)<br>mitteresetseeritav<br>progresseeruva kuluga<br>seedetraktist, kopsust<br>või pankreasest<br>lähtunud<br>neuroendokriinne<br>kasvaja ning<br>süsteemne keemiaravi<br>ja/või ravi<br>somatostatiini<br>analoogiga on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja   | Soodus-tus % | Diagnoos                      | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1693256     | evolokumab, 140mg 1ml         | C10AX13  | REPATHA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 75           | I25.2-I25.2, I21-I21, I22-I22 | Kardioloog | esmane |           |            | ravi alustamine ägeda südamelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |   |          |   |   | 75               | E78.0-E78.0          | Kardioloog            | esmane |           |            | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on $\geq 3,0$ mmol/L. |
| 1680410         | faktor VIII inhibiitorist mõõdamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 25ühik 1ml | B02BD03  | FEIBA 25 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK | Baxalta Innovations GmbH                          | 100              | D68.4-D68.4, D66-D66 | Hematoloog, Pediaater |        |           |            |  |
| 1680421         | faktor VIII inhibiitorist mõõdamineva aktiivsusega hüübimisfaktorid, 50ühik 1ml | B02BD03  | FEIBA 50 Ü/ML, infusioonilahuse pulber ja lahusti, 20ml 1TK | Baxalta Innovations GmbH                          | 100              | D68.4-D68.4, D66-D66 | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |  |
| 1349300         | febuksostaat, 120mg   | M04AA03  | ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |                      |                       |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | M10-M10              |                       |        |           |            | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1716207         | febuksostaat, 120mg              | M04AA03  | FEBUXOSTAT TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK    | Teva B.V.                           | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1721753         | febuksostaat, 120mg              | M04AA03  | DRUNILER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.      | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1748325         | febuksostaat, 120mg              | M04AA03  | FEBUXOSTAT MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1750755         | febuksostaat, 120mg              | M04AA03  | FEBUXOSTAT ZENTIVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Zentiva k.s.                        | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1791581         | febuksostaat, 120mg              | M04AA03  | FEBUXOSTAT KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1349287         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | ADENURIC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1716140         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | FEBUXOSTAT TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Teva B.V.   | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1721696         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | DRUNILER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                          | 75               | M10-M10  |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1748291         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | FEBUXOSTAT MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M10-M10          |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1750698         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | FEBUXOSTAT ZENTIVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK         | Zentiva k.s.                        | 75               | M10-M10          |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1791547         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | FEBUXOSTAT KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M10-M10          |        |        |           |            | juhul, kui allopurinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1012330         | felodipiin, 10mg                 | C08CA02  | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | Teva B.V.                           | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |   |
| 1019708         | felodipiin, 10mg                 | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | AstraZeneca AB                      | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |   |
| 1174474         | felodipiin, 10mg                 | C08CA02  | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Hexal AG                            | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                         | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|--|----------|---|---|--------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012318     | felodipiin, 2,5mg                                    | C08CA02  | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | Teva B.V.                               | 75           | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 50           |                  |             |        |           |            |          |
| 1012329     | felodipiin, 5mg                                      | C08CA02  | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | Teva B.V.                               | 75           | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 50           |                  |             |        |           |            |          |
| 1019696     | felodipiin, 5mg                                      | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK            | AstraZeneca AB                          | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 75           | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1174373     | felodipiin, 5mg                                      | C08CA02  | FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK    | Hexal AG                                | 75           | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 50           |                  |             |        |           |            |          |
| 1029495     | fenobarbitaal, 100mg                                 | N03AA02  | PHENAEMAL, tablett, 50TK  | Desitin Arzneimittel GmbH               | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 100          | G40-G40          | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1026593     | fenofibraat, 200mg                                   | C10AB05  | LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK   | Mylan Healthcare SIA                    | 50           |                  |             |        |           |            |          |
| 1020340     | fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000RÜ                | J01CE02  | OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK                         | Sandoz GmbH                             | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 75           | H65-H67, J13-J18 |             |        |           | 16,00      |          |
| 1106536     | fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000RÜ                | J01CE02  | VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 RÜ, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Takeda Pharma AS                        | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 75           | H65-H67, J13-J18 |             |        |           | 16,00      |          |
| 1105951     | fenoksümetüülpenitsillii n, 400000RÜ 5ml             | J01CE02  | OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK                                | Sandoz GmbH                             | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 75           | H65-H67, J13-J18 |             |        |           | 16,00      |          |
| 1044223     | fenoterool, 100mcg 1annust                           | R03AC04  | BEROTEC N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK                | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75           | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 75           | J45-J45          |             |        |           |            |          |
| 1009651     | fenoterool+ipratroopiu mbromiid, 50mcg+20mcg 1annust | R03AL01  | BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK               | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75           | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 50           |                  |             |        |           |            |          |
|             |  |          |   |   | 75           | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1346958         | fentanüül, 100mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V.       | 100              | C00-D48  | Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neuroloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                |                 | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400948         | fentanüül, 100mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neuroloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223165         | fentanüül, 100mcg 1h             | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223121         | fentanüül, 12mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1346970         | fentanüül, 200mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V.       | 50               |          |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                |                 | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neurooloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400959         | fentanüül, 200mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50               |          |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neurooloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223132         | fentanüül, 25mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400960         | fentanüül, 300mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neurooloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1346992         | fentanüül, 400mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V.       | 50               |          |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                |                 | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neurooloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400971         | fentanüül, 400mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neuroloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223143         | fentanüül, 50mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1347038         | fentanüül, 600mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V.       | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                  |          |                                |                 | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400982         | fentanüül, 600mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neuroloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223154         | fentanüül, 75mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1347016         | fentanüül, 800mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva B.V.       | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                  |          |                                |                 | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400993         | fentanüül, 800mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc.          | 50               |          |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil,<br>neurooloogil ja koduse<br>toetusravi arstil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses<br>opioidsäilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opiooni<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
| 1077050         | fenütoiin, 100mg                 | N03AB02  | PHENHYDAN, tablett, 100TK             | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 50               |          |   |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1300587         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>B.V.      | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1338724         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.               | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1144842         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUNOC, kõvakapsel, 2TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395165         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 1TK                            | SIA Elvim                      | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1395176         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 2TK   | SIA Elvim             | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395187         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 4TK   | SIA Elvim             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1490688         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 1TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1490699         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 2TK       | Actavis Group PTC ehf | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1531279         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>2TK | Medochemie Limited    | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1821237         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>VITABALANS, tablett, 2TK       | Vitabalans Oy         | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1821248         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>VITABALANS, tablett, 4TK       | Vitabalans Oy      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                    | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1140691         | flukonasool, 50mg                | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>7TK | Medochemie Limited | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395660         | flukonasool, 50mg                | J02AC01  | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 7TK         | SIA Elvim          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                    | 50               |  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1167971         | fluokortoloon+lidokaiin,<br>1mg+20mg 1g | C05AA84  | DOLOPROCT 1MG/20MG/G<br>REKTAALKREEM,<br>rektaalkreem, 15g 1TK      | Karo Pharma<br>Aktiebolag      | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1167948         | fluokortoloon+lidokaiin,<br>1mg+40mg    | C05AA84  | DOLOPROCT 1MG/40MG<br>REKTAALSUPOSIIDID,<br>rektaalsuposiit, 10TK   | Karo Pharma<br>Aktiebolag      | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1107122         | fluoksetiin, 20mg                       | N06AB03  | FLUX, kõvakapsel, 28TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1456691         | fluoksetiin, 20mg                       | N06AB03  | FLUOXETINE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Vitabalans Oy                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1456703         | fluoksetiin, 20mg                | N06AB03  | FLUOXETINE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Vitabalans Oy   | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1489765         | flupentiksool, 1mg               | N05AF01  | FLUANXOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK              | H. Lundbeck A/S | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1006175         | flupentiksool, 20mg<br>1ml       | N05AF01  | FLUANXOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                              | H. Lundbeck A/S | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007840         | flutikasoon, 100mcg<br>1annust         | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 100<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK                    | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45   |        |        |           |            |          |
| 1007884         | flutikasoon, 250mcg<br>1annust         | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 250<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK                    | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45   |        |        |           |            |          |
| 1006344         | flutikasoon, 500mcg 1g                 | D07AC17  | CUTIVATE CREAM, kreem,<br>15g 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  |        |        |           |            |          |
| 1007233         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R01AD08  | FLIXONASE AQUEOUS<br>NASAL SPRAY 50 MCG,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120annust 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1007862         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45   |        |        |           |            |          |
| 1130690         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R03BA05  | FLIXOTIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK           | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45   |        |        |           |            |          |
| 1343034         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg 1annust | R01AD12  | AVAMYS, ninasprei,<br>suspensioon, 120annust 1TK                                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1011126         | fluvastatiin, 80mg                     | C10AA04  | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK                   | SIA Novartis Baltics                 | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1287187         | fluvastatiin, 80mg                     | C10AA04  | FLUVASTATIN ACTAVIS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK         | Actavis Group PTC ehf                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|----------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1723216         | fluvastatiin, 80mg                                     | C10AA04  | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | First Pharma OÜ      | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 100              | N18-N18   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |             |        |           |            |          |
| 1039564         | fluvoksamiin, 100mg                                    | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Mylan Healthcare SIA | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1087152         | formoterool, 12mcg                                     | R03AC13  | FORADIL AEROLIZER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK     | SIA Novartis Baltics | 75               | J45-J45   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 75               | J43-J44   | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1178939         | formoterool, 12mcg<br>1annust                          | R03AC13  | FOMEDA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK         | Orion Corporation    | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 75               | J45-J45   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 75               | J43-J44   | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1034075         | formoterool, 9mcg<br>1annust                           | R03AC13  | OXIS TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK           | AstraZeneca AB       | 75               | J43-J44   | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 75               | J45-J45   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1669697         | formoterool+aklidiinium<br>, 11,8mcg+340mcg<br>1annust | R03AL05  | BRIMICA GENUAIR,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK           | AstraZeneca AB       | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                      | 75               | J43-J44   | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1314256         | formoterool+beklometa<br>soon, 6mcg+100mcg<br>1annust | R03AK08  | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>180annust 1TK | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>möödukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasisid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1796991         | formoterool+beklometa<br>soon, 6mcg+100mcg<br>1annust | R03AK08  | FOSTER NEXTHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>180annust 1TK | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |   |          |  |                                   | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1653410         | formoterool+beklometa<br>soon, 6mcg+200mcg<br>1annust | R03AK08  | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>180annust 1TK | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>möödukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasisid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1742789         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+160mcg<br>1annuses | R03AK07  | AIRBUFO FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>2TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>möödukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1068443         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+160mcg<br>1annust | R03AK07  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK | AstraZeneca AB  | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |  |          |  |                 | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                 | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1611470         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+160mcg<br>1annust | R03AK07  | BUFOMIX EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK | Orion Corporation | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                   | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>möödukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1808603         | formoterool+budesonii<br>d, 9mcg+320mcg<br>1annuses | R03AK07  | AIRBUFO FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>≥100 rakku/L ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>möödukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1156250         | formoterool+budesonii<br>d, 9mcg+320mcg<br>1annust | R03AK07  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | AstraZeneca AB  | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                 | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                 | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>möödukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1611481         | formoterool+budesonii<br>d, 9mcg+320mcg<br>1annust       | R03AK07  | BUFOMIX EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK                  | Orion Corporation | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |  |          |   |                   | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                   | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1786596         | formoterool+glükopürr<br>oonium, 5mcg+7,2mcg<br>1annuses | R03AL07  | BEVESPI AEROSPHERE,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | AstraZeneca AB    | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1750227         | formoterool+glükopürr<br>oonium+beklometasoo<br>n, 5mcg+9mcg+87mcg<br>1annust | R03AL09  | TRIMBOW,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>120annust 1TK | Chiesi Farmaceutici<br>S.p.A. | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                               | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>≥100 rakku/μL ning<br>IKS/LABA või<br>LAMA/LABA<br>kaksikravil on<br>esinenud vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1834905         | formoterool+glükopürr<br>oonium+budesoniid,<br>5mcg+9mcg+160mcg<br>1annuses | R03AL11  | TRIXEO AEROSPHERE,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | AstraZeneca AB                        | 75               | J43-J44                       | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/L ning<br>IKS/LABA või<br>LAMA/LABA<br>kaksikravitel on<br>esinevad vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajavad<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |   |          |  |                                       | 50               |                               |             |        |           |            |  |
| 1027145         | fosinopriil, 10mg   | C09AA09  | MONOPRIL, tablett, 28TK  | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                       | 50               |                               |             |        |           |            |  |
| 1193767         | fosinopriil, 10mg   | C09AA09  | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                       | Actavis Group PTC ehf                 | 50               |                               |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |             |        |           |            |  |
| 1027336         | fosinopriil, 20mg   | C09AA09  | MONOPRIL, tablett, 28TK  | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |                               |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |             |        |           |            |  |
| 1193891         | fosinopriil, 20mg   | C09AA09  | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                       | Actavis Group PTC ehf                 | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                       | 50               |                               |             |        |           |            |  |
| 1107021         | fosinopriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg                              | C09BA09  | MONOZIDE, tablett, 28TK  | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |                               |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1250581         | fosinopriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09  | FOSINOPRIL HCT ACTAVIS,<br>tablett, 30TK                                 | Actavis Group PTC ehf                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1161548         | frovatriptaan, 2,5mg                           | N02CC07  | MIGARD, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK                         | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1060399         | furosemiid, 40mg                               | C03CA01  | FUROSEMIDE ORIFARM,<br>tablett, 100TK                                    | Orifarm Healthcare<br>A/S                               | 100              | I27.0-I27.0                   |           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 75               | I50-I50                       |           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1039362         | furosemiid, 60mg                               | C03CA01  | LASIX RETARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Sanofi-Aventis Groupe                                   | 50               |                               |           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 75               | I50-I50                       |           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | I27.0-I27.0                   |           |        |           |            |   |
| 1018606         | fusidiinhape, 10mg 1g                          | S01AA13  | FUCITHALMIC, silmatilgad,<br>suspensioon, 5g 1TK                         | Amdipharm Limited                                       | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1007727         | fusidiinhape, 20mg 1g                          | D06AX01  | FUCIDIN 20 mg/g salv, salv,<br>15g 1TK                                   | LEO Pharma A/S  | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1007750         | fusidiinhape, 20mg 1g                          | D06AX01  | FUCIDIN 20 mg/g kreem,<br>kreem, 15g 1TK                                 | LEO Pharma A/S  | 50               |                               |           |        |           |            |   |
| 1032815         | gabapentiin, 300mg                             | N03AX12  | NEURONTIN, kõvakapsel,<br>50TK   | Upjohn EESV   | 100              | G40-G40                       | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 75               | G63.2-G63.2                   |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1126055         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | GABAGAMMA 300MG,<br>kõvakapsel, 50TK   | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1696417         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | GABAPENTIN ACCORD,<br>kõvakapsel, 50TK | Accord Healthcare<br>B.V.      | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1826355         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | NEURONTIN, kõvakapsel,<br>90TK         | UAB "Lex ano"                  | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1845547         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | NEURONTIN, kõvakapsel, 100TK        | UAB Ideal Trade Links       | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                                     |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1125953         | gabapentiin, 400mg               | N03AX12  | GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK   | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1696529         | gabapentiin, 400mg               | N03AX12  | GABAPENTIN ACCORD, kõvakapsel, 50TK | Accord Healthcare B.V.      | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                                     |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1115716         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA10  | LINDYNETTE 20, kaetud<br>tablett, 63TK                 | Gedeon Richter Plc.                | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1828548         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA10  | LINDYNETTE 20, kaetud<br>tablett, 63TK                 | UAB Ideal Trade Links              | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1115693         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA10  | LINDYNETTE 30, kaetud<br>tablett, 63TK                 | Gedeon Richter Plc.                | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1828559         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA10  | LINDYNETTE 30, kaetud<br>tablett, 63TK                 | UAB Ideal Trade Links              | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1062953         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | HARMONET, kaetud tablett,<br>63TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1364105         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | GESYTIL 75/20<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK  | Ratiopharm GmbH                    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1364138         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg       | G03AA10  | GESYTIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK  | Ratiopharm GmbH                    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1061334         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE04  | LANTUS, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK            | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1265790         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE04  | LANTUS SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1665053         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                         | A10AE04  | ABASAGLAR KWIKPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK | Eli Lilly Nederland B.V.           | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1684043         | glargiin-insuliin,<br>300ühik 1ml                         | A10AE04  | TOUJEO, süstelahus pen-<br>süstlis, 1.5ml 5TK            | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                    | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |  |
| 1737042         | glargiin-<br>insuliin+liksisenatiid,<br>100ühik+33mcg 1ml | A10AE54  | SULIQUA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK             | Sanofi-Aventis Groupe              | 50               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>kombinatsioonis<br>metformiiniga juhul kui<br>ravi suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud   |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>kombinatsioonis<br>metformiiniga<br>rasvumusega<br>patsientidele<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1737020         | glargiin-<br>insuliin+liksisenatiid,<br>100ühik+50mcg 1ml | A10AE54  | SULIQUA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Groupe | 50               | E14-E14, E11-E11 |           |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>kombinatsioonis<br>metformiiniga juhul kui<br>ravi suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |
|                 |   |          |  |                       | 75               | E14-E14, E11-E11 |           |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>kombinatsioonis<br>metformiiniga<br>rasvumusega<br>patsientidele<br>(KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
| 1241244         | glatirameeratsetaat,<br>20mg 1ml                          | L03AX13  | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 28TK    | Teva GmbH             | 100              | G35-G35          | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>ägenemiste ja<br>remissioonidega<br>kulgeva hulgiskleroosi<br>raviks  |
| 1618196         | glatirameeratsetaat,<br>40mg 1ml                          | L03AX13  | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 12TK    | Teva GmbH             | 100              | G35-G35          | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>ägenemiste ja<br>remissioonidega<br>kulgeva hulgiskleroosi<br>raviks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1716993         | glatirameeratsetaat,<br>40mg 1ml           | L03AX13  | REMUREL, süstelahus<br>süstlis, 1ml 12TK  | Zentiva k.s.                        | 100              | G35-G35          | Neuroloog                          | esmane |           |            | konsiiliumi (3<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>ägenemiste ja<br>remissioonidega<br>kulgeva hulgiskleroosi<br>raviks |
| 1751037         | glekapreviir+pibrentasv<br>iir, 100mg+40mg | J05AP57  | MAVIRET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                           | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva C-<br>viirushepatiidi raviks  |
| 1860016         | glekapreviir+pibrentasv<br>iir, 50mg+20mg  | J05AP57  | MAVIRET, graanulid<br>kotikeses, 28TK   | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva C-<br>viirushepatiidi raviks  |
| 1261066         | gliklasiid, 30mg                           | A10BB09  | GLICLADA 30 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
| 1261101         | gliklasiid, 30mg                           | A10BB09  | GLICLADA 30 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 120TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
| 1603145         | gliklasiid, 30mg                           | A10BB09  | GLICLAZIDE KRKA,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
| 1350054         | gliklasiid, 60mg                           | A10BB09  | DIAPREL MR 60MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK       | Les Laboratoires<br>Servier         | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
| 1551822         | gliklasiid, 60mg                           | A10BB09  | GLICLADA 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK        | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
| 1551855         | gliklasiid, 60mg                           | A10BB09  | GLICLADA 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 120TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
| 1551945         | gliklasiid, 60mg                           | A10BB09  | GLICLAZIDE KRKA 60 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
| 1644601         | gliklasiid, 60mg                           | A10BB09  | GLICLAZIDE ACTAVIS,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK    | Actavis Group PTC ehf               | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1847246         | gliklasiid, 60mg                 | A10BB09  | DIAPREL MR 60MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK | UAB Ideal Trade Links       | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1046405         | gliklasiid, 80mg                 | A10BB09  | DIAPREL, tablett, 60TK  | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1084957         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Groupe       | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1176948         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | OLTAR 1MG, tablett, 30TK  | Berlin-Chemie AG            | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1334821         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                      | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1110328         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Groupe       | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1177039         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK   | Berlin-Chemie AG            | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334865         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                      | Accord Healthcare<br>B.V.   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1671195         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | First Pharma OÜ             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1846942         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | UAB Ideal Trade Links       | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1110339         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Groupe       | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1177129         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK   | Berlin-Chemie AG            | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1334900         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                      | Accord Healthcare<br>B.V.   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1670992         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | First Pharma OÜ             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1847055         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | UAB Ideal Trade Links       | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1125391         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Groupe       | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1334944         | glimepiriid, 4mg                   | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                    | Accord Healthcare<br>B.V.          | 75               | E14-E14, E11-E11   |             |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1029338         | glipisiid, 10mg                    | A10BB07  | GLIBENESE GITS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |             |        |           |            |          |
| 1029349         | glipisiid, 5mg                     | A10BB07  | GLIBENESE GITS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 75               | E14-E14, E11-E11   |             |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1201396         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                             | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |             |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1294398         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                  | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |             |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1165878         | glükagoon, 1mg                     | H04AA01  | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT,<br>süstelahuse pulber ja lahusti,<br>1TK          | Novo Nordisk A/S                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1326653         | glükoosamiin, 1178mg               | M01AX05  | GLUCOSAMIN-<br>RATIOPHARM 1178 MG,<br>suukaudse lahuse pulber,<br>20TK  | Ratiopharm GmbH                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1183687         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCOSAMINE PHARMA<br>NORD, kõvakapsel, 90TK                            | Pharma Nord ApS                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1183698         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCOSAMINE PHARMA<br>NORD, kõvakapsel, 270TK                           | Pharma Nord ApS                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1595954         | glükopürroonium,<br>44mcg 1annust  | R03BB06  | SEEBRI BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK          | Novartis Europharm<br>Limited      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1648403         | gosereliin, 10,8mg               | L02AE03  | RESELIGO, implantaat<br>süstlis, 1TK | Zentiva k.s.    | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                   |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks  |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 50               |                              |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 75               | N80-N80                      |                   |        |           |            | III-IV astme<br>endometrioosi<br>põdevatele<br>patsientidele  |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 100              | C61-C61                      | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | lokaalse või lokaalselt<br>levinud ja kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kuni 2 aasta<br>vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1002621         | gosereliin, 3,6mg                | L02AE03  | ZOLADEX, implantaat, 1TK | AstraZeneca AB  | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                   |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks   |
|                 |                                  |          |                          |                 | 75               | N80-N80                  |                   |        |           |            | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele  |
|                 |                                  |          |                          |                 | 50               |                          |                   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                          |                 | 100              | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1648425         | gosereliin, 3,6mg                | L02AE03  | RESELIGO, implantaat<br>süstlis, 1TK                 | Zentiva k.s.                      | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                   |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks  |
|                 |                                  |          |  |                                   | 100              | C61-C61                      | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | lokaalse või lokaalselt<br>levinud ja kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kuni 2 aasta<br>vältel |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                              |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | N80-N80                      |                   |        |           |            | III-IV astme<br>endometrioosi<br>põdevatele<br>patsientidele  |
| 1023950         | granisetroon, 1mg                | A04AA02  | KYTRIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Atnahs Pharma<br>Netherlands B.V. | 100              | C00-D48                      |                   |        |           |            | suukaudsest<br>keemiaravist<br>põhjustatud iivelduse<br>ja oksendamise<br>profülaktikaks ja raviks<br>juhul, kui<br>metoklopramiid ei ole<br>esmase valikuna<br>soovitatud või see on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks  |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                              |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1800470         | guselkumab, 100mg<br>1ml         | L04AC16  | TREMFYA, süstelahus pen-<br>süstlis, 1ml 1TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel patsientidele,<br>kes vastavad Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus L40 diagnoosi<br>korral kehtivatele TNF-<br>alfa inhibiitori<br>hüvitamistingimustele<br>ning kes on saanud<br>haigekassa rahastusel<br>ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust<br>modifitseeriva<br>toimeainega, mis on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või<br>kellele on TNF-alfa<br>inhibiitori kasutamine<br>vastunäidustatud |
| 1014680         | haloperidool, 1,5mg              | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>tablett, 50TK        | Gedeon Richter Plc.                 | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-<br>F18.7, F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7, F13.4-<br>F13.7, F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7, F16.4-<br>F16.7, F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-F09,<br>F20-F29, F32.2-<br>F33.2, F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater                     | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |  |                                 |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014691         | haloperidool, 2mg 1ml            | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>suukaudsed tilgad, lahus,<br>10ml 1TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1064674         | haloperidool, 50mg<br>1ml        | N05AD01  | HALOPERIDOL<br>DECANOATE-RICHTER,<br>süstelahus, 1ml 5TK      | Gedeon Richter Plc. | 50               |   | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 |             |        |           |            |          |
| 1014679         | haloperidool, 5mg                | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>tablett, 50TK                         | Gedeon Richter Plc. | 50               |   | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 |             |        |           |            |          |
| 1054055         | hõbesulfadiasiin, 10mg<br>1g     | D06BA01  | SULFARGIN, salv, 50g 1TK                                      | AS Grindeks         | 50               |   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1015478         | hüdroklorotiasiid,<br>25mg                             | C03AA03  | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK                              | Sanofi-Aventis Groupe        | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1008841         | hüdroklorotiasiid+amilo-<br>riid, 50mg+5mg             | C03EA81  | MODURETIC, tablett, 30TK                                | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 100              | N25.1-N25.1                               |                           |        |           |            |          |
| 1137013         | hüdrokortisoon, 10mg<br>1g                             | D07AA02  | HYDROCORTISONE DAK,<br>salv, 30g 1TK                    | Orifarm Healthcare<br>A/S    | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1018594         | hüdrokortisoon+fusidiin<br>hape, 10mg+20mg 1g          | D07CA83  | FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK                               | LEO Pharma A/S               | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1035403         | hüdrokortisoon+kloorh-<br>eksidiin, 10mg+10mg<br>1g    | D07BA80  | SIBICORT, kreem, 20g 1TK                                | Orion Corporation            | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1045145         | hüdrokortisoon+tsiprofl-<br>oksatsiin, 10mg+2mg<br>1ml | S02CA82  | CIPROBAY HC, kõrvatilgad,<br>suspensioon, 10ml 1TK      | SIA Novartis Baltics         | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1036022         | hüdroksükarbamiid,<br>500mg                            | L01XX05  | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                               | Bristol-Myers Squibb<br>Kft. | 100              | C00-D48                                   | Onkoloog,<br>Hematoloog   |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1615698         | hüdroksükarbamiid,<br>500mg                            | L01XX05  | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                               | First Pharma OÜ              | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 100              | C00-D48                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog   |        |           |            |          |
| 1027291         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg                           | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sanofi-Aventis Groupe        | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1566086         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg                           | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | First Pharma OÜ              | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1830529         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg                           | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | UAB "Lex ano"                | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1498978         | ibandroonhape, 150mg             | M05BA06  | IBANDRONIC ACID TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 1TK | Teva B.V.       | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1498989         | ibandroonhape, 150mg             | M05BA06  | IBANDRONIC ACID TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK | Teva B.V.       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1798825         | ibrutiniib, 140mg                | L01EL01  | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |           |            | monoteraapiana<br>patsientidele, kellel<br>esineb 17p deletsioon<br>või TP53 mutatsioon,<br>kes ei ole eelnevalt<br>ravi saanud või kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri<br>ja haigus ei ole ravile<br>allunud või on<br>taastekkinud lühema<br>aja kui 36 kuu jooksul<br>eelneva ravi<br>alustamisest alates<br>ning patsientidele,<br>kellel esineb 11q<br>deletsioon, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud<br>või kes on eelnevalt<br>saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei<br>ole ravile allunud või<br>on taastekkinud.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>ibrutiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.1-C83.1 | Hematoloog |        |           |            | monoteraapiana heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>1) ravirefraktaarsele<br>mantelrakulise<br>lümfoomiga patsiendile<br>(dokumenteeritud<br>suutmatus saavutada<br>vähemalt osalist<br>ravivastust) või teise<br>rea ravina patsiendile,<br>kellel on tekkinud<br>haiguse varajane<br>ägenemine (<24 kuud).<br>Ravi ibrutiniibiga<br>teostatakse kuni<br>haiguse<br>progressioonini |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1775156         | ibrutiniib, 420mg                | L01EL01  | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |           |            | monoteraapiana<br>patsientidele, kellel<br>esineb 17p deletsioon<br>või TP53 mutatsioon,<br>kes ei ole eelnevalt<br>ravi saanud või kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri<br>ja haigus ei ole ravile<br>allunud või on<br>taastekkinud lühema<br>aja kui 36 kuu jooksul<br>eelneva ravi<br>alustamisest alates<br>ning patsientidele,<br>kellel esineb 11q<br>deletsioon, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud<br>või kes on eelnevalt<br>saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei<br>ole ravile allunud või<br>on taastekkinud.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>ibrutiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1775167         | ibrutiniib, 560mg                | L01EL01  | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | C83.1-C83.1                   | Hematoloog |        |           |            | monoteraapiana heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>1) ravirefraktaarsele<br>mantelrakulise<br>lümfoomiga patsiendile<br>(dokumenteeritud<br>suutmatus saavutada<br>vähemalt osalist<br>ravivastust) või teise<br>rea ravina patsiendile,<br>kellel on tekkinud<br>haiguse varajane<br>ägenemine (<24 kuud).<br>Ravi ibrutiniibiga<br>teostatakse kuni<br>haiguse<br>progressioonini |
| 1073012         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | Vitabalans Oy                       | 50               |                               |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | C00-D48                       |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M15-M19                       |            |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |            |        |           |            |  |
| 1073089         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | Orifarm Healthcare<br>A/S           | 50               |                               |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | C00-D48                       |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M15-M19                       |            |        | 63,00     |            |  |
| 1473588         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | G.L. Pharma GmbH                    | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M15-M19                       |            |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | C00-D48                       |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |                               |            |        |           |            |  |
| 1032714         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH                    | 50               |                               |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | C00-D48                       |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | M15-M19                       |            |        | 63,00     |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073113         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | Orifarm Healthcare<br>A/S | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1085194         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Vitabalans Oy             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1085206         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | Vitabalans Oy             | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1473599         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | G.L. Pharma GmbH          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1697126         | idebenoon, 150mg                 | N06BX13  | RAXONE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK | Santhera<br>Pharmaceuticals<br>(Deutschland) GmbH | 100              | H47.2-H47.2 | Oftalmoloog |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus geneetilise<br>testiga kinnitatud<br>Leberi päriliku optilise<br>neuropaatia<br>näidustusel.<br>Soodustus kehtib<br>alates kliiniliselt olulise<br>paranemise (clinically<br>relevant recovery,<br>CRR) saavutamisest<br>võrreldes idebenoon-<br>ravi alustamisega.<br>Ravivastuse<br>hindamine toimub iga<br>3 kuu järel kuni CRR<br>saavutamiseni ning<br>seejärel iga 6 kuu<br>tagant. Ravi<br>lõpetatakse, kui pärast<br>CCR saavutamist ei<br>ole kahel järjestikusel<br>mõõtmisel enam<br>toimunud täiendavat<br>nägemisteravuse<br>paranemist. Off-chart<br>patsiendil, kes enne<br>ravi alustamist ei näe<br>ühtegi tähte logMAR<br>lugemistabelil,<br>tähendab CRR võimet<br>lugeda lugemistabelilt<br>vähemalt 5 tähte<br>(võrdne ühe rea<br>lugemisega) ning on-<br>chart patsiendil, kes<br>suutis lugeda tähti<br>lugemistabelilt enne<br>ravi alustamist,<br>tähendab CRR võimet<br>lugeda täiendavalt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügi-<br>loa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |   |                      |                  |             |  |        |           |            | vähemalt 10 tähte<br>(võrdne 2 rea<br>lugemisega<br>lugemistabelil).  |
| 1291890         | iloprost, 10mcg 1ml              | B01AC11  | VENTAVIS, nebuliseeritav<br>lahus, 1ml 30TK | Bayer AG             | 50               |             |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafiliil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1291902         | iloprost, 10mcg 1ml              | B01AC11  | VENTAVIS, nebuliseeritav<br>lahus, 1ml 168TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1548592         | imatiniib, 100mg                 | L01EA01  | IMATINIB ZENTIVA 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Zentiva k.s.    | 100              | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja        | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|------------------------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1566413     | imatiniiib, 100mg             | L01EA01  | MEAXIN, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | KRKA, d.d., Novo mesto | 100          | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele: KIT-<br>positiivse kõrge<br>retsidiivriskiga<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja KIT-<br>positiivse<br>mitteopereeritava või<br>metastaseerunud<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>raviks, kui mitte enam<br>kui 3 ravikuu<br>möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1588417     | imatiniib, 100mg              | L01EA01  | IMATINIB GRINDEKS, kõvakapsel, 120TK | AS Grindeks     | 100          | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele: KIT-<br>positiivse kõrge<br>retsidiivriskiga<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja KIT-<br>positiivse<br>mitteopereeritava või<br>metastaseerunud<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>raviks, kui mitte enam<br>kui 3 ravikuu<br>möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1604900         | imatiniib, 100mg                 | L01EA01  | IMATINIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Teva B.V.       | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele: KIT-<br>positiivse kõrge<br>retsidiiviriskiga<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja KIT-<br>positiivse<br>mitteopereeritava või<br>metastaseerunud<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>raviks, kui mitte enam<br>kui 3 ravikuu<br>möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1619726         | imatiniib, 100mg                 | L01EA01  | IMATINIB ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele: KIT-<br>positiivse kõrge<br>retsidiiviriskiga<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja KIT-<br>positiivse<br>mitteopereeritava või<br>metastaseerunud<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>raviks, kui mitte enam<br>kui 3 ravikuu<br>möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1658448         | imatiniib, 100mg                 | L01EA01  | GLIPOX, kõvakapsel, 120TK | UAB Norameda    | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1          | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1705069         | imatinib, 100mg                  | L01EA01  | IMATINIB SANDOZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>KITpositiivse kõrge<br>retsidiiviriskiga<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja<br>KITpositiivse<br>mitteopereeritava või<br>metastaseerunud<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>raviks, kui mitte enam<br>kui 3 ravikuu<br>möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1619759         | imatiniib, 400mg                 | L01EA01  | IMATINIB ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-<br>C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele: Ph-<br>positiivse B-rakulise<br>lümfoblastleukeemia<br>või -lümfoomi raviks<br>kuni 3 aasta vältel või<br>haiguse<br>progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1          | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1658471         | imatiniib, 400mg                 | L01EA01  | GLIPOX, kõvakapsel, 30TK | UAB Norameda    | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C92.1-C92.1          | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)  |
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KIT-positiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KIT-positiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1665019     | imatiniiib, 400mg             | L01EA01  | IMATINIB SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100          | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmiste<br>kriteeriumidele:<br>KITpositiivse kõrge<br>retsidiiviriskiga<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja<br>KITpositiivse<br>mitteopereeritava või<br>metastaseerunud<br>pahaloomulise<br>gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori<br>raviks, kui mitte enam<br>kui 3 ravikuu<br>möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|---|------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | C83.5-C83.5, C91.0-C91.0  | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni |
| 7000074         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL Pepti (APTAMIL ALLERGY CARE) , pulber, 450 g      | N.V. Nutricia      | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |            |        |           | 1,00       |   |
| 7000085         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL Pepti MCT (APTAMIL DIGESTIVE CARE), pulber, 450 g | N.V. Nutricia      | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |            |        |           | 1,00       |   |
| 7002313         | imikute toitesegu,               |          | MILUPA APTAMIL FMS, pulber, 200 g                         | N.V. Nutricia      | 75               | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1  |            |        |           | 0,58       |   |
| 7002863         | imikute toitesegu,               |          | FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g                        | Friesland Foods BV | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |            |        |           | 1,00       |   |
| 7002874         | imikute toitesegu,               |          | FRISOLAC GOLD PREMATURE, pulber, 400g                     | Friesland Foods BV | 75               | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1-P27.1  |            |        |           | 0,58       |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 7002885         | imikute toitesegu,               |          | FRISOLAC GOLD PEP,<br>pulber, 400g                             | Friesland Foods BV            | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-<br>L27.2, L50-L50,<br>T78.1-T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-K90.4,<br>T78.2-T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-T78.0 |             |        |           | 1,00       |  |
| 7004933         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL PREMATIL, pulber,<br>400 g                             | Nutricia Cuijk BV.            | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1   |             |        |           | 0,58       |  |
| 7018017         | imikute toitesegu,               |          | Aptamil Pepti Syneo, pulber,<br>450g N12                       | Nutricia Cuijk bv             | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-<br>L27.2, L50-L50,<br>T78.1-T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-K90.4,<br>T78.2-T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-T78.0 |             |        |           | 1,00       |  |
| 7017971         | imikute toitesegu,               |          | Neocate (aminohapete segu),<br>pulber, 400g N6                 | Nutraceutical OÜ              | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-<br>L27.2, L50-L50,<br>T78.1-T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-K90.4,<br>T78.2-T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-T78.0 |             |        |           | 1,00       |  |
| 7017948         | imikute toitesegu,               |          | Aptamil HMF , pulber, 2,2g<br>N50                              | Nutricia Cuijk bv             | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1   |             |        |           | 0,58       |  |
| 7017432         | imikute toitesegu,               |          | INFATRINI, suspensioon,<br>125ml N24                           | Nutricia                      | 75               | E42-E42   |             |        |           | 1,00       | lastele, kellele on<br>paigaldatud<br>gastrostoom või<br>jejunostoom |
| 1060322         | imikvimood, 5%                   | D06BB10  | ALDARA, kreem, 250mg<br>12TK                                   | Meda AB                       | 50               |   |             |        |           |            |  |
| 1452169         | indakaterool, 150mcg             | R03AC18  | ONBREZ BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
| 1452215         | indakaterool, 300mcg             | R03AC18  | ONBREZ BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1626555         | indakaterool+glükopürr<br>oonium,<br>85mcg+43mcg<br>1annust | R03AL04  | ULTIBRO BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK       | Novartis Europharm<br>Limited | 75               | J43-J44                                   | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1167780         | indapamiid, 1,5mg   | C03BA11  | TERTENSIF SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Les Laboratoires<br>Servier   | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |             |        |           |            |          |
| 1185230         | indapamiid, 1,5mg   | C03BA11  | RAWEL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |             |        |           |            |          |
| 1379741         | indapamiid, 1,5mg   | C03BA11  | INDAMAX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK      | Teva Pharma B.V.              | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |             |        |           |            |          |
| 1860746         | indapamiid, 1,5mg   | C03BA11  | TERTENSIF SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | UAB Ideal Trade Links         | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |             |        |           |            |          |
| 1019416         | indapamiid, 2,5mg   | C03BA11  | TERTENSIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Les Laboratoires<br>Servier   | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |           |            |          |
| 1038383         | indapamiid, 2,5mg   | C03BA11  | PROINDAP, kõvakapsel,<br>30TK   | Pro.med.cs Praha a.s.         | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |             |        |           |            |          |
| 1071841         | indometatsiin, 50mg   | M01AB01  | INDOMET- RATIOPHARM<br>50MG, kõvakapsel, 50TK                         | Ratiopharm GmbH               | 75               | M15-M19                                   |             |        | 63,00     |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 100              | C00-D48                                   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                               | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1105940         | ipratroopiumbromiid,<br>20mcg 1annust       | R03BB01  | ATROVENT N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK                     | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
| 1699724         | isavukonasool, 100mg                        | J02AC05  | CRESEMBA, kõvakapsel,<br>14TK   | Basilea Pharmaceutica<br>Deutschland GmbH  | 100              | B44-B44  |             |        |           |            | kui ravi<br>vorikonasooliga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>vastunäidustatud ning<br>ravi on alustatud<br>haiglas |
|                 |   |          |   |  | 100              | B46-B46  |             |        |           |            | kui ravi on alustatud<br>haiglas   |
| 1000348         | isokonasool, 10mg 1g                        | D01AC05  | TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK  | LEO Pharma A/S                             | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1820191         | isokonasool, 10mg 1g                        | D01AC05  | TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK  | First Pharma OÜ                            | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1865156         | isokonasool, 10mg 1g                        | D01AC05  | TRAVOGEN, kreem, 30g 1TK  | UAB Ideal Trade Links                      | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1000416         | isokonasool+diflukortol<br>oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80  | TRAVOCORT, kreem, 15g<br>1TK  | LEO Pharma A/S                             | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1783830         | isokonasool+diflukortol<br>oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80  | TRAVOCORT, kreem, 30g<br>1TK  | First Pharma OÜ                            | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1827659         | isokonasool+diflukortol<br>oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80  | TRAVOCORT, kreem, 30g<br>1TK  | UAB Ideal Trade Links                      | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1015074         | isosorbiitdinitraat,<br>20mg                | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | Ratiopharm GmbH                            | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20  |             |        |           |            |  |
| 1008964         | isosorbiitdinitraat,<br>40mg                | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | Ratiopharm GmbH                            | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20  |             |        |           |            |  |
| 1146361         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg              | C01DA14  | ISOSORBIDE<br>MONONITRATE<br>VITABALANS, tablett, 30TK                            | Vitabalans Oy                              | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20  |             |        |           |            |  |
| 1146372         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg              | C01DA14  | ISOSORBIDE<br>MONONITRATE<br>VITABALANS, tablett, 100TK                           | Vitabalans Oy                              | 75               | I20-I20  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1101913         | isosorbiitmononitraat,<br>40mg              | C01DA14  | OLICARD 40 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK         | Mylan Healthcare SIA                       | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1046786         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | IMDUR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | TopRidge Pharma<br>(Ireland) Limited | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | I20-I20                                   |                                 |        |           |            |          |
| 1101924         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | OLICARD 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Mylan Healthcare SIA                 | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | I20-I20                                   |                                 |        |           |            |          |
| 1127584         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | ISOMONIT 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | Hexal AG                             | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | I20-I20                                   |                                 |        |           |            |          |
| 1252741         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | ISOMONIT 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Hexal AG                             | 75               | I20-I20                                   |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1004364         | isotretinoiin, 10mg              | D10BA01  | ROACCUTANE 10 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                    | Roche Eesti Osaühing                 | 75               | L43-L43                                   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-<br>L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog               |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1790007         | isotretinoiin, 10mg              | D10BA01  | ISOTRETINOIN SANDOZ,<br>pehmekapsel, 30TK                                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.       | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | L43-L43                                   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-<br>L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog               |        |           |            |          |
| 1112230         | isotretinoiin, 20mg              | D10BA01  | ROACCUTANE 20 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                    | Roche Eesti Osaühing                 | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-<br>L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog               |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | L43-L43                                   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1790041         | isotretinoiin, 20mg              | D10BA01  | ISOTRETINOIN SANDOZ,<br>pehmekapsel, 30TK                                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.       | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-<br>L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog               |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | L43-L43                                   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1164035         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK      | Pro.med.cs Praha a.s. | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1164057         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK     | Pro.med.cs Praha a.s. | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1183553         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | CLADOSOL 100MG, kõvakapsel, 14TK | Stada Arzneimittel AG | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1230488         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | ITRACONAZOL ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 28TK                          | Actavis Group PTC ehf               | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                     | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1219553         | ivabradiin, 5mg                  | C01EB17  | PROCORALAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK          | Les Laboratoires<br>Servier         | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1700772         | ivabradiin, 5mg                  | C01EB17  | IVABRADINE GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | AS Grindeks                         | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1715712         | ivabradiin, 5mg                  | C01EB17  | IVABRADINE MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK    | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1746378         | ivabradiin, 5mg                  | C01EB17  | IVABRADINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U.         | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1219485         | ivabradiin, 7,5mg                | C01EB17  | PROCORALAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK          | Les Laboratoires<br>Servier         | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1700783         | ivabradiin, 7,5mg                | C01EB17  | IVABRADINE GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | AS Grindeks                         | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1715891         | ivabradiin, 7,5mg                | C01EB17  | IVABRADINE MYLAN,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK    | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1746446         | ivabradiin, 7,5mg                | C01EB17  | IVABRADINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U.         | 50               |  |        |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1038068         | IX hüübimisfaktor,<br>1200RÜ     | B02BD04  | IMMUNINE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Baxalta Innovations<br>GmbH | 100              | D67-D67  | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
| 1728840         | kabosantiniib, 20mg              | L01EX07  | CABOMETRYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Ipsen Pharma                | 100              | C64-C64  | Onkoloog                 |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>kabosantiniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1 ning kellel<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1728862         | kabosantiniib, 40mg              | L01EX07  | CABOMETYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ipsen Pharma    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>kabosantiniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkologi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1 ning kellel<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1728884         | kabosantiniib, 60mg                                 | L01EX07  | CABOMETYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ipsen Pharma                   | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>kabosantiniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1 ning kellel<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
| 1093340         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, salv, 30g 1TK                                 | LEO Pharma A/S                 | 75               | L40-L40  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1534621         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, geel, 30g 1TK                                 | LEO Pharma A/S                 | 75               | L40-L40  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1676369         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | CABEMET, salv, 30g 1TK                                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | L40-L40  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1676370         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | CABEMET, salv, 60g 1TK                                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | L40-L40  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1680050         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | ENSTILAR, nahavaht, 60g<br>1TK                          | LEO Pharma A/S                 | 75               | L40-L40  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1004599         | kaltsitriool, 0,25mcg                        | A11CC04  | ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK                   | Atnahs Pharma<br>Netherlands B.V. | 50               |   |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | N25-N25, N18-N18  | Nefroloog, Pediaater        |        |           |            |  |
| 1392016         | kaltsium+kolekaltsifero<br>ol, 500mg+400RÜ   | A12AX80  | CALCIGRAN FORTE,<br>närimistablett, 120TK      | Orifarm Healthcare<br>A/S         | 75               | M80-M80   |                             |        |           |            | kombinatsioonravi<br>osana patsientidele,<br>kelle lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | N18-N18   |                             |        |           |            |  |
| 1046337         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg                 | A12AA04  | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 100TK       | Orifarm Healthcare<br>A/S         | 100              | N18-N18   |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |           |            |  |
| 1776483         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg                 | A12AA04  | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 120TK       | Orifarm Healthcare<br>A/S         | 100              | N18-N18   |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |           |            |  |
| 1129519         | kaltsiumnadropariin,<br>2850RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 10TK | Mylan Healthcare SIA              | 50               |   |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | O99.8-O99.8   |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                   | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |                             |        |           |            | kuni 30 päevaks  |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                             |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1065664         | kaltsiumnadropariin,<br>3800RÜ anti Xa 0.4ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK | Mylan Healthcare SIA           | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |          |  |                                | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
| 1124110         | kaltsiumnadropariin,<br>5700RÜ anti Xa 0.6ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 10TK | Mylan Healthcare SIA           | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |          |  |                                | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |  |          |  |                                | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
| 1129496         | kaltsiumnadropariin,<br>7600RÜ anti Xa 0.8ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 10TK | Mylan Healthcare SIA           | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |          |  |                                | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
| 1291058         | kandesartaan, 16mg                           | C09CA06  | PRESCANDEN 16MG,<br>tablett, 30TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |            |   |
| 1291070         | kandesartaan, 16mg                           | C09CA06  | PRESCANDEN 16MG,<br>tablett, 56TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1455061         | kandesartaan, 16mg                                 | C09CA06  | CANDESARTAN ACTAVIS,<br>tablett, 28TK          | Actavis Group PTC ehf            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1487572         | kandesartaan, 16mg                                 | C09CA06  | CARZAN 16MG, tablett, 28TK                     | Zentiva k.s.                     | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1497630         | kandesartaan, 16mg                                 | C09CA06  | CANOCORD 16 MG, tablett, 30TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1183867         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | ATACAND, tablett, 28TK                         | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1396458         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | PRESCANDEN 32MG,<br>tablett, 30TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1396470         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | PRESCANDEN 32MG,<br>tablett, 56TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 75               | I10-I13, I15-I15, I50-I50 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1487651         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | CARZAN 32MG, tablett, 28TK                     | Zentiva k.s.                     | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1497719         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | CANOCORD 32 MG, tablett, 30TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1497551         | kandesartaan, 8mg                                  | C09CA06  | CANOCORD 8 MG, tablett, 30TK                   | KRKA, d.d., Novo mesto           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1589665         | kandesartaan+amlodip<br>iin, 16mg+10mg             | C09DB07  | ZENICAMO, tablett, 28TK                        | Zentiva k.s.                     | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1355879         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA06  | PRESCANDEN HCT 16<br>MG/12,5 MG, tablett, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1455375         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA06  | CANDESARTAN HCT<br>ACTAVIS, tablett, 28TK      | Actavis Group PTC ehf            | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1487819         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA06  | CARZAN HCT<br>16MG/12,5MG, tablett, 28TK                                      | Zentiva k.s.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |          |        |           |            |  |
| 1634419         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA06  | CANOCOMBI, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |  |
| 1634600         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>32mg+12,5mg | C09DA06  | CANOCOMBI, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |          |        |           |            |  |
| 1634329         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid, 32mg+25mg      | C09DA06  | CANOCOMBI, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |          |        |           |            |  |
| 1634510         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>8mg+12,5mg  | C09DA06  | CANOCOMBI, tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |          |        |           |            |  |
| 1567986         | kapetsitabiin, 150mg                               | L01BC06  | CAPECITABINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK             | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C18-C20          | Onkoloog |        |           |            | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 100              | C22-C25          | Onkoloog |        |           |            | biliopankreatilise<br>süsteemi kasvajate<br>adjuvantraviks                 |
| 1540099         | kapetsitabiin, 500mg                               | L01BC06  | CAPECITABINE ZENTIVA<br>500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Zentiva k.s.                | 100              | C22-C25          | Onkoloog |        |           |            | biliopankreatilise<br>süsteemi kasvajate<br>adjuvantraviks                 |
|                 |  |          |   |                             | 100              | C18-C20          | Onkoloog |        |           |            | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1568055         | kapetsitabiin, 500mg             | L01BC06  | CAPECITABINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK           | Accord Healthcare<br>S.L.U.  | 50               |  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C18-C20  | Onkoloog    |        |           |            | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C22-C25  | Onkoloog    |        |           |            | biliopankreaatilise<br>süsteemi kasvajate<br>adjuvantraviks                |
| 1077117         | karbamasepiin, 150mg             | N03AF01  | TIMONIL 150 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |  |
| 1008649         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | CARBAMAZEPINE<br>NYCOMED, tablett, 50TK                                      | Takeda Pharma AS             | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              |                  |  |             |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035942         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1036055         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, tablett, 50TK   | Teva Pharma B.V. | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042311         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK   | G.L. Pharma GmbH          | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |
| 1077207         | karbamasepiin, 300mg             | N03AF01  | TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115592         | karbamasepiin, 300mg             | N03AF01  | CARBALEX RETARD 300<br>MG, toimeainet prolungeeritult<br>vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F18.4-F18.7, F33.2-<br>F33.3, F70-F79,<br>F00-F09, F15.4-<br>F15.7, F14.4-F14.7,<br>F12.4-F12.7, F30-<br>F31, F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3, F10.4-<br>F10.7, F16.4-F16.7,<br>F32.2-F32.3, F13.4-<br>F13.7, F20-F29,<br>F19.4-F19.7                  | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1035953         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK             | Teva Pharma B.V. | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042322         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01  | CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK  | G.L. Pharma GmbH          | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1007716         | karbamasepiin, 600mg             | N03AF01  | TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|----------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042333         | karbamasepiin, 600mg                                | N03AF01  | CARBALEX RETARD 600<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH           | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1749821         | kariprasiin, 1,5mg                                  | N05AX15  | REAGILA, kõvakapsel, 28TK   | Gedeon Richter Plc.        | 100              | F20-F29, F30-F31   | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1749922         | kariprasiin, 3mg                                    | N05AX15  | REAGILA, kõvakapsel, 28TK   | Gedeon Richter Plc.        | 100              | F20-F29, F30-F31   | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1750025         | kariprasiin, 4,5mg                                  | N05AX15  | REAGILA, kõvakapsel, 28TK   | Gedeon Richter Plc.        | 100              | F20-F29, F30-F31   | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1750104         | kariprasiin, 6mg                                    | N05AX15  | REAGILA, kõvakapsel, 28TK   | Gedeon Richter Plc.        | 100              | F20-F29, F30-F31   | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1110564         | karvedilool, 12,5mg                                 | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 12,5<br>MG, tablett, 30TK                                       | Hexal AG                   | 75               | I50-I50, I47-I49   |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1157543         | karvedilool, 12,5mg                                 | C07AG02  | CORYOL 12,5 MG, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 75               | I50-I50, I47-I49   |             |        |           |            |          |
| 1110520         | karvedilool, 25mg                                   | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 25 MG,<br>tablett, 30TK   | Hexal AG                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 75               | I50-I50, I47-I49   |             |        |           |            |          |
| 1110609         | karvedilool, 6,25mg                                 | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 6,25<br>MG, tablett, 30TK                                       | Hexal AG                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 75               | I50-I50, I47-I49   |             |        |           |            |          |
| 1115637         | keskmise toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AC01  | HUMULIN N KWIKPEN,<br>süstesuspensioon pen-süstlis,<br>3ml 5TK                  | Eli Lilly Nederland B.V.   | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                            | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1   |             |        |           |            |          |
| 1018189         | ketokonasool, 20mg<br>1g                            | D01AC08  | NIZORAL, kreem, 15g 1TK   | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1073461         | ketoprofeen, 100mg               | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy     | 75               | M15-M19                       |           |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 100              | C00-D48                       |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 50               |                               |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |           |        |           |            |  |
| 1073483         | ketoprofeen, 100mg               | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Vitabalans Oy     | 75               | M15-M19                       |           |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 50               |                               |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 100              | C00-D48                       |           |        |           |            |  |
| 1073506         | ketoprofeen, 50mg                | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy     | 75               | M15-M19                       |           |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 50               |                               |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 100              | C00-D48                       |           |        |           |            |  |
| 1073517         | ketoprofeen, 50mg                | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Vitabalans Oy     | 100              | C00-D48                       |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 75               | M15-M19                       |           |        | 63,00     |            |  |
|                 |                                  |          |   |                   | 50               |                               |           |        |           |            |  |
| 1752443         | kladribiin, 10mg                 | L04AA40  | MAVENCLAD, tablett, 1TK                             | Merck Europe B.V. | 100              | G35-G35                       | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks<br>patsientidele, keda on<br>varem ravitud<br>vähemalt kahe<br>esmavaliku ravimiga<br>(beetainterferoon,<br>glatirameeratsetaat,<br>teriflunomiid või<br>dimetüülfumaraat) ja<br>kellel vaatamata<br>eelnevale ravile on<br>viimase aasta jooksul<br>esinenud vähemalt<br>kaks olulist ägenemist |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1486559     | klaritromütsiin, 125mg 5ml    | J01FA09  | LEKOKLAR, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK           | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |
|             |                               |          |   |                             | 50           |                  |        |        |           |            |   |
| 1028887     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50           |                  |        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |
| 1032747     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK           | Mylan Healthcare SIA        | 50           |                  |        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |
| 1110261     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK          | Medochemie Limited          | 50           |                  |        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |
| 1549582     | klaritromütsiin, 250mg        | J01FA09  | CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | AS Grindeks                 | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |
|             |                               |          |   |                             | 50           |                  |        |        |           |            |   |
| 1068881     | klaritromütsiin, 25mg 1ml     | J01FA09  | KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Mylan Healthcare SIA        | 50           |                  |        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |
| 1028876     | klaritromütsiin, 500mg        | J01FA09  | FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50           |                  |        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                             | 75           | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või fenoksümetüülpenitsillii niga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1032758         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID SR 500 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 5TK | Mylan Healthcare SIA                         | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1068904         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID SR 500 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 7TK | Mylan Healthcare SIA                         | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1110238         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLERIMED 500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK              | Medochemie Limited                           | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1141276         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMILID UNO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 5TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                    | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1141287         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMILID UNO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 7TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                    | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1166677         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Sun Pharmaceutical<br>Industries Europe B.V. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
| 1405460         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Mylan Healthcare SIA                         | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsillii<br>niga |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1549627         | klaritromütsiin, 500mg                       | J01FA09  | CLARITHROMYCIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | AS Grindeks                          | 75               | H65-H67, J13-J18 |        |        |           | 16,00      | kui haigus ei allu ravile<br>amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliini<br>niga |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1011160         | klindamütsiin, 100mg                         | G01AA10  | DALACIN, vaginaalsuposiit,<br>3TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG             | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1007503         | klindamütsiin, 150mg                         | J01FF01  | DALACIN C, kõvakapsel,<br>16TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG             | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1007536         | klindamütsiin, 300mg                         | J01FF01  | DALACIN C, kõvakapsel,<br>16TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG             | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1108561         | klindamütsiin, 300mg                         | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 300,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 16TK      | MIP Pharma GmbH                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1108606         | klindamütsiin, 600mg                         | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 600,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 16TK      | MIP Pharma GmbH                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1432268         | klindamütsiin, 600mg                         | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 600,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 32TK      | MIP Pharma GmbH                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1527814         | klindamütsiin+tretinoiin<br>, 10mg+0,25mg 1g | D10AF82  | TRECLINAC, geel, 30g 1TK   | SIA Meda Pharma                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1005208         | klobetasool, 500mcg<br>1g                    | D07AD01  | DERMOVATE OINTMENT,<br>salv, 25g 1TK                                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1005242         | klobetasool, 500mcg<br>1g                    | D07AD01  | DERMOVATE CREAM,<br>kreem, 25g 1TK                                       | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1005286         | klobetasool, 500mcg<br>1ml                   | D07AD01  | DERMOVATE, nahalahus,<br>25ml 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1829325         | klobetasool, 500mcg<br>1ml                   | D07AD01  | DERMOVATE, nahalahus,<br>25ml 1TK  | UAB "Lex ano"                        | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1842386         | klobetasool, 500mcg<br>1ml                   | D07AD01  | DERMOVATE, nahalahus,<br>25ml 1TK  | UAB Ideal Trade Links                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1011407         | klomipramiin, 10mg                           | N06AA04  | ANAFRANIL, kaetud tablett,<br>30TK                                       | Zr Pharma& GmbH                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1001462         | klomipramiin, 25mg                           | N06AA04  | ANAFRANIL, kaetud tablett,<br>30TK                                       | Zr Pharma& GmbH                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|----------------------------------|------------------|--|-------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1011418         | klomipramiin, 75mg                                 | N06AA04  | ANAFRANIL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | Zr Pharma& GmbH                  | 50               |  |                         |        |           |            |   |
| 1004544         | klonasepaam, 2mg                                   | N03AE01  | RIVOTRIL, tablett, 30TK   | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog               | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                  | 50               | G20-G26, G63-G63   |                         |        |           |            |   |
| 1007345         | kloorambutsiil, 2mg                                | L01AA02  | LEUKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                | Aspen Pharma Trading<br>Limited  | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |  |                         |        |           |            |   |
| 1044357         | klooramfenikool, 5mg<br>1ml                        | S01AA01  | OFTAN AKVAKOL,<br>silmatilgad, lahus, 10ml 1TK                        | Santen Oy                        | 50               |  |                         |        |           |            |   |
| 1356937         | kloormadinoon+etünüü<br>lõstradiool,<br>2mg+0,03mg | G03AA15  | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK  | UAB "Exeltis Baltics"            | 50               |  |                         |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                  | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1356948         | kloormadinoon+etünüü<br>lõstradiool,<br>2mg+0,03mg | G03AA15  | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 63TK  | UAB "Exeltis Baltics"            | 50               |  |                         |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                  | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1006063         | kloorprotikseen, 25mg                              | N05AF03  | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                 | H. Lundbeck A/S                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater             | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |  |                         |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1006096         | kloorprotikseen, 50mg            | N05AF03  | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK        | H. Lundbeck A/S       | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |  |                      |        |           |            |   |
| 1040588         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Sanofi-Aventis Groupe | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2   | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |  |                      |        |           |            |   |
| 1065743         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK        | Sanofi-Aventis Groupe | 50               |  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2   | Kardioloog, Sisearst | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
| 1357141         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | TROMBEX 75 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.          | 50               |  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2   | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1367197         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL<br>SANOSWISS 75MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB SanoSwiss             | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2 | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
| 1371484         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Actavis Group PTC ehf     | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2 | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
| 1371530         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 90TK           | Actavis Group PTC ehf     | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2 | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
| 1431256         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK            | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2 | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1437465         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | ZYLLT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2   | Kardioloog, Sisearst | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
| 1437500         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | ZYLLT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2   | Kardioloog, Sisearst | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
| 1448489         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 84TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2   | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |                      |        |           |            |   |
| 1004724         | klosapiin, 100mg                 | N05AH02  | LEPONEX, tablett, 50TK   | Mylan Healthcare SIA      | 50               |  |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 |                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1663859         | klosapiin, 100mg                 | N05AH02  | CLOZAPINE ACCORD,<br>tablett, 50TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1004768         | klosapiin, 25mg                  | N05AH02  | LEPONEX, tablett, 50TK             | Mylan Healthcare SIA      | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 |        |        |           |            |          |
| 1663657         | klosapiin, 25mg                  | N05AH02  | CLOZAPINE ACCORD,<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1033692         | klotrimasool,<br>1%/100mg            | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM,<br>kreem + vaginaalsuposiit, 20g<br>1TK / 6TK            | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1033726         | klotrimasool, 100mg                  | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit, 6TK                                 | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1045123         | klotrimasool, 100mg                  | G01AF02  | KLOTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                                  | GlaxoSmithKline<br>Pharmaceuticals S.A.           | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1831014         | klotrimasool, 100mg                  | G01AF02  | KLOTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                                  | UAB Ideal Trade Links                             | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1033737         | klotrimasool, 200mg                  | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit, 3TK                                 | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1140815         | kodeiin+parasetamool<br>, 30mg+500mg | N02AJ06  | PARACETAMOL/CODEINE<br>VITABALANS, tablett, 30TK                           | Vitalbans Oy                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1140826         | kodeiin+parasetamool<br>, 30mg+500mg | N02AJ06  | PARACETAMOL/CODEINE<br>VITABALANS, tablett, 100TK                          | Vitalbans Oy                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1485187         | kodeiin+parasetamool<br>, 30mg+500mg | N02AJ06  | ALGOCALM, tablett, 30TK  | Zentiva k.s.                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1485200         | kodeiin+parasetamool<br>, 30mg+500mg | N02AJ06  | ALGOCALM, tablett, 100TK   | Zentiva k.s.                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1241356         | kvetiapiin, 100mg                    | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | Orion Corporation                                 | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1258297         | kvetiapiin, 100mg                    | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1636792         | kvetiapiin, 150mg                    | N05AH04  | KVENTIAX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                         | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |  |   | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1683750         | kvetiapiin, 150mg                    | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V.                         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1115086         | kvetiapiin, 200mg                    | N05AH04  | SEROQUEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | AstraZeneca AB                                    | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1241378         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | Orion Corporation         | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1258477         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1301847         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Teva Pharma B.V.          | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1454059         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1636859         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KVENTIAX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1241334         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | Orion Corporation         | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1258208         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1258242         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1377503         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Teva Pharma B.V.          | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1301937         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Teva Pharma B.V.          | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1454149         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1496998         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.          | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1454206         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V.            | 50               |                  |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater   |        |           |            |   |
| 1497067         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.                     | 50               |                  |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater   |        |           |            |   |
| 1724510         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | KVENTIAX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |               |        |           |            |   |
| 1555253         | kvetiapiin, 50mg                 | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V.            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |               |        |           |            |   |
| 1007828         | labetalool, 100mg                | C07AG01  | TRANDATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                     | Aspen Pharma Trading<br>Limited      | 50               |                  |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | O10-O16          |               |        |           |            |   |
| 1043042         | lamivudiin, 100mg                | J05AF05  | ZEFFIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |               |        |           |            |   |
| 1025873         | lamivudiin, 150mg                | J05AF05  | EPIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                       | Viiv Healthcare B.V.                 | 50               |                  | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1379123         | lamotrigiin, 100mg               | N03AX09  | LAMICTAL 100MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK                    | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | F30-F31          | Psühhiaater   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G40-G40          | Neuroloog     | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |               |        |           |            |   |
| 1394210         | lamotrigiin, 25mg                | N03AX09  | LAMICTAL 25MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | G40-G40          | Neuroloog     | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F30-F31          | Psühhiaater   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |               |        |           |            |   |
| 1379088         | lamotrigiin, 50mg                | N03AX09  | LAMICTAL 50MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK                     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | F30-F31          | Psühhiaater   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G40-G40          | Neuroloog     | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |               |        |           |            |   |
| 1141434         | lamotrigiin, 5mg                 | N03AX09  | LAMICTAL 5MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 30TK                      | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | G40-G40          | Neuroloog     | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F30-F31          | Psühhiaater   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|--------------------------|----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1394018         | lamotrigiin, 5mg                 | N03AX09  | LAMICTAL 5MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK   | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited                            | 100              | F30-F31                  | Psühhiaater                |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | G40-G40                  | Neuroloog                  | esmane |           |            |   |
| 1134560         | lanreotiid, 120mg                | H01CB03  | SOMATULINE AUTOGEL<br>120MG, süstelahus süstlis,<br>1TK | Ipsen Pharma  | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Onkoloog,<br>Endokrinoloog |        |           |            | neuroendokriinkasvaja<br>või akromegaalia<br>raviks   |
| 1134582         | lanreotiid, 60mg                 | H01CB03  | SOMATULINE AUTOGEL<br>60MG, süstelahus süstlis,<br>1TK  | Ipsen Pharma  | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Onkoloog,<br>Endokrinoloog |        |           |            | neuroendokriinkasvaja<br>või akromegaalia<br>raviks   |
| 1134571         | lanreotiid, 90mg                 | H01CB03  | SOMATULINE AUTOGEL<br>90MG, süstelahus süstlis,<br>1TK  | Ipsen Pharma  | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Endokrinoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | neuroendokriinkasvaja<br>või akromegaalia<br>raviks   |
| 1235056         | lantaan, 750mg                   | V03AE03  | FOSRENOL, närimistablett,<br>90TK                       | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 100              | N18-N18                  | Nefroloog, Pediaater       |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
| 1781232         | lantaan, 750mg                   | V03AE03  | CALAFOS, närimistablett,<br>90TK                        | Mylan Ireland Limited   | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | N18-N18                  | Pediaater, Nefroloog       |        |           |            | kui kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l)           |
| 1041196         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | XALATAN, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK               | Upjohn EESV   | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog                | esmane |           |            |   |
| 1165733         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | GLAUMAX, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK               | Aktsiaselts KEVELT  | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog                | esmane |           |            |   |
| 1346790         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATANOPROST ACTAVIS,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK   | Actavis Group PTC ehf   | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog                | esmane |           |            |   |
| 1346802         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATANOPROST ACTAVIS,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK   | Actavis Group PTC ehf   | 50               |                          |                            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog                | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1377873         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | UNILAT, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                  | Unimed Pharma spol.<br>s r.o.        | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |           |            |   |
| 1385771         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATIZOLIL, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK               | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.       | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |           |            |   |
| 1073001         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |            |   |
| 1073023         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK     | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1122578         | latsidipiin, 6mg                 | C08CA09  | LACIPIL 6MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | GlaxoSmithKline<br>S.p.A.            | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |            |   |
| 1009921         | leflunomiid, 10mg                | L04AA13  | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH   | 75               | M07-M07          | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M05-M06          | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1009932         | leflunomiid, 20mg                | L04AA13  | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 50               |          |                           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M05-M06  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotrektsaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M07-M07  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui metotrektsaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299551         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1747762         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 21TK    | Teva B.V.         | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |
| 1748156         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE AUXILIA,<br>kõvakapsel, 21TK | Auxilia Pharma OÜ | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1766000         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | AS Grindeks     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1780411         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 21TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1806072         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 21TK | Zentiva k.s.    | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1747784         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 21TK | Teva B.V.       | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoologi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1748202         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE AUXILIA,<br>kõvakapsel, 21TK | Auxilia Pharma OÜ | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1766022         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | AS Grindeks     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoologi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1780433         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 21TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1806094         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 21TK | Zentiva k.s.    | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1747807         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 21TK | Teva B.V.       | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1748257         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE AUXILIA,<br>kõvakapsel, 21TK | Auxilia Pharma OÜ | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1766066         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | AS Grindeks     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1780455         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 21TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1806139         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | LENALIDOMIDE ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 21TK | Zentiva k.s.    | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoologi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299540     | lenalidomiid, 5mg             | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100          | D46-D46  | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti kolme hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsiilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1747740         | lenalidomiid, 5mg                | L04AX04  | LENALIDOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 21TK | Teva B.V.       | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1748101         | lenalidomiid, 5mg                | L04AX04  | LENALIDOMIDE AUXILIA,<br>kõvakapsel, 21TK | Auxilia Pharma OÜ | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1765964         | lenalidomiid, 5mg                | L04AX04  | LENALIDOMIDE GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | AS Grindeks     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1780376         | lenalidomiid, 5mg                | L04AX04  | LENALIDOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 21TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoologi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1780398         | lenalidomiid, 7,5mg              | L04AX04  | LENALIDOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 21TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle ravi<br>alustamise<br>lenalidomiidiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>tingimustele:<br>vereloome tüvirakkude<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile sõltumata<br>ravireast ning<br>siirdamise<br>näidustusega<br>patsiendile<br>kombinatsioonis<br>steroidiga juhul, kui<br>bortesomiib ja<br>talidomiid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud<br>ebaefektiivseks ning<br>patsient on heas<br>üldseisundis<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1687192         | lenvatiniib, 10mg                | L01EX08  | LENVIMA, kõvakapsel, 30TK | Eisai GmbH      | 100              | C73-C73  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on $\geq 22,2$ GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1687181         | lenvatiniib, 4mg                 | L01EX08  | LENVIMA, kõvakapsel, 30TK | Eisai GmbH      | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni,<br>kui ravi alustamise<br>lenvatiniibiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud või<br>opereerimatu<br>hepatotsellulaarne<br>kartsinoom, patsiendi<br>üldseisund on hea<br>(funktsionaalne klass<br>0-1 ECOG järgi) ning<br>maksa funktsioon ei<br>ole oluliselt häiritud.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>lenvatiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2020.<br>a |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C73-C73  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni,<br>kui ravi alustamise<br>lenvatiniibiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 2 onkoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumitele:<br>diagnoositud<br>progresseeruv,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatiline,<br>diferentseeritud<br>(papillaarne/follikulaarne/<br>Hürthle-rakuline),<br>radioaktiivsele joodile<br>allumatu kilpnäärme<br>kartsinoom ja patsiendi<br>üldseisund on hea<br>(funktsionaalne klass<br>0-1 ECOG järgi). RAI<br>allumatu kilpnäärme<br>kartsinoom on<br>diagnoositud, kui<br>esineb vähemalt üks<br>haiguskolle, mis ei<br>näita RAI-skaneeringul<br>joodi neeldumist, või<br>haigus progresseerub<br>RAI-ravi foonil, või<br>kumulatiivne RAI<br>annus on $\geq 22,2$ GBq.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>lenvatiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2020.<br>a |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1474950         | lerkanidipiin, 10mg              | C08CA13  | LERCAPIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                      | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |           |            |  |
| 1611234         | lerkanidipiin, 10mg              | C08CA13  | LERCANIDIPINE ACTAVIS<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Actavis Group PTC ehf                                   | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |           |            |  |
| 1474994         | lerkanidipiin, 20mg              | C08CA13  | LERCAPIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                      | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
| 1611245         | lerkanidipiin, 20mg              | C08CA13  | LERCANIDIPINE ACTAVIS<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Actavis Group PTC ehf                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
| 1034334         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | FEMARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | SIA Novartis Baltics                                    | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50          | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1302398         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE SANOSWISS<br>2,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | UAB SanoSwiss   | 100              | C50-C50          | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
| 1349771         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Teva Pharma B.V.  | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50          | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1409352         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK              | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50          | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1554702         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LORTANDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 100              | C50-C50          | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |                                       |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1836738         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK     | UAB Ideal Trade Links       | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | C50-C50  | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1198975         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | UCB Pharma S.A.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1544981         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | Teva B.V.                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1545566         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
| 1546130         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Pharmathen S.A.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1198762         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | UCB Pharma S.A.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1544802         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | Teva B.V.                   | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
| 1545353         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
| 1545904         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Pharmathen S.A.             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
| 1198829         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | UCB Pharma S.A.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1495054         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | NORMEG 500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Zentiva k.s.                | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1544868         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK   | Teva B.V.                   | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            |  |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|--------------|--|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1545421     | levetiratsetaam, 500mg           | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Accord Healthcare S.L.U. | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1545960     | levetiratsetaam, 500mg           | N03AX14  | MATEVER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                    | Pharmathen S.A.          | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 100          | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1077049     | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80  | MADOPAR, disperseeruv tablett, 100TK                               | Roche Eesti Osaühing     | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1082922     | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80  | MADOPAR, kõvakapsel, 100TK   | Roche Eesti Osaühing     | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 50           |  |           |        |           |            |          |
| 1085161     | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80  | MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti Osaühing     | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1002014     | levodopa+benserasiid, 200mg+50mg | N04BA80  | MADOPAR, tablett, 100TK  | Roche Eesti Osaühing     | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1599611     | levodopa+benserasiid, 200mg+50mg | N04BA80  | MADOPAR, tablett, 100TK  | First Pharma OÜ          | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 50           |  |           |        |           |            |          |
| 1798072     | levodopa+karbidopa, 100mg+25mg   | N04BA81  | SINEMET 25/100, tablett, 60TK                                      | N.V. Organon             | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |                                  |          |  |                          | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|--|----------|---|-------------------|--------------|--|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006861     | levodopa+karbidopa, 250mg+25mg                     | N04BA81  | SINEMET 25/250, tablett, 100TK  | N.V. Organon      | 100          | G23-G23, G20-G20, G90.3-G90.3, G24.1-G24.1, G21-G21, G31.8-G31.8 | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 50           |  |           |        |           |            |          |
| 1172854     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 100mg+25mg+200mg    | N04BA03  | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                            | Orion Corporation | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1629716     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 100mg+25mg+200mg    | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.  | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1172898     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg  | N04BA03  | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                            | Orion Corporation | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 50           |  |           |        |           |            |          |
| 1630257     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 150mg+37,5mg+200mg  | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.  | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1538580     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 175mg+43,75mg+200mg | N04BA03  | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                            | Orion Corporation | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 50           |  |           |        |           |            |          |
| 1368020     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg    | N04BA03  | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                            | Orion Corporation | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1630527     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 200mg+50mg+200mg    | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.  | 50           |  |           |        |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1629974     | levodopa+karbidopa+entakapoon, 75mg+18,75mg+200mg  | N04BA03  | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.  | 100          | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|             |  |          |   |                   | 50           |  |           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1549650         | levonorgestreel,<br>13,5mg                              | G02BA03  | FLEREE, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                 | Bayer AG                  | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                           | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1703955         | levonorgestreel,<br>19,5mg                              | G02BA03  | KYLEENA, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                | Bayer AG                  | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                           | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1009493         | levonorgestreel, 52mg                                   | G02BA03  | MIRENA, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                 | Bayer AG                  | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |   |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1816118         | levonorgestreel, 52mg                                   | G02BA03  | DONASERT, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK               | Gedeon Richter Plc.       | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |   |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1621752         | levonorgestreel+etünu<br>ülöstradiool,<br>0,15mg+0,03mg | G03AA07  | LEVERETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | UAB "Exeltis Baltics"     | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                           | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1223064         | levotsetirisiin, 0,5mg<br>1ml                           | R06AE09  | XYZAL, suukaudne lahus,<br>200ml 1TK                      | UCB Pharma Oy<br>Finland  | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1138137         | levotsetirisiin, 5mg                                    | R06AE09  | XYZAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | UCB Pharma Oy<br>Finland  | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1512065         | levotsetirisiin, 5mg                                    | R06AE09  | CEZERA 5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1607240         | liksisenatiid,<br>10mcg/20mcg 0.2ml | A10BJ03  | LYXUMIA, süstelahus, 3ml<br>1TK / 3ml 1TK | Sanofi-Aventis Groupe | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |          |   |                       | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1607228         | liksisenatiid, 20mcg<br>0.2ml    | A10BJ03  | LYXUMIA, süstelahus, 3ml<br>2TK                        | Sanofi-Aventis Groupe                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |  | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |
| 1539288         | linagliptiin, 5mg                | A10BH05  | TRAJENTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1733071         | linagliptiin+empagliflo-<br>sin, 5mg+10mg | A10BD19  | GLYXAMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |   |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1733161         | linagliptiin+empagliflo-<br>sin, 5mg+25mg | A10BD19  | GLYXAMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | I50-I50  |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |                                  |          |                       |                 | 50               |          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1643251         | linesoliid, 600mg  | J01XX08  | LINEZOLID ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | Accord Healthcare<br>B.V.       | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1751206         | linesoliid, 600mg  | J01XX08  | APEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK             | Medochemie Limited              | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1063763         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000ühik+8000ühik+<br>600ühik   | A09AA02  | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>50TK       | Mylan IRE Healthcare<br>Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                 | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1020205         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000ühik+9000ühik+<br>500ühik   | A09AA02  | PANGROL 10000,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK        | Berlin-Chemie AG                | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                 | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1060434         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>20000ühik+12000ühik<br>+900ühik  | A09AA02  | MEZYM 20 000,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK           | Berlin-Chemie AG                | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                 | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1044470         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000ühik+18000ühik<br>+1000ühik | A09AA02  | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK       | Mylan IRE Healthcare<br>Limited | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                 | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1063707         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000ühik+18000ühik<br>+1000ühik | A09AA02  | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>50TK       | Mylan IRE Healthcare<br>Limited | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                 | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1020182         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000ühik+22500ühik<br>+1250ühik | A09AA02  | PANGROL 25000,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK        | Berlin-Chemie AG                | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                 | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1426845         | liraglutiid, 6mg 1ml                | A10BJ02  | VICTOZA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 2TK        | Novo Nordisk A/S         | 50               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |
|                 |                                     |          |   |                          | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
| 1300598         | lisinopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg | C09BB03  | DIRONORM, tablett, 30TK                             | Gedeon Richter Plc.      | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1501456         | lisinopriil+amlodipiin,<br>20mg+5mg | C09BB03  | DIRONORM, tablett, 30TK                             | Gedeon Richter Plc.      | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1111284         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml     | A10AB04  | HUMALOG, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK        | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1364510         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml     | A10AB04  | HUMALOG KWIKPEN,<br>süstelahus, 3ml 5TK             | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1364532         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml     | A10AD04  | HUMALOG MIX25 KWIKPEN,<br>süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1364554         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml         | A10AD04  | HUMALOG MIX50 KWIKPEN,<br>süstesuspensioon, 3ml 5TK            | Eli Lilly Nederland B.V.               | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1754692         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml         | A10AB04  | HUMALOG JUNIOR<br>KWIKPEN, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland B.V.               | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
| 1814408         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml         | A10AB04  | LYUMJEV KWIKPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK         | Eli Lilly Nederland B.V.               | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
| 1713248         | lispro-insuliin, 200ühik<br>1ml         | A10AB04  | HUMALOG KWIKPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK         | Eli Lilly Nederland B.V.               | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1063482         | loperamiid, 2mg                         | A07DA03  | IMODIUM, kõvakapsel, 20TK                                      | McNeil Healthcare<br>(Ireland) Limited | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1503571         | loperamiid, 2mg                         | A07DA03  | LOPACUT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK          | Vitabalans Oy                          | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1284320         | lopinaviir+ritonaviir,<br>200mg+50mg    | J05AR10  | KALETRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK         | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG    | 50               |  | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1082472         | lopinaviir+ritonaviir,<br>80mg+20mg 1ml | J05AR10  | KALETRA, suukaudne lahus,<br>60ml 5TK                          | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG    | 50               |  | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1805756         | lornoksikaam, 8mg                       | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK       | First Pharma OÜ                        | 50               |  |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1805767         | lornoksikaam, 8mg                | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | First Pharma OÜ           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1830608         | lornoksikaam, 8mg                | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                | UAB Ideal Trade Links     | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1834332         | lornoksikaam, 8mg                | M01AC05  | XEFO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                      | UAB "Lex ano"             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1207167         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOZAP 100, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Zentiva k.s.              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1210688         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOZAP 100, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Zentiva k.s.              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1268962         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LORISTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1288256         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOSARTAN ACCORD 100<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1013735         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LORISTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1207134         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LOZAP 50, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Zentiva k.s.              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1210701         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LOZAP 50, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Zentiva k.s.              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1288245         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LOSARTAN ACCORD 50<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1166059         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg   | C09DA01  | LORISTA H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                       | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1217809         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg   | C09DA01  | LOZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Zentiva k.s.                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
| 1217810         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg   | C09DA01  | LOZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK   | Zentiva k.s.                                    | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1185195         | loteprednool, 0,5%   | S01BA14  | LOTEMAX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK           | Dr. Gerhard Mann<br>Chem.-pharm. Fabrik<br>GmbH | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 7000175         | L-tsitrulliin,   |          | L-CITRULLINE , pulber, 100<br>g N1                      | SHS   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 7017476         | L-tsitrulliin,   |          | L-CITRULLINE, pulber, 100g<br>N10                       | SHS International Ltd                           | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1029417         | lühikese toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml  | A10AB01  | HUMULIN R, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK          | Eli Lilly Nederland B.V.                        | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1479416         | makrogool+naatriumsu<br>lfaat,<br>veevaba+naatriumklorii<br>d+kaaliumkloriid+askor<br>biinhape+naatriumask<br>orbaat,<br>100g+7,5g+2,691g+1,<br>015g+0+0/0+0+0+4,<br>7g+5,9g | A06AD83  | MOVIPREP, suukaudse<br>lahuse pulber, 2TK / 2TK         | Norgine B.V.                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1636602         | matsitentaan, 10mg               | C02KX04  | OPSUMIT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafili ja<br>bosentaan on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1007222         | mebendasool, 100mg               | P02CA01  | VERMOX 100 MG, tablett,<br>6TK   | Gedeon Richter Plc.                 | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1008245         | mebendasool, 100mg               | P02CA01  | MEBENDAZOLE-GRINDEKS,<br>tablett, 6TK                                  | AS Grindeks                         | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1832486         | mebendasool, 100mg               | P02CA01  | VERMOX 100 MG, tablett,<br>6TK   | UAB "Lex ano"                       | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1837076         | mebendasool, 100mg               | P02CA01  | VERMOX 100 MG, tablett,<br>6TK   | UAB Ideal Trade Links               | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1136696         | mebeveriin, 200mg                | A03AA04  | DUSPATALIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Mylan Healthcare SIA                | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1013195         | medroksüprogesteroon<br>, 500mg  | L02AB02  | FARLUTAL, tablett, 30TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG            | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | C00-D48     | Onkoloog   |        |           |            |  |
| 1004410         | melfalaan, 2mg                   | L01AA03  | ALKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                  | Aspen Pharma Trading<br>Limited     | 100              | C00-D48     | Onkoloog,<br>Hematoloog                                  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |             |  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035021         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 20TK          | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1140680         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MELOX 15MG, tablett, 20TK       | Medochemie Limited                         | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1149779         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MEXOLAN 15 MG, tablett,<br>30TK | G.L. Pharma GmbH                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1175936         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | RECOXA, tablett, 20TK           | Zentiva k.s.                               | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
| 1189199         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | LORMED 15 MG, tablett,<br>20TK  | Pro.med.cs Praha a.s.                      | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
| 1240254         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | RECOXA, tablett, 60TK           | Zentiva k.s.                               | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                 |  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1360189         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>15 MG, tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH                            | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
| 1560260         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MELOX 15MG, tablett, 60TK                    | Medochemie Limited                         | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1035009         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 20TK                       | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1140679         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOX 7,5MG, tablett, 30TK                   | Medochemie Limited                         | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1146350         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 50TK                       | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1149746         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MEXOLAN 7,5 MG, tablett,<br>30TK             | G.L. Pharma GmbH                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | C00-D48                       |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1360134         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>7,5 MG, tablett, 20TK          | Ratiopharm GmbH    | 100              | C00-D48  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | M15-M19  |             |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1360156         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>7,5 MG, tablett, 50TK          | Ratiopharm GmbH    | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | M15-M19  |             |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 100              | C00-D48  |             |        |           |            |          |
| 1560271         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOX 7,5MG, tablett, 60TK                             | Medochemie Limited | 75               | M15-M19  |             |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 100              | C00-D48  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1006007         | melperoon, 25mg                  | N05AD03  | BURONIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Medilink A/S       | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006030         | melperoon, 50mg                  | N05AD03  | BURONIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | Medilink A/S                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1123524         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | AXURA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1123535         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | AXURA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1614563         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1614608         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1618747         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE RATIOPHARM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Ratiopharm GmbH              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1618781         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE RATIOPHARM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Ratiopharm GmbH              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1621998         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Medochemie Limited           | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1622023         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK             | Medochemie Limited           | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1635331         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Accord Healthcare<br>S.L.U.     | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1635375         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK          | Accord Healthcare<br>S.L.U.     | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1648739         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK        | AS Grindeks                     | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1621819         | memantiin, 20mg                  | N06DX01  | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Medochemie Limited              | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1004971         | merkaptopuriin, 50mg             | L01BB02  | PURI-NETHOL, tablett, 25TK  | Aspen Pharma Trading<br>Limited | 100              | C00-D48          | Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1737648         | mesalasiin, 1600mg               | A07EC02  | YALDIGO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK       | Tillotts Pharma AB              | 50               |                  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                     |        |           |            |          |
| 1023815         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | PENTASA, rektaalsuposiit,<br>28TK                                       | Ferring GmbH                    | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                     |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1352810         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | PENTASA 1G, toimeainet<br>prolongeeritult vabastavad<br>graanulid, 50TK | Ferring GmbH                    | 50               |                  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                     |        |           |            |          |
| 1807578         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | YALDIGO, rektaalsuposiit,<br>30TK                                       | Tillotts Pharma AB              | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                     |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1352854         | mesalasiin, 2g                   | A07EC02  | PENTASA 2G, toimeainet<br>prolongeeritult vabastavad<br>graanulid, 60TK | Ferring GmbH                    | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                     |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |                  |  |        |           |            |          |
| 1146574         | mesalasiin, 400mg                | A07EC02  | ASACOL 400MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Tillotts Pharma AB              | 50               |                  |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater                                     |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1023826         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | PENTASA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK       | Ferring GmbH                   | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog              |        |           |            |  |
| 1146541         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | ASACOL, rektaalsuposiit,<br>20TK  | Tillotts Pharma AB             | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog              |        |           |            |  |
| 1184970         | mesalasiin, 800mg                | A07EC02  | ASACOL 800 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Tillotts Pharma AB             | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater              |        |           |            |  |
| 1034109         | metadoon, 1mg 1ml                | N07BC02  | METADON DAK 1 MG/ML,<br>suukaudne lahus, 1000ml<br>1TK                  | Orifarm Healthcare<br>A/S      | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | R52.1-R52.1      | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |  |
| 1684155         | metadoon, 20mg                   | N07BC02  | METADON DAK, tablett,<br>100TK  | Orifarm Healthcare<br>A/S      | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | R52.1-R52.1      | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1164798         | metformiin, 1000mg               | A10BA02  | METFORAL 1000 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK         | Laboratori Guidotti<br>S.p.A.  | 50               |                  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |  |
| 1302949         | metformiin, 1000mg               | A10BA02  | METFOGAMMA 1000,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK          | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1568246         | metformiin, 1000mg               | A10BA02  | METFORMIN TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                 | Teva Pharma B.V.               | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1064719         | metformiin, 500mg                | A10BA02  | METFORAL 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | Berlin-Chemie AG               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1083169         | metformiin, 500mg                | A10BA02  | METFORMIN-RATIOPHARM<br>500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Ratiopharm GmbH                | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1116380         | metformiin, 500mg                | A10BA02  | METFOGAMMA 500,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                 | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1064731         | metformiin, 850mg                | A10BA02  | METFORAL 850 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | Berlin-Chemie AG               | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1083158         | metformiin, 850mg                | A10BA02  | METFORMIN-RATIOPHARM<br>850 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Ratiopharm GmbH                | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1111262         | metformiin, 850mg                | A10BA02  | METFOGAMMA 850,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                 | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1156609         | metformiin, 850mg                | A10BA02  | METFORMIN SANDOZ 850<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK     | Sandoz GmbH                    | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1637917         | metformiin+dapagliflosi<br>in, 1000mg+5mg | A10BD15  | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | AstraZeneca AB  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                 | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |   |          |  |                 | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikraviga<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1637861         | metformiin+dapagliflosi<br>in, 850mg+5mg | A10BD15  | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | AstraZeneca AB  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                 | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikraviga<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |  |          |  |                 | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1687136         | metformiin+empagliflos<br>iin, 1000mg+12,5mg | A10BD20  | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |  |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1686955         | metformiin+empagliflo-<br>siin, 1000mg+5mg | A10BD20  | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |  |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1687046         | metformiin+empagliflo-<br>siin, 850mg+12,5mg | A10BD20  | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |  |          |  |  | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikraviga<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1686865         | metformiin+empagliflo-<br>siin, 850mg+5mg | A10BD20  | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | I50-I50          |        |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1767731         | metformiin+ertugliflosiin, 1000mg+2,5mg | A10BD23  | SEGLUROMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme B.V.                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1767876         | metformiin+ertugliflosiin, 1000mg+7,5mg | A10BD23  | SEGLUROMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme B.V.                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | kombinatsioonraviks rasvumisega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1590599         | metformiin+linagliptiin, 1000mg+2,5mg   | A10BD11  | JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1590465         | metformiin+linagliptiin,<br>850mg+2,5mg   | A10BD11  | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1550326         | metformiin+saksagliptiin,<br>1000mg+2,5mg | A10BD10  | KOMBOGLYZE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | AstraZeneca AB                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1550270         | metformiin+saksagliptiin,<br>850mg+2,5mg  | A10BD10  | KOMBOGLYZE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | AstraZeneca AB                             | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1361034         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD07  | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>patsientidele, kelle ravi<br>sitagliptiini sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a. |
|                 |   |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus on patsientidele,<br>kelle ravi sitagliptiini<br>sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1360965         | metformiin+sitagliptiin,<br>850mg+50mg    | A10BD07  | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.   | 50               |                  |        |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus on patsientidele,<br>kelle ravi sitagliptiini<br>sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a   |
|                 |   |          |   |                               | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>patsientidele, kelle ravi<br>sitagliptiini sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a. |
| 1349401         | metformiin+vildagliptiin<br>, 1000mg+50mg | A10BD08  | EUCREAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Novartis Europharm<br>Limited | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |
|                 |   |          |   |                               | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1714968         | metformiin+vildagliptiin<br>, 1000mg+50mg | A10BD08  | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1720864         | metformiin+vildagliptiin<br>, 1000mg+50mg | A10BD08  | DALTEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Medochemie Limited             | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1349344         | metformiin+vildagliptiin<br>, 850mg+50mg  | A10BD08  | EUCREAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Novartis Europharm<br>Limited  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1714913         | metformiin+vildagliptiin<br>, 850mg+50mg                     | A10BD08  | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11         |                                  |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1720796         | metformiin+vildagliptiin<br>, 850mg+50mg                     | A10BD08  | DALTEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Medochemie Limited             | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11         |                                  |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1000674         | metoklopramiid, 10mg   | A03FA01  | CERUCAL, tablett, 50TK                                | Teva Pharma B.V.               | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 100              | C00-D48                  |                                  |        |           |            |   |
| 1699050         | metoklopramiid, 10mg   | A03FA01  | METOCLOPRAMIDE<br>ACCORD, tablett, 50TK               | Accord Healthcare<br>B.V.      | 100              | C00-D48                  |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1327643         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>100mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>GmbH     | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86         | Pediaater, Uroloog,<br>Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
| 1370540         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>120mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>GmbH     | 100              | D63-D63, T86-T86         | Nefroloog,<br>Pediaater, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |   |                                | 50               |                          |                                  |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1 | Hematoloog                       |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1327665         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>200mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK                                | Roche Registration<br>GmbH     | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1                        | Hematoloog                       |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D63-D63, T86-T86                                | Nefroloog, Uroloog,<br>Pediaater |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1327621         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK                                | Roche Registration<br>GmbH     | 100              | D63-D63, T86-T86                                | Pediaater, Uroloog,<br>Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1                        | Hematoloog                       |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
| 1327632         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK                                | Roche Registration<br>GmbH     | 100              | D46-D46, D47.1-<br>D47.1                        | Hematoloog                       |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 100              | D63-D63, T86-T86                                | Nefroloog, Uroloog,<br>Pediaater |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |  |                                | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
| 1010811         | metoprolol, 100mg  | C07AB02  | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK           | Teva B.V.                      | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
| 1019720         | metoprolol, 100mg  | C07AB02  | BETALOC ZOK 100,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Recordati Ireland<br>Limited   | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |                                  |        |           |            |  |
| 1224278         | metoprolol, 100mg  | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |                                  |        |           |            |  |
| 1224290         | metoprolol, 100mg  | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |                                  |        |           |            |  |
| 1672286         | metoprolol, 100mg  | C07AB02  | BLOXAZOC 100, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |   |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |                                  |        |           |            |  |
| 1083406         | metoprolol, 25mg   | C07AB02  | BETALOC ZOK 25,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | Recordati Ireland<br>Limited   | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |                                  |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |   |                                  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224201         | metoprolol, 25mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1672130         | metoprolol, 25mg                 | C07AB02  | BLOXAZOC 25, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1009055         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM 50 MG,<br>tablett, 30TK   | Ratiopharm GmbH                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1010800         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                  | Teva B.V.                      | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1019719         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | BETALOC ZOK 50,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                         | Recordati Ireland<br>Limited   | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1072190         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL STADA,<br>tablett, 100TK   | Stada Arzneimittel AG          | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1224245         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1224267         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1282160         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 50<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1672174         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | BLOXAZOC 50, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1672242         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | BLOXAZOC 50, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-<br>I20, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1001136         | metotreksaat, 2,5mg              | L04AX03  | METHOTREXATE ORION,<br>tablett, 100TK | Orion Corporation     | 50               |                           |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 100              | C00-D48                   | Hematoloog,<br>Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog, Onkoloog    |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 75               | L40-L40                   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater                                    |        |           |            |          |
| 1688744         | metotreksaat, 2,5mg              | L04AX03  | TREXAN, tablett, 100TK                | Orion Corporation     | 50               |                           |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 75               | L40-L40                   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                                    |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 100              | C00-D48                   | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |
| 1847651         | metotreksaat, 2,5mg              | L04AX03  | TREXAN, tablett, 100TK                | UAB Ideal Trade Links | 75               | L40-L40                   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater                                    |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 50               |                           |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 100              | C00-D48                   | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                       | 75               | M45-M46, M30-M35, M05-M08 | Pediaater,<br>Reumatoloog  |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1418914         | metotreksaat, 20mg<br>1ml        | L04AX03  | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 1ml 5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolset kõrvaltoimed |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed   |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           | 5,00       |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1418925         | metotreksaat, 20mg<br>1ml        | L04AX03  | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 1.25ml<br>5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolsete kõrvaltoimed |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           | 5,00       |   |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1547074         | metotreksaat, 20mg<br>1ml        | L04AX03  | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 0.5ml 5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | L40-L40   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolised kõrvaltoimed |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           | 5,00       |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1547120         | metotreksaat, 20mg<br>1ml        | L04AX03  | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 0.75ml<br>5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed   |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           | 5,00       |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolsed kõrvaltoimed |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1304637         | metotreksaat, 50mg<br>1ml        | L04AX03  | METEX, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 6TK | Medac Gesellschaft für<br>klinische<br>Spezialpräparate mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           | 5,00       |  |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolset kõrvaltoimed |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1304682         | metotreksaat, 50mg<br>1ml        | L04AX03  | METEX, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 6TK | Medac Gesellschaft für<br>klinische<br>Spezialpräparate mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           | 5,00       |  |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | L40-L40   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolsed kõrvaltoimed |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1304738         | metotreksaat, 50mg<br>1ml        | L04AX03  | METEX, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 6TK | Medac Gesellschaft für<br>klinische<br>Spezialpräparate mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolset kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | L40-L40   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimeid   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           | 5,00       |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1304783         | metotreksaat, 50mg<br>1ml        | L04AX03  | METEX, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 6TK                                       | Medac Gesellschaft für<br>klinische<br>Spezialpräparate mbH | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ravile allumatu raske<br>psoriaasiga<br>patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi,<br>sh adekvaatses<br>annuses suukaudse<br>metotreksaadiga on<br>olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi<br>katkestama sundivad<br>kõrvaltoimed   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           | 5,00       |  |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3, M45-<br>M45, M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           |            | patsientidele, kellel<br>eelneva 3 kuu jooksul<br>kombineeritud haiguse<br>kulgu mõjutav ravi, sh<br>adekvaatses annuses<br>suukaudse<br>metotreksaadiga ja<br>glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on<br>olnud ebaefektiivne või<br>on tekkinud ravi<br>katkestama sundivad<br>või annuse tõstmist<br>takistavad seedetrakti<br>poolset kõrvaltoimed |
| 1033658         | metronidasool, 1g                | G01AF01  | ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK   | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel           | 50               |   |                                 |        |           |            |  |
| 1033636         | metronidasool,<br>250mg/100mg    | P01AB01  | ARILIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett +<br>vaginaalsuposiit, 12TK / 6TK | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel           | 50               |   |                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008706         | metronidasool, 500mg             | P01AB01  | METRONIDAZOL ORIFARM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | Orifarm Healthcare<br>A/S                         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1223749         | metronidasool, 7,5mg<br>1g       | D06BX01  | METROSA, geel, 25g 1TK   | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1819234         | metronidasool, 7,5mg<br>1g       | D06BX01  | ROZEX, geel, 30g 1TK   | UAB "Lex ano"                                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1829943         | metronidasool, 7,5mg<br>1g       | D06BX01  | ROZEX, geel, 30g 1TK   | UAB Ideal Trade Links                             | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396335         | metüülfenidaat, 10mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 10MG,<br>toimeainet modifitseeritud<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | Medice Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co.<br>KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1313569         | metüülfenidaat, 18mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1396368         | metüülfenidaat, 20mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 20MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | Medice Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co.<br>KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                          | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1396391     | metüülfenidaat, 30mg          | N06BA04  | MEDIKINET XL 30MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja         | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313581     | metüülfenidaat, 36mg          | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | UAB "JOHNSON & JOHNSON" | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1395266         | metüülfenidaat, 40mg             | N06BA04  | MEDIKINET XL 40MG,<br>toimeainet modifitseeritud<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | Medice Arzneimittel<br>Pütter GmbH & Co.<br>KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus kehtestatud<br>tingimustele lapse- või<br>noorukieas alustatud<br>ravi jätkamiseks 20-<br>aastastel ja vanematel<br>patsientidel ühe aasta<br>jooksul. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1313660         | metüülfenidaat, 54mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (2 Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti 2 erinevas<br>keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | F90.0-F90.1                                     | Psühhiaater  | esmane | 20,00     |            | vastavalt Eesti Haigekassa ravimite loetelus kehtestatud tingimustele lapse- või noorukieas alustatud ravi jätkamiseks 20-aastastel ja vanematel patsientidel ühe aasta jooksul. |
| 1009099         | metüülprednisoloon, 16mg         | H02AB04  | MEDROL, tablett, 50TK                  | Pfizer Europe MA EEIG | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G35-G35   | Neuroloog, Pediaater                                 | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Gastroenteroloog, Pediaater                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                       | Reumatoloog, Pediaater                               | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |  |        |           |            |  |
| 1009190         | metüülprednisoloon, 40mg 1ml     | H02AB04  | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                       | Pediaater, Reumatoloog                               | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G35-G35   | Pediaater, Neuroloog                                 | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1065754         | metüülprednisoloon,<br>4mg               | H02AB04  | MEDROL, tablett, 100TK                   | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                          | Reumatoloog,<br>Pediaater                                      | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 100              | G35-G35  | Neuroloog,<br>Pediaater  | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                       |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 50               |  |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | K50-K51, K73-K74                                       | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | N00-N08  | Nefroloog, Pediaater   |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | L12-L12, L23-L23,<br>L13.0-L13.0, L10-<br>L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1028102         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK                 | LEO Pharma A/S           | 50               |  |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23                           |  |        |           |            |          |
| 1062009         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN, salv, 15g 1TK                  | LEO Pharma A/S           | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23                           |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 50               |  |  |        |           |            |          |
| 1133356         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 20g 1TK | LEO Pharma A/S           | 50               |  |  |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23                           |  |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1764794         | midostauriin, 25mg               | L01EX10  | RYDAPT, pehmekapsel, 56TK                                  | Novartis Europharm Limited  | 100              | C92-C92                  | Hematoloog  |        |           |            | esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos standardse antratsükliini ja tsütarabiini induktsioonkeemiaravi ga ning koos suures annuses tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult midostauriiniga |
| 1024579         | mikonasool, 20mg 1g              | A01AB09  | DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK                          | UAB "JOHNSON & JOHNSON"     | 50               |                          |             |        |           |            |  |
| 1828379         | mikonasool, 20mg 1g              | A01AB09  | DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK                          | UAB "Lex ano"               | 50               |                          |             |        |           |            |  |
| 1604337         | mirabegroon, 50mg                | G04BD12  | BETMIGA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 50               |                          |             |        |           |            |  |
| 1181607         | mirtasapiin, 15mg                | N06AX11  | MIRTASTAD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK    | Stada Arzneimittel AG       | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                          |             |        |           |            |  |
| 1243684         | mirtasapiin, 15mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK          | Orion Corporation           | 50               |                          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1273137         | mirtasapiin, 15mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK        | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1314683         | mirtasapiin, 15mg                | N06AX11  | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK            | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50               |                          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1170166         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | ESPRITAL 30, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | Zentiva k.s.              | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3          | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1181797         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTASTAD 30 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Stada Arzneimittel AG     | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3          | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1243729         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK                | Orion Corporation         | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3          | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
| 1273227         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK              | Actavis Group PTC ehf     | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3          | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
| 1301522         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRZATEN Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK                  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3          | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
| 1243741         | mirtasapiin, 45mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK                | Orion Corporation         | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3          | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
| 1154618         | moksifloksatsiin,<br>400mg       | J01MA14  | AVELOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 5TK                    | Bayer AG                  | 50               | J44-J44, J41-J41,<br>J47-J47, J13-J15 |             |        |           |            | kui beetalaktaam-<br>antibiootikum,<br>tetratsükliin ja<br>makroliid on<br>ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |
| 1751891         | moksifloksatsiin,<br>400mg       | J01MA14  | FLOXELAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 5TK                  | Medochemie Limited        | 100              | F30-F31                               | Psühhiaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               | J44-J44, J41-J41,<br>J47-J47, J13-J15 |             |        |           |            | kui beetalaktaam-<br>antibiootikum,<br>tetratsükliin ja<br>makroliid on<br>ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |
| 1145999         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXONIDINHEXAL 0,2 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Hexal AG                  | 50               |                                       |             |        |           |            |   |
| 1155091         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | STADAPRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Stada Arzneimittel AG     | 50               |                                       |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1157778         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,2 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK            | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1247598         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,2<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1146079         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXONIDINHEXAL 0,3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | Hexal AG                       | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1157857         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK            | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1247677         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1013791         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | PHYSIOTENS 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Mylan Healthcare SIA           | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1146170         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | MOXONIDINHEXAL 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | Hexal AG                       | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1155259         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | STADAPRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Stada Arzneimittel AG          | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1157947         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK            | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1247756         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,4<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1028933         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, nahalahus, 20ml<br>1TK  | N.V. Organon                   | 75               | L40-L40          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L23-L23, L20-L20 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1028944         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, salv, 20g 1TK   | N.V. Organon                   | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L40-L40                      |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L23-L23, L20-L20             |        |        |           |            |          |
| 1028955         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, kreem, 20g 1TK  | N.V. Organon                   | 75               | L23-L23, L20-L20             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L40-L40                      |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 1833904         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCOM, kreem, 15g 1TK  | UAB "Lex ano"                  | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L23-L23, L40-L40,<br>L20-L20 |        |        |           |            |          |
| 1833915         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCOM, salv, 15g 1TK   | UAB "Lex ano"                  | 75               | L23-L23, L40-L40,<br>L20-L20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 1847101         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, salv, 15g 2TK   | UAB Ideal Trade Links          | 75               | L23-L23, L20-L20,<br>L40-L40 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 1028966         | mometasoon, 50mcg<br>1annust     | R01AD09  | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                       | N.V. Organon                   | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 1484298         | mometasoon, 50mcg<br>1annust     | R01AD09  | NASOMETIN, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                     | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
| 1621224         | mometasoon, 50mcg<br>1annust     | R01AD09  | BRESO, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                         | UAB Norameda                   | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
| 1820135         | mometasoon, 50mcg<br>1annust     | R01AD09  | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                       | UAB "Lex ano"                  | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
| 1823554         | mometasoon, 50mcg<br>1annust     | R01AD09  | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                       | UAB Ideal Trade Links          | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
| 1602087         | mometasoon, 50mcg<br>1pihustuses | R01AD09  | KALMENTE, ninasprei,<br>suspensioon, 140pihustust<br>1TK                | Zentiva k.s.                   | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 1641787         | mometasoon, 50mcg<br>1pihustuses | R01AD09  | MOMETASONE<br>SANOSWISS, ninasprei,<br>suspensioon, 140pihustust<br>1TK | UAB SanoSwiss                  | 75               | J30-J30                      |        |        |           | 17,00      |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1274116         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Teva Pharma B.V.          | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1289987         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONKASTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1496415         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1273722         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>närimistablett, 28TK                        | Teva Pharma B.V.          | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1289718         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett,<br>28TK                                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1447084         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ACCORD,<br>närimistablett, 28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1273845         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>närimistablett, 28TK   | Teva Pharma B.V.          | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1289831         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett,<br>28TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
| 1447242         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ACCORD,<br>närimistablett, 28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | J45-J45  |        |        | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>haiguse puhul lisaks<br>püsiravile optimaalses<br>annuses inhaleeritava<br>kortikosteroidiga |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  |        |        |           | 11,00      |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1035740         | morfiin, 100mg                   | N02AA01  | VENDAL RETARD 100 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH                   | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |
| 1035717         | morfiin, 10mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH                   | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1382284         | morfiin, 10mg                    | N02AA01  | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1339376         | morfiin, 120mg                   | N02AA01  | MXL 120 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |             |   |        |           |            |   |
| 1382307         | morfiin, 20mg                    | N02AA01  | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |             |   |        |           |            |   |
| 1043222         | morfiin, 20mg 1ml                | N02AA01  | MORFIN DAK 20 MG/ML,<br>süstelahus, 1ml 10TK                           | Orifarm Healthcare<br>A/S          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1743421         | morfiin, 20mg 1ml                | N02AA01  | MARACEX, süste-<br>/infusioonilahus, 1ml 10TK   | AS Kalceks                         | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1035728         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 30 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                              | G.L. Pharma GmbH                   | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1080289         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | MST CONTINUS 30 MG,<br>suukaudse suspensiooni<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 30TK | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|------------------------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1339422         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | MXL 30 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK         | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1                  | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |                              |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | C00-D48                      |   |        |           |            |  |
| 1035739         | morfiin, 60mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 60 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH                   | 100              | R52.1-R52.1                  | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | C00-D48                      |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |                              |   |        |           |            |  |
| 1023556         | mükofenoolhape,<br>250mg         | L04AA06  | CELLCEPT, kõvakapsel,<br>100TK  | Roche Registration<br>GmbH         | 50               |                              |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M30-M36, L94-L94,<br>L10-L10 |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | Z94-Z94, T86-T86             |   |        |           |            |  |
| 1164697         | mükofenoolhape,<br>360mg         | L04AA06  | MYFORTIC, gastroresistentne<br>tablett, 120TK                                 | SIA Novartis Baltics               | 50               |                              |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | Z94-Z94, T86-T86             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M30-M36, L94-L94,<br>L10-L10 |   |        |           |            |  |
| 1088344         | mükofenoolhape,<br>500mg         | L04AA06  | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                        | Roche Registration<br>GmbH         | 75               | M30-M36, L94-L94,<br>L10-L10 |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | Z94-Z94, T86-T86             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |                              |   |        |           |            |  |
| 1276736         | mükofenoolhape,<br>500mg         | L04AA06  | MYCOPHENOLATE<br>MOFETIL ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Accord Healthcare<br>B.V.          | 100              | Z94-Z94, T86-T86             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M30-M36, L94-L94,<br>L10-L10 |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |                              |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1343270         | mükofenoolhape,<br>500mg                    | L04AA06  | MYFENAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva B.V.                                  | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 75               | M30-M36, L94-L94,<br>L10-L10  |        |        |           |            |   |
| 1454879         | naatriumbemipariin,<br>25000RÜ anti Xa 1ml  | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 2TK               | ROVI Pharma<br>Industrial Services<br>S.A. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |   |          |   |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
| 1455230         | naatriumbemipariin,<br>25000RÜ anti Xa 1ml  | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 2TK               | ROVI Pharma<br>Industrial Services<br>S.A. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
| 1193127         | naatriumbemipariin,<br>2500RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus süstlis,<br>10TK                    | ROVI Pharma<br>Industrial Services<br>S.A. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks   |
| 1193172         | naatriumbemipariin,<br>3500RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus süstlis,<br>10TK                    | ROVI Pharma<br>Industrial Services<br>S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |   |          |   |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks   |
| 1065596         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml        | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus süstlis,<br>1ml 2TK               | Sanofi-Aventis Groupe                      | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused        |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|--|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1065529         | naatriumenoksapariin,<br>2000RÜ 0.2ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 10TK | Sanofi-Aventis Groupe                      | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                       |          |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks |
|                 |                                       |          |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |                 |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |   |        |        |           |            |                 |
| 1745939         | naatriumenoksapariin,<br>2000RÜ 0.2ml | B01AB05  | LOSMINA, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 10TK | Laboratorios<br>Farmaceuticos Rovi<br>S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |                 |
|                 |                                       |          |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks |
|                 |                                       |          |  |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |   |        |        |           |            |                 |
| 1065541         | naatriumenoksapariin,<br>4000RÜ 0.4ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 10TK | Sanofi-Aventis Groupe                      | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |                 |
|                 |                                       |          |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |   |        |        |           |            |                 |
|                 |                                       |          |  |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks |
| 1781489         | naatriumenoksapariin,<br>4000RÜ 0.4ml | B01AB05  | LOSMINA, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 10TK | Laboratorios<br>Farmaceuticos Rovi<br>S.A. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |            | kuni 10 päevaks |
|                 |                                       |          |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |            |                 |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |   |        |        |           |            |                 |
|                 |                                       |          |  |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1065552         | naatriumenoksapariin,<br>6000RÜ 0.6ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus süstlis,<br>0.6ml 2TK | Sanofi-Aventis Groupe | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6 |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel   |
|                 |                                       |          |   |                       | 50               |                                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                       | 100              | O99.8-O99.8                      |        |        |           |            |   |
| 1065574         | naatriumenoksapariin,<br>8000RÜ 0.8ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus süstlis,<br>0.8ml 2TK | Sanofi-Aventis Groupe | 100              | O99.8-O99.8                      |        |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                       | 50               |                                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                       | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6 |        |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel   |
| 1201521         | naatriumfenüülbutüraat<br>, 500mg     | A16AX03  | AMMONAPS, tablett, 250TK                  | Immedica Pharma AB    | 100              | E72.2-E72.2                      |        |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2<br>pediaatri ühise) otsuse<br>alusel järgmistel<br>tingimustel: haigus<br>kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata<br>muule suukaudsele<br>ravile; patsiendi<br>prognoos<br>paranemisele on hea<br>(püsivat ajukahjustust<br>või organpuudulikkust<br>ei esine); ravi<br>jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud<br>ravi on andnud hea<br>tulemuse<br>(hüperammoneemilisi<br>kriise ei ole esinenud<br>või on nende sagedus<br>oluliselt vähenenud) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1201543         | naatriumfenüülbütüraat<br>, 940mg 1g   | A16AX03  | AMMONAPS, graanulid, 266g<br>1TK             | Immedica Pharma AB           | 100              | E72.2-E72.2                           |        |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2<br>pediaatri ühise) otsuse<br>alusel järgmistel<br>tingimustel: haigus<br>kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata<br>muule suukaudsele<br>ravile; patsiendi<br>prognoos<br>paranemisele on hea<br>(püsivat ajukahjustust<br>või organpuudulikkust<br>ei esine); ravi<br>jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud<br>ravi on andnud hea<br>tulemuse<br>(hüperammoneemilisi<br>kriise ei ole esinenud<br>või on nende sagedus<br>oluliselt vähenenud) |
| 1065822         | naatriumlevotüroksiin,<br>100mcg   | H03AA01  | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG             | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                              | 100              | E89.0-E89.0, E03-<br>E03, E89.3-E89.3 |        |        |           |            |   |
| 1065866         | naatriumlevotüroksiin,<br>50mcg  | H03AA01  | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG             | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                              | 100              | E89.0-E89.0, E03-<br>E03, E89.3-E89.3 |        |        |           |            |   |
| 1448524         | naatriumpikosulfaat+m<br>agneesiumoksiid+sidru<br>nhape,<br>10mg+3,5g+12g  | A06AB80  | PICOPREP, suukaudse<br>lahuse pulber, 2TK    | Ferring GmbH                 | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1035346         | naatriumsulfaat,<br>veevaba+kaaliumklorii<br>d+naatriumkloriid+mak<br>rogool+naatriumvesinik<br>karbonaat,<br>5,7g+0,75g+1,46g+64<br>g+1,68g | A06AD81  | FORTTRANS, suukaudse<br>lahuse pulber, 4TK   | Ipsen Consumer<br>Healthcare | 50               |                                       |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügihoa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1023949         | nabumetoon, 1g                          | M01AX01  | RELIFEX, disperseeruv<br>tablett, 20TK                                       | Meda AB   | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1205479         | nabumetoon, 1g                          | M01AX01  | RELIFEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                        | Meda AB   | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1147902         | naftidrofurüül, 100mg                   | C04AX21  | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK  | Zentiva k.s.  | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1147913         | naftidrofurüül, 100mg                   | C04AX21  | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Zentiva k.s.  | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1671263         | naloksegool, 25mg                       | A06AH03  | MOVENTIG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Kyowa Kirin Holdings<br>B.V.                            | 75               | K59.0-K59.0                            |        |        |           |            | kroonilise opioid-<br>indutseeritud<br>kõhukinnisuse raviks<br>patsiendile, kes<br>kasutab igapäevaselt<br>opioidi ning kes ei ole<br>vähemalt 2 kuu<br>möödumisel opioidravi<br>alustamisest<br>saavutanud lahtistite<br>abil piisavat raviefekti |
| 1644713         | naprokseen, 550mg                       | M01AE02  | NALGESIN FORTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 100              | C00-D48                                |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46          |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | M15-M19                                |        |        | 63,00     |            |  |
| 1437791         | naprokseen+esomepra<br>sool, 500mg+20mg | M01AE52  | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | AstraZeneca AB  | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1072437         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBILET, tablett, 28TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-<br>I15, I50-I50 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1237429         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBIVOLOL STADA, tablett,<br>100TK   | Stada Arzneimittel AG                                   | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-<br>I15, I50-I50 |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1259355         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBICARD 5MG, tablett, 60TK                                  | Sandoz Pharmaceuticals d.d.                       | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
| 1259377         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBICARD 5MG, tablett, 90TK                                  | Sandoz Pharmaceuticals d.d.                       | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
| 1269862         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK                             | Actavis Group PTC ehf                             | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
| 1269907         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK                             | Actavis Group PTC ehf                             | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
| 1284386         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK                               | Orion Corporation                                 | 75               | I47-I49                            | Pediaater, Kardioloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
| 1344259         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIPHAR, tablett, 28TK                                      | Teva Pharma B.V.                                  | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
| 1445149         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBILET, tablett, 90TK                                       | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
| 1780084         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NOLIBETA, tablett, 90TK                                      | KRKA, d.d., Novo mesto                            | 75               | I10-I13, I47-I49, I15-I15, I50-I50 |                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |
| 1343001         | nepafenak, 1mg 1ml               | S01BC10  | NEVANAC, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK                   | Novartis Europharm Limited                        | 50               |                                    |                       |        |           |            | katarakti operatsiooni järgseks kuni 60 päevaseks raviks kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel |
| 1072572         | nifedipiin, 10mg                 | C08CA05  | CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.                                  | 50               |                                    |                       |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005703         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORDIPIN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
| 1034301         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK  | Teva Pharma B.V.          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
| 1072550         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                           |        |           |            |          |
| 1023422         | nifedipiin, 40mg                 | C08CA05  | CORDIPIN XL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1342190         | nilotiniib, 200mg                | L01EA03  | TASIGNA, kõvakapsel, 112TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | <p>konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a.</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus        | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------|---|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1670688         | nintedaniib, 100mg               | L01EX09  | VARGATEF, pehmekapsel, 120TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamise nintedaniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks lokaalselt levinud, metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud adenokartsinoomi histoloogilise leiuga mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks pärast esimese valiku keemiaravi, kui patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi), kombinatsioonis dotsetakseeliga (4 kuni 6 ravikuuri) ning soodsa raviefekti püsimisel monoterapiana kuni haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1675571         | nintedaniib, 100mg               | L01EX09  | OFEV, pehmekapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 100              | J84.1-J84.1  | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=50% eeldatavast.<br>Soodustus ei hõlma<br>nintedaniibi ja<br>pirfenidooni<br>kombinatsioonravi.   |
|                 |                                  |          |                         |  | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-M34.8,<br>J84.8-J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |           |            | konsiiliumi (kahe<br>pulmonoloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>progresseeruva<br>fenotüübiga teiste<br>krooniliste<br>fibroseerivate<br>interstitsiaalsete<br>kopsuhaiguste ja<br>süsteemse skleroosiga<br>seotud progresseeruva<br>kuluga fibroseeriva<br>interstitsiaalse<br>kopsuhaiguse raviks<br>patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=45% |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|---|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1670699         | nintedaniib, 150mg               | L01EX09  | VARGATEF, pehmekapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamise nintedaniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks lokaalselt levinud, metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud adenokartsinoomi histoloogilise leiuga mitteväikerakk-kopsuvähiga täiskasvanud patsientide raviks pärast esimese valiku keemiaravi, kui patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi), kombinatsioonis dotsetakseeliga (4 kuni 6 ravikuuri) ning soodsa raviefekti püsimisel monoteraapiana kuni haiguse progresseerumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1675593         | nintedaniib, 150mg               | L01EX09  | OFEV, pehmekapsel, 60TK                  | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 100              | J84.1-J84.1  | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=50% eeldatavast.<br>Soodustus ei hõlma<br>nintedaniibi ja<br>pirfenidooni<br>kombinatsioonravi.  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-M34.8,<br>J84.8-J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |           |            | konsiliumi (kahe<br>pulmonoloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>progresseeruva<br>fenotüübiga teiste<br>krooniliste<br>fibroseerivate<br>interstitsiaalsete<br>kopsuhaiguste ja<br>süsteemse skleroosiga<br>seotud progresseeruva<br>kuluga fibroseeriva<br>interstitsiaalse<br>kopsuhaiguse raviks<br>patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=45% |
| 1261842         | nitrendipiin, 10mg               | C08CA08  | NITRESAN 10 MG, tablett,<br>50TK         | Pro.med.cs Praha a.s.                      | 75               | I10-I13, I15-I15   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |             |        |           |            |  |
| 1014545         | nitrendipiin, 20mg               | C08CA08  | LUSOPRESS, tablett, 28TK                 | Istituto Luso Farmaco<br>d'Italia S.p.A.   | 50               |  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15   |             |        |           |            |  |
| 1261886         | nitrendipiin, 20mg               | C08CA08  | NITRESAN 20 MG, tablett,<br>50TK         | Pro.med.cs Praha a.s.                      | 75               | I10-I13, I15-I15   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |             |        |           |            |  |
| 1003857         | nitrofurantoiin, 50mg            | J01XE01  | NITROFURANTOIN<br>ORIFARM, tablett, 20TK | Orifarm Healthcare<br>A/S                  | 50               |  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------|------------------|--|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1175464         | noretisteroon+östradio<br>ol, 0,5mg+1mg                  | G03FA01  | ACTIVEELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Novo Nordisk A/S          | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1731013         | noretisteroon+östradio<br>ol, 0,5mg+1mg                  | G03FA01  | ACTIVEELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | First Pharma OÜ           | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1030453         | noretisteroon+östradio<br>ol,<br>0+1mg/1mg+2mg/0+2<br>mg | G03FB05  | TRISEQUENS, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK<br>/ 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S          | 50               |  |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                           | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97  | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
| 1116560         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+1mg/0+1mg              | G03FB05  | NOVOFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK / 16TK          | Novo Nordisk A/S          | 50               |  |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                           | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97  | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
| 1030464         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+2mg                    | G03FA01  | KLIOGEST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Novo Nordisk A/S          | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1005455         | norfloksatsiin, 400mg                                    | J01MA06  | NOLICIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1005927         | nortriptüliin, 25mg                                      | N06AA10  | NORITREN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK               | H. Lundbeck A/S           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater                  | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                           | 50               |  |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                           | 75               | G63-G63, G43-G43,<br>G62.0-G62.0   |                              |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1845514         | ofatumumab, 20mg                 | L04AA52  | KESIMPTA,<br>süstesuspensioon pen-süstlis,<br>1TK                          | Novartis Ireland<br>Limited  | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks<br>patsientidele, keda on<br>varem ravitud<br>vähemalt kahe<br>esmavaliku ravimiga<br>(beetainterferoon,<br>glatirameeratsetaat,<br>teriflunomiid või<br>dimetüülfumaraat) ja<br>kellel vaatamata<br>eelnevale ravile on<br>viimase aasta jooksul<br>esinenud vähemalt<br>kaks olulist ägenemist |
| 1012374         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | MEDOFLOXINE 200 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK           | Medochemie Limited           | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1089402         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | OFLOXIN 200, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                  | Zentiva k.s.                 | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1009673         | okskarbasepiin, 300mg            | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                    | SIA Novartis Baltics         | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1036044         | okskarbasepiin, 300mg            | N03AF02  | APYDAN 300 MG, tablett,<br>50TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1326855         | okskarbasepiin, 300mg            | N03AF02  | OXCARBAZEPINE TEVA 300<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.             | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1009684         | okskarbasepiin, 600mg            | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                    | SIA Novartis Baltics         | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1036033         | okskarbasepiin, 600mg            | N03AF02  | APYDAN 600 MG, tablett,<br>50TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1326989         | okskarbasepiin, 600mg            | N03AF02  | OXCARBAZEPINE TEVA 600<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.                   | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | G40-G40     | Neuroloog                                   | esmane |           |            |  |
| 1028483         | oksübutüniin, 5mg                | G04BD04  | DRIPTANE, tablett, 60TK  | Mylan Healthcare SIA               | 75               | N31-N31     | Pediaater,<br>Neuroloog, Uroloog            | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |
| 1402568         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1526576         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | OXYCODONE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Vitabalans Oy   | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1402580         | oksükodoon, 20mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1402603         | oksükodoon, 40mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1526554         | oksükodoon, 5mg                  | N02AA05  | OXYCODONE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Vitabalans Oy   | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1402625         | oksükodoon, 80mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 80 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Mundipharma<br>Gesellschaft m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1              | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | C00-D48                  |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |   |        |           |            |  |
| 1041309         | oktreotiid, 10mg                 | H01CB02  | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti, 1TK          | SIA Novartis Baltics               | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Endokrinoloog,<br>Onkoloog                  |        |           |            | neuroendokriinkasvaja<br>või akromegaalia<br>raviks  |
| 1041310         | oktreotiid, 20mg                 | H01CB02  | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti, 1TK          | SIA Novartis Baltics               | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Endokrinoloog,<br>Onkoloog                  |        |           |            | neuroendokriinkasvaja<br>või akromegaalia<br>raviks  |
| 1041321         | oktreotiid, 30mg                 | H01CB02  | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti, 1TK          | SIA Novartis Baltics               | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0 | Endokrinoloog,<br>Onkoloog                  |        |           |            | neuroendokriinkasvaja<br>või akromegaalia<br>raviks  |
| 1267714         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Actavis Group PTC ehf              | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |   |        |           |            |  |
| 1289516         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS,<br>suus dispergeeruv tablett,<br>28TK                | Actavis Group PTC ehf              | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |                          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1326259         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZALASTA, tablett, 28TK  | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1326507         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                        | KRKA, d.d., Novo mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1342820         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                | Teva B.V.              | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1354294         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1768642         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                       | Rivopharm Limited      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1289572         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK             | Actavis Group PTC ehf  | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1326552         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                        | KRKA, d.d., Novo mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1354351         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1768664         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                       | Rivopharm Limited      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1267455         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Actavis Group PTC ehf  | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1289459         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK             | Actavis Group PTC ehf  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1326406         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                        | KRKA, d.d., Novo mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1342763         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                | Teva B.V.              | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1354104         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPINE ACCORD 5<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1768620         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | FARPENTA, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                            | Rivopharm Limited         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1771196         | olapariib, 100mg                 | L01XK01  | LYNPARZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | AstraZeneca AB  | 100              | C48-C48, C57.0-<br>C57.0, C56-C56 | Onkoloog |        |           |            | monoteraapiaks<br>levinud (FIGO III ja IV<br>staadium) BRCA<br>mutatsiooniga<br>(idurakuline või<br>somaatiline) madalalt<br>diferentseerunud<br>epiteliaalse munasarja-<br>, munajuha või<br>primaarse<br>peritoneaalvähiga<br>täiskasvanud<br>patsientide<br>säilitusraviks, kellel on<br>saavutatud ravivastus<br>(täielik või osaline<br>vastus) pärast esimese<br>rea platinapõhise<br>keemiaravi lõpetamist<br>või retsidiveerunud<br>haiguse korral<br>patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud kahe<br>või enama<br>platinapõhise<br>keemiaraviga ning kes<br>on saanud osalise või<br>täieliku ravivastuse<br>viimasele<br>platinapõhisele<br>keemiaravile.<br>Retsidiveerunud<br>haiguse korral on<br>soodustusega<br>väljakirjutamise õigus<br>kuni 24 kuuks, v.a<br>juhul, kui ravi on<br>alustatud enne<br>01.04.2022. Soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi olapariibiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne 1. juulit<br>2020. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1771219         | olapariib, 150mg                 | L01XK01  | LYNPARZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | AstraZeneca AB  | 100              | C48-C48, C56-C56,<br>C57.0-C57.0 | Onkoloog |        |           |            | monoteraapiaks<br>levinud (FIGO III ja IV<br>staadium) BRCA<br>mutatsiooniga<br>(idurakuline või<br>somaatiline) madalalt<br>diferentseerunud<br>epiteliaalse munasarja-<br>, munajuha või<br>primaarse<br>peritoneaalvähiga<br>täiskasvanud<br>patsientide<br>säilitusraviks, kellel on<br>saavutatud ravivastus<br>(täielik või osaline<br>vastus) pärast esimese<br>rea platinapõhise<br>keemiaravi lõpetamist<br>või retsidiveerunud<br>haiguse korral<br>patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud kahe<br>või enama<br>platinapõhise<br>keemiaraviga ning kes<br>on saanud osalise või<br>täieliku ravivastuse<br>viimasele<br>platinapõhisele<br>keemiaravile.<br>Retsidiveerunud<br>haiguse korral on<br>soodustusega<br>väljakirjutamise õigus<br>kuni 24 kuuks, v.a<br>juhul, kui ravi on<br>alustatud enne<br>01.04.2022. Soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi olapariibiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |   |          |  |   |                  |                  |        |        |           |            | on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne 1. juulit<br>2020. a. |
| 1407664         | olmesartaanmedokso<br>miil, 10mg                    | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1676459         | olmesartaanmedokso<br>miil, 10mg                    | C09CA08  | OLMESARTAN MEDOXOMIL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1407833         | olmesartaanmedokso<br>miil, 20mg                    | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1676538         | olmesartaanmedokso<br>miil, 20mg                    | C09CA08  | OLMESARTAN MEDOXOMIL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1407934         | olmesartaanmedokso<br>miil, 40mg                    | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
| 1676617         | olmesartaanmedokso<br>miil, 40mg                    | C09CA08  | OLMESARTAN MEDOXOMIL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1727434         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>20mg+5mg  | C09DB02  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1308563         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB02  | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                      | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
| 1720628         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB02  | OLSSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1727232         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+10mg                              | C09DB02  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Zentiva k.s.  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1727579         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+10mg                              | C09DB02  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK      | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1308451         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                               | C09DB02  | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1720538         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                               | C09DB02  | OLSSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1727175         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                               | C09DB02  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Zentiva k.s.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1727502         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                               | C09DB02  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK      | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1452866         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5mg | C09DX03  | SANORAL HCT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                       | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1786394         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5mg | C09DX03  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE/<br>HCT ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1790939         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5mg | C09DX03  | OLSITRI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1797509         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5mg | C09DX03  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE/<br>HYDROCHLOROTHIAZIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1801527         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5mg | C09DX03  | GADUAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Zentiva k.s.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1452709         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5mg  | C09DX03  | SANORAL HCT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1786350         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5mg  | C09DX03  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE/<br>HCT ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1790771         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5mg  | C09DX03  | OLSITRI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1797464         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5mg  | C09DX03  | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIPINE/<br>HYDROCHLOROTHIAZIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1801482         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5mg  | C09DX03  | GADUAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Zentiva k.s.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1530672         | olmesartaanmedokso<br>miil+hüdroklorotiasiid,<br>20mg+12,5mg                     | C09DA08  | CO-OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1530762         | olmesartaanmedokso<br>miil+hüdroklorotiasiid,<br>20mg+25mg                       | C09DA08  | CO-OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1648481         | olodaterool+tiotroopium, 2,5mcg+2,5mcg<br>1pihustus | R03AL06  | SPIOLTO RESPIMAT,<br>inhalatsioonilahus, 60pihustus<br>1TK          | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1140220         | olopatadiin, 1mg 1ml                                | S01GX09  | OPATANOL, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                            | Novartis Europharm<br>Limited              | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1774728         | olopatadiin, 1mg 1ml                                | S01GX09  | OLOPATADINE UNIMED<br>PHARMA, silmatilgad, lahus,<br>10ml 1TK       | Unimed Pharma spol.<br>s r.o.              | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1062166         | omeprasool, 20mg                                    | A02BC01  | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK | Ratiopharm GmbH                            | 75               | K25-K27  |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |   |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1062201         | omeprasool, 20mg                                    | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK    | Teva B.V.                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | K25-K27  |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1269222         | omeprasool, 20mg                                    | A02BC01  | OMEP 20MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.             | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |  | 75               | K25-K27  |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1269244         | omeprasool, 20mg                                    | A02BC01  | OMEP 20MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>56TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.             | 75               | K25-K27  |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |   |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1352393         | omeprasool, 20mg                                    | A02BC01  | OMEPRAZOLE STADA 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK    | Stada Arzneimittel AG                      | 75               | K25-K27  |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |   |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1423077         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK                  | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1516250         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | Teva B.V.                   | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1112825         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.                   | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269301         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269323         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1269345         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK              | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1352551         | omeprasool, 40mg                             | A02BC01  | OMEPRAZOLE STADA 40<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel AG      | 50               |          |          |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |          |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega   |
| 1137372         | oomega-3-rasvhappe<br>etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80  | OMACOR, pehmekapsel,<br>28TK                                     | BASF AS                    | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1828380         | oomega-3-rasvhappe<br>etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80  | OMACOR, pehmekapsel,<br>28TK                                     | UAB "Lex ano"              | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1110643         | oseltamiviir, 75mg                           | J05AH02  | TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK  | Roche Registration<br>GmbH | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1649088         | oseltamiviir, 75mg                           | J05AH02  | EBILFUMIN, kõvakapsel,<br>10TK                                   | Actavis Group PTC ehf      | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1841329         | oseltamiviir, 75mg                           | J05AH02  | SEGOSANA, kõvakapsel,<br>10TK                                    | Zentiva k.s.               | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1710379         | osimertiniib, 40mg                           | L01EB04  | TAGRISSO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | AstraZeneca AB             | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | monoteraapiaks<br>lokaalselt levinud või<br>metastaatilise<br>epidermaalse<br>kasvufaktori retseptori<br>(EGFR) T790M-<br>mutatsioonpositiivse<br>mitteväikerakk<br>kopsuvähiga<br>patsientidele, kelle<br>haigus on<br>progresseerunud<br>pärast ravi EGFR-<br>türosiini kinaasi<br>inhibiitoritega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1710380         | osimertiniib, 80mg               | L01EB04  | TAGRISSE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | AstraZeneca AB  | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | monoteraapiaks<br>lokaalselt levinud või<br>metastaatilise<br>epidermaalse<br>kasvufaktori retseptori<br>(EGFR) T790M-<br>mutatsioonpositiivse<br>mitteväikerakk<br>kopsuvähiga<br>patsientidele, kelle<br>haigus on<br>progresseerunud<br>pärast ravi EGFR-<br>türosiini kinaasi<br>inhibiitoritega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1731978         | palbotsikliib, 100mg             | L01EF01  | IBRANCE, kõvakapsel, 21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnanähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1811540         | palbotsikliib, 100mg             | L01EF01  | IBRANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnavähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1731989         | palbotsikliib, 125mg             | L01EF01  | IBRANCE, kõvakapsel, 21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnanähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1811562         | palbotsikliib, 125mg             | L01EF01  | IBRANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnavähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1731967         | palbotsikliib, 75mg              | L01EF01  | IBRANCE, kõvakapsel, 21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnanähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1811528         | palbotsikliib, 75mg              | L01EF01  | IBRANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnavähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1696068         | panobinostaat, 10mg              | L01XH03  | FARYDAK, kõvakapsel, 6TK | Secura Bio Limited | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1696091         | panobinostaat, 15mg              | L01XH03  | FARYDAK, kõvakapsel, 6TK | Secura Bio Limited | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a.</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1696125         | panobinostaat, 20mg              | L01XH03  | FARYDAK, kõvakapsel, 6TK | Secura Bio Limited | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1043020         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | CONTROLOC 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK      | Takeda GmbH               | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1249770         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249792         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 56TK                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1277232         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf     | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1418813         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                  | Zentiva k.s.              | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1441178         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK   | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1441189         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1537006         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK | Teva B.V.                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1043031         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | CONTROLOC 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK    | Takeda GmbH               | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249646         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 14TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249668         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1249680         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 56TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1277344         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK              | Actavis Group PTC ehf | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1280449         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOL -<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | Ratiopharm GmbH       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1418835         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                               | Zentiva k.s.          | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1441190         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                | Teva B.V.             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441202         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                | Teva B.V.             | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1537028         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                | Teva B.V.             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1810268         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                              | First Pharma OÜ                      | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1060232         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | SEROXAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1096837         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | REXETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Gedeon Richter Plc.                  | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1110799         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Hexal AG                             | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1185072         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETIN ACTAVIS 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Group PTC ehf                | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1244900         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | ARKETIS 20 MG, tablett,<br>30TK  | Medochemie Limited                   | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1855155         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | SEROXAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | UAB Ideal Trade Links                | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1110834         | paroksetiin, 40mg                | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 40 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Hexal AG                             | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1245103         | paroksetiin, 40mg                | N06AB05  | ARKETIS 40 MG, tablett,<br>30TK  | Medochemie Limited                   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                              |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1482027         | pasopaniib, 200mg                | L01EX03  | VOTRIENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>pasopaniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1482050         | pasopaniib, 400mg                | L01EX03  | VOTRIENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>pasopaniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
| 1009404         | pentoksüfülliin, 400mg           | C04AD03  | TRENTAL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK       | Takeda GmbH                   | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1147980         | pentoksüfülliin, 400mg           | C04AD03  | PENTILIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1028854         | pentoksüfülliin, 600mg           | C04AD03  | VASONIT RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH              | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1473409         | pentoksüfülliin, 600mg           | C04AD03  | VASONIT RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | G.L. Pharma GmbH              | 50               |          |          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|--|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1168422         | perindopriil, 10mg                    | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1302860         | perindopriil, 4mg                     | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1377233         | perindopriil, 4mg                     | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1845020         | perindopriil, 4mg                     | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 90TK   | First Pharma OÜ                        | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1168310         | perindopriil, 5mg                     | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE<br>5MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Les Laboratoires<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1302871         | perindopriil, 8mg                     | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1377312         | perindopriil, 8mg                     | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto              | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1289101         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK  | Les Laboratoires<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1602852         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK                             | Teva Pharma B.V.                       | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1288953         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg  | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK  | Les Laboratoires<br>Servier            | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1603000         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg  | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK                             | Teva Pharma B.V.                       | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1499250         | perindopriil+amlodipiin,<br>4mg+10mg | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1499003         | perindopriil+amlodipiin,<br>4mg+5mg  | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1642980         | perindopriil+amlodipiin,<br>4mg+5mg  | C09BB04  | PRIAMLO 4MG/5MG, tablett,<br>30TK             | Zentiva k.s.                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1288818         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK                        | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1602953         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1288672         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg  | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK                        | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1602908         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg  | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1499126         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+10mg | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1643048         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+10mg | C09BB04  | PRIAMLO 8MG/10MG,<br>tablett, 30TK            | Zentiva k.s.                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1499069         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+5mg  | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1643026         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+5mg  | C09BB04  | PRIAMLO 8MG/5MG, tablett,<br>30TK             | Zentiva k.s.                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                      |          |   |                             | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1588079         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1588091         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1588024         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1588046         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1602481         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1602504         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 60TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1602571         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1602593         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 60TK                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1810897         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | PRINDAL, tablett, 30TK                                  | Zentiva k.s.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1587977         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1587999         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1587922         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1587944         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                      | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1602683         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1602706         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 60TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
| 1811045         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | PRINDAL, tablett, 30TK   | Zentiva k.s.                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
| 1602795         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1602818         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 60TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
| 1810987         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | PRINDAL, tablett, 30TK   | Zentiva k.s.                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
| 1339488         | perindopriil+indapamiid<br>, 10mg+2,5mg                   | C09BA04  | NOLITERAX 10 MG/2,5 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1686720         | perindopriil+indapamiid<br>, 10mg+2,5mg                   | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1686742         | perindopriil+indapamiid<br>, 10mg+2,5mg                   | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1229587         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg                | C09BA04  | NOLIPREL ARGININE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK              | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1544374         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1600647         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1407068         | perindopriil+indapamiid<br>, 2mg+0,625mg   | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1295894         | perindopriil+indapamiid<br>, 4mg+1,25mg    | C09BA04  | PRENEWEL, tablett, 60TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1407158         | perindopriil+indapamiid<br>, 4mg+1,25mg    | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1229879         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg    | C09BA04  | NOLIPREL FORTE<br>ARGININE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK     | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1544486         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg    | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1600670         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg    | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1407248         | perindopriil+indapamiid<br>, 8mg+2,5mg     | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1458367         | perindopriil+indapamiid<br>, 8mg+2,5mg     | C09BA04  | PRENEWEL 8 MG/ 2,5 MG,<br>tablett, 60TK                                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1837155         | perindopriil+indapamiid<br>, 8mg+2,5mg         | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK   | UAB Ideal Trade Links    | 50               |                               |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
| 1872200         | PF-<br>07321332+ritonaviir,<br>150mg+0/0+100mg | J05AE80  | PAXLOVID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>150mg 20TK / 100mg 10TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | U07.1-U07.1, U07.2-<br>U07.2  |        |        | 60,00     |            | patsientidele, kellel<br>esinevad COVID-19<br>sümptomid ja<br>tervishoiuteenuse<br>osutaja juures tehtud<br>antigeeni kiirtest või<br>PCR test on kinnitanud<br>COVID-19-sse<br>haigestumist ning<br>kellel esineb vähemalt<br>üks järgnevatest<br>riskiteguritest: vanus<br>üle 60 a, rasvumus<br>(KMI üle 35), krooniline<br>neeruhaigus,<br>sirprakuline aneemia,<br>diabeet, KV haigus või<br>hüpertensioon,<br>krooniline<br>kopsuhaigus, aktiivne<br>pahaloomuline<br>kasvaja, sõltuvus<br>meditsiinilistest<br>abivahenditest,<br>immuunsupresseeriv<br>haigus või -ravi |
| 1104680         | pimekroliimus, 10mg<br>1g                      | D11AH02  | ELIDEL, kreem, 15g 1TK  | SIA Meda Pharma          | 50               |                               |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1563454         | pioglitason, 15mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE ACCORD,<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
| 1498495         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | ZIPION 30MG, tablett, 28TK            | Zentiva k.s.                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud. |
|                 |                                  |          |                                       |                             | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1563555         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE ACCORD,<br>tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1563757         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE ACCORD,<br>tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1813766         | piratsetaam, 800mg               | N06BX03  | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | UAB Ideal Trade Links       | 50               | G25.3-G25.3      |        |        |           |            |   |
| 1826377         | piratsetaam, 800mg               | N06BX03  | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | First Pharma OÜ             | 50               | G25.3-G25.3      |        |        |           |            |   |
| 1829347         | piratsetaam, 800mg               | N06BX03  | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | UAB "Lex ano"               | 50               | G25.3-G25.3      |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1518881         | pirfenidoon, 267mg                | L04AX05  | ESBRIET, kõvakapsel, 252TK   | Roche Registration<br>GmbH                                 | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=50% eeldatavast.<br>Soodustus ei hõlma<br>nintedaniibi ja<br>pirfenidooni<br>kombinatsioonravi. |
| 1750856         | pirfenidoon, 267mg                | L04AX05  | ESBRIET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>252TK             | Roche Registration<br>GmbH                                 | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=50% eeldatavast.<br>Soodustus ei hõlma<br>nintedaniibi ja<br>pirfenidooni<br>kombinatsioonravi. |
| 1750801         | pirfenidoon, 801mg                | L04AX05  | ESBRIET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK              | Roche Registration<br>GmbH                                 | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |           |            | patsientidele, kelle<br>kopsude forsseeritud<br>vitaalkapatsiteet (FVC)<br>ravi alustamisel on<br>>=50% eeldatavast.<br>Soodustus ei hõlma<br>nintedaniibi ja<br>pirfenidooni<br>kombinatsioonravi. |
| 1039889         | piroksikaam, 20mg                 | M01AC01  | BREXIN, tablett, 20TK  | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH                          | 50               |             |             |        |           |            |   |
| 1039890         | piroksikaam, 20mg                 | M01AC01  | BREXIN, suukaudse lahuse<br>pulber, 20TK                           | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH                          | 50               |             |             |        |           |            |   |
| 1271775         | polüstüreensulfonaat,<br>949mg 1g | V03AE01  | SORBISTERIT,<br>suukaudse/rektaalsuspensioo<br>ni pulber, 500g 1TK | Fresenius Medical<br>Care Nephrologica<br>Deutschland GmbH | 50               |             |             |        |           |            |   |
|                 |                                   |          |  |  | 100              | N18-N18     |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1622203         | pomalidomiid, 1mg                | L04AX06  | IMNOVID, kõvakapsel, 21TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2018. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1622214         | pomalidomiid, 2mg                | L04AX06  | IMNOVID, kõvakapsel, 21TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2018. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1622225         | pomalidomiid, 3mg                | L04AX06  | IMNOVID, kõvakapsel, 21TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2018. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1622236         | pomalidomiid, 4mg                | L04AX06  | IMNOVID, kõvakapsel, 21TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |           |            | <p>kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud, ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi pomalidomiidiga on</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
|                 |                                  |          |  |                             |                  |  |        |        |           |            | ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2018.  |
| 1646175         | posakonasool, 100mg              | J02AC04  | NOXAFIL, gastroresistentne<br>tablett, 24TK                | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | vereloome tüvirakkude<br>siirdamisega seotud<br>transplantaat-<br>peremehe-vastu<br>haiguse, ägeda<br>müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse<br>leukeemia või<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi<br>intensiivsest<br>keemiaravist tingitud<br>mükoosi profülaktikaks |
| 1800627         | posakonasool, 100mg              | J02AC04  | POSACONAZOLE ACCORD,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | vereloome tüvirakkude<br>siirdamisega seotud<br>transplantaatperemehe<br>-vastu haiguse, ägeda<br>müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse<br>leukeemia või<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi<br>intensiivsest<br>keemiaravist tingitud<br>mükoosi profülaktikaks     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1811124         | posakonasool, 100mg              | J02AC04  | POSACONAZOLE STADA,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK          | Stada Arzneimittel AG                      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |           |        |           |            | vereloome tüvirakkude<br>siirdamisega seotud<br>transplantaat-<br>peremehe-vastu<br>haiguse, ägeda<br>müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse<br>leukeemia või<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi<br>intensiivsest<br>keemiaravist tingitud<br>mükoosi profülaktikaks |
| 1800010         | posakonasool, 40mg<br>1ml        | J02AC04  | POSACONAZOLE AHCL,<br>suukaudne suspensioon,<br>105ml 1TK          | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |           |        |           |            | vereloome tüvirakkude<br>siirdamisega seotud<br>transplantaatperemehe<br>-vastu haiguse, ägeda<br>müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse<br>leukeemia või<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi<br>intensiivsest<br>keemiaravist tingitud<br>mükoosi profülaktikaks     |
| 1323256         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | EZAPREV 0,088 MG, tablett,<br>30TK                                 | UAB Noramedia                              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1339332         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation                          | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1041253         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1339354         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation                          | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1450998         | pramipeksool, 0,26mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1451023         | pramipeksool, 0,52mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1637210         | pramipeksool, 0,52mg             | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1041264         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1323313         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | EZAPREV 0,7 MG, tablett,<br>100TK                                  | UAB Norameda                               | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1339400         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation                          | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1373824         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1451067         | pramipeksool, 1,05mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1637265         | pramipeksool, 1,05mg             | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1451135         | pramipeksool, 2,1mg              | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1637344         | pramipeksool, 2,1mg              | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1451168         | pramipeksool, 3,15mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|----------|
| 1118034         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | PRAVAHEXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK     | Hexal AG            | 100              | N18-N18   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |  |        |           |            |          |
| 1118056         | pravastatiin, 40mg               | C10AA03  | PRAVAHEXAL 40 MG,<br>tablett, 30TK     | Hexal AG            | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |  |        |           |            |          |
| 1065776         | prednisoloon, 5mg                | H02AB06  | PREDNISOLON-RICHTER,<br>tablett, 100TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | D59-D59, D69-D69,<br>D60-D64  | Pediaater,<br>Hematoloog                                       | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | L12-L12, L23-L23,<br>L13.0-L13.0, L10-<br>L10, L20-L20  | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25  | Pediaater,<br>Endokrinoloog                                    | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | C00-D48   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46   | Pediaater,<br>Reumatoloog                                      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | K50-K51, K73-K74  | Pediaater,<br>Gastroenteroloog                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | J45-J45   |  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | G70-G70   | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|-----------------------------------|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1031702         | prednisoloon+salitsüül<br>hape, 0,2%+0,4% | D07XA81  | ALPICORT, nahalahus, 100ml<br>1TK | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1655513         | pregabaliin, 150mg                        | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>14TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                         | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |                                   |   | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |                                   |   | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
| 1655546         | pregabaliin, 150mg                        | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                         | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |   |          |                                   |   | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |                                   |   | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1657795         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | BRIEKA, kõvakapsel, 14TK                | Actavis Group PTC ehf | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1657829         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | BRIEKA, kõvakapsel, 56TK                | Actavis Group PTC ehf | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1693122         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s.          | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1693133         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.                | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1695630         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PREGABALIN ACCORD,<br>kõvakapsel, 14TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
| 1695663         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PREGABALIN ACCORD,<br>kõvakapsel, 56TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1739606         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA k.s,<br>kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s.       | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                    | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1739617         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA k.s,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.       | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                    | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
| 1766347         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | SIRANALEN, kõvakapsel,<br>14TK              | Medochemie Limited | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                    | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1766370         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | SIRANALEN, kõvakapsel, 56TK | Medochemie Limited | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                             |                    | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |                    | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1820326         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK  | First Pharma OÜ    | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                             |                    | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |                             |                    | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1848371         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK  | UAB Ideal Trade Links  | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                             |                        | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |                        | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1655760         | pregabaliin, 300mg               | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK  | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                             |                        | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |                        | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1766415         | pregabaliin, 300mg               | N03AX16  | SIRANALEN, kõvakapsel, 14TK | Medochemie Limited     | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |                        | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                             |                        | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1655355         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                            |                        | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                            |                        | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1655388         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                            |                        | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                            |                        | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1657740         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | BRIEKA, kõvakapsel, 56TK   | Actavis Group PTC ehf  | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                  |          |                            |                        | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |                            |                        | 50               |             |           |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1693043         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s.                | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1693065         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.                | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
| 1695438         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PREGABALIN ACCORD,<br>kõvakapsel, 14TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1695461         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PREGABALIN ACCORD,<br>kõvakapsel, 56TK      | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1739550         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA k.s,<br>kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s.                | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1739572         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | PREGABALIN ZENTIVA k.s,<br>kõvakapsel, 56TK                      | Zentiva k.s.                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1766303         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | SIRANALEN, kõvakapsel,<br>56TK                                   | Medochemie Limited           | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti |
| 1077027         | primidoon, 250mg                 | N03AA03  | LISKANTIN, tablett, 100TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |             |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1020126         | propafenoon, 150mg               | C01BC03  | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK          | Mylan Healthcare SIA         | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1044526         | propafenoon, 150mg               | C01BC03  | PROPANORM 150 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK   | Pro.med.cs Praha a.s.        | 50               |             |           |        |           |            |   |
| 1704833         | propafenoon, 150mg               | C01BC03  | PROPAFENONE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V.    | 50               |             |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1020137         | propafenoon, 300mg                        | C01BC03  | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                  | Mylan Healthcare SIA      | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
| 1704888         | propafenoon, 300mg                        | C01BC03  | PROPAFENONE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK         | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
| 1053223         | propranolool, 40mg                        | C07AA05  | PROPRA-RATIOPHARM 40<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Ratiopharm GmbH           | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                           | 75               | G43-G43, I47-I49,<br>I15-I15, I10-I13 |                         |        |           |            |          |
| 1596944         | propranolool, 40mg                        | C07AA05  | PROPRANOLOL ACCORD<br>40MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | G43-G43, I47-I49,<br>I15-I15, I10-I13 |                         |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                           | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
| 1078310         | pseudoefedriin+loratad<br>iin, 240mg+10mg | R01BA89  | CLARINASE, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 7TK        | UAB Bayer                 | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
| 1141311         | pseudoefedriin+tsetirisi<br>in, 120mg+5mg | R01BA93  | CIRRUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 14TK          | UCB Pharma Oy<br>Finland  | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
| 1074451         | püridostigmiinbromiid,<br>60mg            | N07AA02  | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK  | Teva Pharma B.V.          | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                           | 100              | G70-G70                               | Pediaater,<br>Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1664647         | püridostigmiinbromiid,<br>60mg            | N07AA02  | MESTINON, kaetud tablett,<br>150TK                                       | SIA Meda Pharma           | 100              | G70-G70                               | Neuroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                           | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
| 1865189         | püridostigmiinbromiid,<br>60mg            | N07AA02  | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK  | UAB Ideal Trade Links     | 50               |                                       |                         |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                           | 100              | G70-G70                               | Neuroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1750553         | raltegraviir, 600mg              | J05AJ01  | ISENTRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 100              | Z20.6-Z20.6                   | Infektsionist |        |           |            | kombinatsioonis<br>tenofoviirdisoproksiil+e<br>mtritsitabiiniga<br>kokkupuute-järgseks<br>(PEP) profülaktiliseks<br>raviks HIV-infektsiooni<br>nakatumise vältimiseks<br>kuni 30-päevaks v.a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1059218         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | CARDACE, tablett, 28TK                                  | Sanofi-Aventis Groupe       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1153527         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMICOR 10 MG, tablett,<br>30TK                         | Hexal AG                    | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1169939         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG,<br>tablett, 28TK                 | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1190078         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK                            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1190090         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK                            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1217977         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMICOR 10 MG, tablett,<br>60TK                         | Hexal AG                    | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1502345         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | CARDACE, tablett, 56TK                                  | Sanofi-Aventis Groupe       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1583423         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG,<br>tablett, 90TK                 | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005826         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK        | Sanofi-Aventis Groupe  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1074743         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK        | Sanofi-Aventis Groupe  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1153381         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK        | Hexal AG               | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1189953         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | AMPRIIL 2,5 MG, tablett, 30TK        | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1005859         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett, 28TK          | Sanofi-Aventis Groupe  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1074754         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett, 98TK          | Sanofi-Aventis Groupe  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1153459         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK          | Hexal AG               | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1169849         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIPRIIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1190034         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK          | KRKA, d.d., Novo mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1190056         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK          | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1217966         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK          | Hexal AG               | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1502198         | ramipriil, 5mg                                | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>56TK              | Sanofi-Aventis Groupe          | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1583412         | ramipriil, 5mg                                | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG,<br>tablett, 90TK      | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1510467         | ramipriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg            | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510388         | ramipriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg             | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510423         | ramipriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg             | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510344         | ramipriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg              | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1512953         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 10mg+12,5mg  | C09BA05  | CARDACE FORTE, tablett,<br>56TK             | Sanofi-Aventis Groupe          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1513022         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 10mg+25mg    | C09BA05  | CARDACE FORTE, tablett,<br>56TK             | Sanofi-Aventis Groupe          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1021936         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05  | CARDACE COMP, tablett,<br>28TK              | Sanofi-Aventis Groupe          | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
| 1113657         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05  | CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5<br>MG, tablett, 30TK | Hexal AG                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1190269         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05  | AMPRIIL HL 2,5MG/12,5MG,<br>tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1113680         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg | C09BA05  | CO-RAMICOR 5 MG/25 MG,<br>tablett, 30TK                         | Hexal AG  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |            |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 50               |                               |            |        |           |            |   |
| 1141715         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg | C09BA05  | CARDACE PLUS, tablett,<br>28TK                                  | Sanofi-Aventis Groupe                                   | 50               |                               |            |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |            |        |           |            |   |
| 1190179         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg | C09BA05  | AMPRIIL HD 5MG/25MG,<br>tablett, 30TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |            |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 50               |                               |            |        |           |            |   |
| 1361652         | ranolasiin, 375mg                         | C01EB18  | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20                       | Kardioloog | esmane |           |            | III-IV funktsionaalne<br>klass, kellel esinevad<br>stenokardilised<br>kaebused vaatamata<br>adekvaatsele<br>antiisheemilisele ravile<br>(beeta-<br>adrenoblokaator,<br>kaltsiumikanali<br>blokaator ja pika<br>toimega<br>nitropreparaat) või<br>kellel need ravimid on<br>vastunäidustatud ja<br>kelle puhul on<br>kardioloogide<br>konsiilium, kuhu on<br>kaasatud vähemalt üks<br>regionaalhaigla<br>kardiokirurg või<br>invasiivkardioloog,<br>otsustanud et<br>revaskulariseerimine ei<br>ole võimalik |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1361674         | ranolasiin, 500mg                | C01EB18  | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog | esmane |           |            | III-IV funktsionaalne<br>klass, kellel esinevad<br>stenokardilised<br>kaebused vaatamata<br>adekvaatsele<br>antiisheemilisele ravile<br>(beeta-<br>adrenoblokaator,<br>kaltsiumikanali<br>blokaator ja pika<br>toimega<br>nitropreparaat) või<br>kellel need ravimid on<br>vastunäidustatud ja<br>kelle puhul on<br>kardioloogide<br>konsiilium, kuhu on<br>kaasatud vähemalt üks<br>regionaalhaigla<br>kardiokirurg või<br>invasiivkardioloog,<br>otsustanud et<br>revaskulariseerimine ei<br>ole võimalik |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1361685         | ranolasiin, 750mg   | C01EB18  | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog | esmane |           |            | III-IV funktsionaalne<br>klass, kellel esinevad<br>stenokardilised<br>kaebused vaatamata<br>adekvaatsele<br>antiisheemilisele ravile<br>(beeta-<br>adrenoblokaator,<br>kaltsiumikanali<br>blokaator ja pika<br>toimega<br>nitropreparaat) või<br>kellel need ravimid on<br>vastunäidustatud ja<br>kelle puhul on<br>kardioloogide<br>konsiilium, kuhu on<br>kaasatud vähemalt üks<br>regionaalhaigla<br>kardiokirurg või<br>invasiivkardioloog,<br>otsustanud et<br>revaskulariseerimine ei<br>ole võimalik |
| 1203422         | rasagiliin, 1mg   | N04BD02  | AZILECT, tablett, 28TK  | Teva B.V.   | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 100              | G20-G20  | Neuroloog  | esmane |           |            |   |
| 1678215         | rasagiliin, 1mg   | N04BD02  | RALAGO, tablett, 30TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 100              | G20-G20  | Neuroloog  | esmane |           |            |   |
| 1679272         | rasagiliin, 1mg   | N04BD02  | SAGILIA, tablett, 30TK  | Medochemie Limited                                      | 100              | G20-G20  | Neuroloog  | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1679340         | rasagiliin, 1mg   | N04BD02  | RASAGILINE ACCORD,<br>tablett, 28TK                             | Accord Healthcare<br>B.V.                               | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 100              | G20-G20  | Neuroloog  | esmane |           |            |   |
| 1011036         | raud(III)hüdroksiid-<br>polümaltoos kompleks,<br>100mg    | B03AB80  | FERRUM LEK, närimistablett,<br>30TK                             | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                          | 50               | D50-D50  |            |        |           | 3,00       |   |
|                 |   |          |   |   | 75               | D50-D50  |            |        |           |            | rasedatele  |
| 1011025         | raud(III)hüdroksiid-<br>polümaltoos kompleks,<br>10mg 1ml | B03AB80  | FERRUM LEK, siirup, 100ml<br>1TK                                | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                          | 75               | D50-D50  |            |        |           |            | rasedatele  |
|                 |   |          |   |   | 50               | D50-D50  |            |        |           | 3,00       |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1752410         | ribotsikliib, 200mg              | L01EF02  | KISQALI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C50-C50     | Onkoloog  |        |           |            | hormoonretseptor<br>(HR)-positiivse,<br>inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor<br>2 (HER2)-negatiivse,<br>lokaalselt<br>kaugelearenenud või<br>metastaatilise<br>rinnavähi I rea raviks<br>kombinatsioonis<br>aromataasi inhibiitoriga<br>patsiendile kuni<br>haiguse<br>progresseerumiseni<br>ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsiendile, kelle<br>haigus on adjuvantse<br>või neoadjuvantse<br>aromataasi inhibiitori<br>foonil või 12 kuud<br>pärast selle lõpetamist<br>progresseerunud ning<br>kombinatsioonis<br>fulvestrandiga II rea<br>raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni<br>patsientidele, kes ei<br>ole varasemalt ravi<br>CDK-4/6 inhibiitoritega<br>saanud |
| 1035289         | rilusool, 50mg                   | N07XX02  | RILUTEK, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Sanofi Mature IP              | 100              | G12.2-G12.2 | Neuroloog | esmane |           |            | mehhaanilise<br>ventilatsiooni<br>vajaduseta<br>patsientidele  |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |             |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1644375         | riotsiguaat, 0,5mg               | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel patsientidele,<br>kellele kirurgiline ravi<br>ei ole teostatav või<br>kellel haigus kirurgilise<br>ravi järel püsib või<br>taastekib ning kelle<br>seisund vastab NYHA<br>III-IV funktsionaalsele<br>klassile |
| 1644432         | riotsiguaat, 1,5mg               | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel patsientidele,<br>kellele kirurgiline ravi<br>ei ole teostatav või<br>kellel haigus kirurgilise<br>ravi järel püsib või<br>taastekib ning kelle<br>seisund vastab NYHA<br>III-IV funktsionaalsele<br>klassile |
| 1644409         | riotsiguaat, 1mg                 | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel patsientidele,<br>kellele kirurgiline ravi<br>ei ole teostatav või<br>kellel haigus kirurgilise<br>ravi järel püsib või<br>taastekib ning kelle<br>seisund vastab NYHA<br>III-IV funktsionaalsele<br>klassile |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1644498         | riotsiguaat, 2,5mg               | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel patsientidele,<br>kellele kirurgiline ravi<br>ei ole teostatav või<br>kellel haigus kirurgilise<br>ravi järel püsib või<br>taastekib ning kelle<br>seisund vastab NYHA<br>III-IV funktsionaalsele<br>klassile |
| 1644465         | riotsiguaat, 2mg                 | C02KX05  | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel patsientidele,<br>kellele kirurgiline ravi<br>ei ole teostatav või<br>kellel haigus kirurgilise<br>ravi järel püsib või<br>taastekib ning kelle<br>seisund vastab NYHA<br>III-IV funktsionaalsele<br>klassile |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1848438         | risankizumab, 150mg              | L04AC18  | SKYRIZI, süstelahus pen-<br>süstlis, 1TK | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel patsientidele,<br>kes vastavad Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus L40 diagnoosi<br>korral kehtivatele TNF-<br>alfa inhibiitori<br>hüvitamistingimustele<br>ning kes on saanud<br>haigekassa rahastusel<br>ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust<br>modifitseeriva<br>toimeainega, mis on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või<br>kellele on TNF-alfa<br>inhibiitori kasutamine<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1845446         | risdiplaam, 0,75mg<br>1ml        | M09AX10  | EVRYSDI, suukaudse lahuse<br>pulber, 80ml 1TK | Roche Registration<br>GmbH | 100              | G12.0-G12.0,<br>G12.1-G12.1 | Neuroloog |        |           | 19,00      | geneetiliselt kinnitatud<br>5q spinaalse<br>lihasatroofia raviks<br>patsiendile, kellel on<br>määratud kuni 3 SMN2<br>geenikoopiat ja<br>diagnoositud I, II või III<br>tüüpi SMA ning kes on<br>ravi alustamisel alla<br>19-aastane ning ei<br>vaja püsiventilatsiooni.<br>Ravi alustamise ja<br>lõpetamise otsuse on<br>langetanud arstide<br>ekspertkomisjon<br>(kaks lasteneuroloogi<br>ja geneetik) ning<br>patsient on SMA<br>ravimise kogemusega<br>lasteneuroloogi või<br>neuroloogi jälgimisel.<br>Ravivastuse<br>hindamine toimub iga<br>kolme kuu tagant. Ravi<br>lõpetatakse<br>püsiventilatsiooni<br>vajaduse tekkel või kui<br>ilmneb motoorsete<br>funktsioonide kliiniliselt<br>oluline halvenemine<br>mõõdetuna motoorsete<br>funktsioonide<br>hindamise skaalal (I<br>tüübi korral HINE-2 või<br>CHOP-INTEND ning II-<br>III tüübi korral MFM32,<br>RULM või HFMSE<br>alusel). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1285680         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISENDROS 35MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                   | Zentiva k.s.               | 75               | M80-M80          |             |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1298257         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | NORIFAZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                          | Adamed Pharma S.A.         | 75               | M80-M80          |             |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1310757         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISEDRONATE SODIUM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK     | Accord Healthcare<br>B.V.  | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | M80-M80          |             |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1310780         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISEDRONATE SODIUM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK | Accord Healthcare<br>B.V.  | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | M80-M80          |             |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1060456         | risperidoon, 1mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 1 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK               | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1271258         | risperidoon, 1mg                 | N05AX08  | MEDORISPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | Medochemie Limited         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1367670         | risperidoon, 1mg                 | N05AX08  | RISPERIDONE ACCORD 1<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>B.V.  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1041028         | risperidoon, 1mg 1ml             | N05AX08  | RISPOLEPT, suukaudne<br>lahus, 100ml 1TK                                 | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1067509         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 2 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1151974         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS<br>2MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Actavis Group PTC ehf      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1271337         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | MEDORISPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Medochemie Limited         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1367726         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPERIDONE ACCORD 2<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>B.V.  | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1067521         | risperidoon, 3mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 3 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1271416         | risperidoon, 3mg                 | N05AX08  | MEDORISPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Medochemie Limited         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1367760         | risperidoon, 3mg                 | N05AX08  | RISPERIDONE ACCORD 3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>B.V.  | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
| 1067532         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 4 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1152010         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS<br>4MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Actavis Group PTC ehf      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused        |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1367805         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPERIDONE ACCORD 4<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>B.V.            | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31                      | Psühhiaater |        |           |            |                 |
| 1381665         | rivaroksabaan, 10mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                    | Bayer AG                             | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |             |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
| 1381676         | rivaroksabaan, 10mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Bayer AG                             | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |             |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
| 1552621         | rivaroksabaan, 15mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | Bayer AG                             | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | I48-I48                               |             |        |           |            |                 |
| 1552632         | rivaroksabaan, 15mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK                    | Bayer AG                             | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | I48-I48                               |             |        |           |            |                 |
| 1552687         | rivaroksabaan, 20mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | Bayer AG                             | 75               | I48-I48                               |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
| 1225741         | ropinirool, 2mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |            |                 |
| 1436598         | ropinirool, 2mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 2MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
| 1225796         | ropinirool, 4mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |            |                 |
| 1436633         | ropinirool, 4mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |            |                 |
| 1225819         | ropinirool, 8mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |            |                 |
| 1436677         | ropinirool, 8mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 8MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto            | 50               |                                       |             |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |            |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1106053         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | AstraZeneca AB                 | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1384758         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1384792         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1396874         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUCARD 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.                   | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1396896         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUCARD 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK             | Zentiva k.s.              | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1477267         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TAD 10<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | TAD Pharma GmbH           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1477975         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSWERA 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1477997         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSWERA 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1587360         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie Limited        | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66                         |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
| 1654174         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
| 1654219         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1684638         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TEVA<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1397099         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUCARD 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Zentiva k.s.                   | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1397112         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUCARD 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK               | Zentiva k.s.                   | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                |                  |   |        |        |           |            |          |
| 1473476         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1473511         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1477481         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TAD 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | TAD Pharma GmbH                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1478190         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSWERA 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1478213         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSWERA 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1587517         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie Limited        | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66                         |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |
| 1654321         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
| 1654365         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1684773         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TEVA<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1477863         | rosuvastatiin, 5mg               | C10AA07  | ROSWERA 5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1653993         | rosuvastatiin, 5mg               | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1620964         | rosuvastatiin+esetimiib<br>, 10mg+10mg | C10BA06  | DELIPID PLUS, kõvakapsel,<br>30TK | Egis Pharmaceuticals<br>PLC | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |  |          |                                   |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust  |
|                 |  |          |                                   |                             | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |  |          |                                   |                             | 50               |   |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1757921         | rosuvastatiin+esetimiib<br>, 10mg+10mg | C10BA06  | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |  |          |   |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1789870         | rosuvastatiin+esetimiib<br>, 10mg+10mg | C10BA06  | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1621044         | rosuvastatiin+esetimiib<br>, 20mg+10mg | C10BA06  | DELIPID PLUS, kõvakapsel,<br>30TK | Egis Pharmaceuticals<br>PLC | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgkväärtust  |
|                 |  |          |                                   |                             | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgkväärtust      |
|                 |  |          |                                   |                             | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |                                   |                             | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1758102         | rosuvastatiin+esetimiib<br>, 20mg+10mg | C10BA06  | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |  |          |   |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1789926         | rosuvastatiin+esetimiib<br>, 20mg+10mg                        | C10BA06  | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kui vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust  |
|                 |   |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | patsientidel, kellel<br>esineb<br>neerupuudulikkus<br>alates III staadiumist ja<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |   |          |   |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel kui<br>vaatamata<br>rosuvastatiini<br>optimaalse annuse<br>kasutamisele ei<br>saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |   |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1731192         | rosuvastatiin+perindop<br>riil+indapamiid,<br>20mg+4mg+1,25mg | C10BX13  | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |        |        |           |            | kui samaaegselt on<br>täidetud rosuvastatiini<br>kõrgema<br>soodusmääraga (75%<br>või 100%)<br>väljakirjutamise<br>tingimused  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1731316         | rosuvastatiin+perindop<br>riil+indapamiid,<br>20mg+8mg+2,5mg | C10BX13  | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                         |        |           |            | kui samaaegselt on<br>täidetud rosuvastatiini<br>kõrgema<br>soodusmääraga (75%<br>või 100%)<br>väljakirjutamise<br>tingimused   |
| 1666021         | ruksolitiniib, 10mg  | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK                                 | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D45-D45                       | Onkoloog,<br>Hematoloog | esmane |           |            | täiskasvanud<br>patsientidele, kes on<br>resistentsed või ei talu<br>hüdroksüureat  |
| 1632901         | ruksolitiniib, 15mg  | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK                                 | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D47.1-D47.1                   | Hematoloog              |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt<br>kolme hematoloogi)<br>otsuse alusel<br>primaarse või<br>sekundaarse<br>müelofibroosi raviks<br>keskmise-2 või kõrge<br>riskiga (IPSS≥2)<br>patsientidele, kellel<br>eelnev ravi<br>hüdroksüureaga<br>(annuses vähemalt 2 g<br>päevas vähemalt 3 kuu<br>jooksul) on osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1632934         | ruksolitiniib, 20mg              | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D47.1-D47.1 | Hematoloog              |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS≥2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1632877         | ruksolitiniib, 5mg               | L01EJ01  | JAKAVI, tablett, 56TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D45-D45     | Hematoloog,<br>Onkoloog | esmane |           |            | täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüüureat  |
|                 |                                  |          |                       |                               | 100              | D47.1-D47.1 | Hematoloog              |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS≥2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1456196         | saksagliptiin, 5mg               | A10BH03  | ONGLYZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | AstraZeneca AB  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1725522         | saksagliptiin+dapagliflo<br>siin, 5mg+10mg | A10BD21  | QTERN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | AstraZeneca AB                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                      | 75               | I50-I50          |             |        |           |            | kroonilise<br>südamepuudulikkuse<br>korral patsiendile,<br>kellel esineb<br>kaasuvana II tüüpi<br>diabeet, kellel on<br>vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=40%), kes<br>kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea ning kellel AKE-<br>inhibiitor või ARB ja<br>beetablokaatori<br>kaksikravil<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |
|                 |  |          |   |                                      | 75               | E11-E11, E14-E14 |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud   |
| 1005512         | salbutamool, 100mcg<br>1annust             | R03AC02  | VENTOLIN,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 200annust 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |  |
| 1031308         | salbutamool, 200mcg<br>1annust             | R03AC02  | VENTOLIN DISKUS,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK          | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004319         | salbutamool, 400mcg<br>1ml                                 | R03CC02  | VENTOLIN SYRUP, siirup,<br>150ml 1TK                                       | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1004948         | salbutamool, 5000mcg<br>1ml                                | R03AC02  | VENTOLIN, nebuliseeritav<br>lahus, 20ml 1TK                                | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1664423         | salbutamool+beklomet<br>asoon,<br>100mcg+250mcg<br>1annust | R03AK13  | SABACOMB,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 200annust 1TK          | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH    | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
| 1000405         | salmeterool, 25mcg<br>1annust                              | R03AC12  | SEREVENT,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK          | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1007907         | salmeterool, 50mcg<br>1annust                              | R03AC12  | SEREVENT DISKUS 50<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK            | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1717219         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+125mcg                  | R03AK06  | SERKEP,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK            | Viatris Limited                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1107346         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+125mcg<br>1annust       | R03AK06  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
| 1717220         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+250mcg                  | R03AK06  | SERKEP,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK            | Viatris Limited                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
| 1107357         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+250mcg<br>1annust       | R03AK06  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
| 1107335         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+50mcg<br>1annust        | R03AK06  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK  | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1037607         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 50mcg+100mcg<br>1annust       | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 100,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1827468         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+100mcg<br>1annust | R03AK06  | EVERIO AIRMASTER,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK    | Zentiva k.s.                         | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
| 1636466         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg            | R03AK06  | AIRFLUSAL FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.       | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
| 1037595         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 250,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
| 1827514         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg<br>1annust | R03AK06  | EVERIO AIRMASTER,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK    | Zentiva k.s.                         | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
| 1636512         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg            | R03AK06  | AIRFLUSAL FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.       | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/μL ning<br>kellel on esinenud<br>vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1153167         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 500,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-----------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1827558         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg<br>1annust | R03AK06  | EVERIO AIRMASTER,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 1TK | Zentiva k.s.    | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                 | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |  |          |   |                 | 75               | J45-J45  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1391789         | sapropteriin, 100mg              | A16AX07  | KUVAN, lahustuv tablett,<br>120TK | BioMarin International<br>Limited | 100              | E70.0-E70.1 |        |        |           | 18,00      | konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri või<br>meditsiinigeneetiku<br>ühise) otsuse alusel<br>järgmistel tingimustel:<br>tegemist on<br>biopteriinitundliku<br>haigusvormiga ning<br>dieedi järgimine ei ole<br>taganud ravijuhendi<br>kohase vere<br>fenüülalaniini taseme<br>eesmärkväärtuse<br>saavutamist; ravi võib<br>jätkata kuni 18.<br>eluaastani patsiendil,<br>kellel ravimi<br>kasutamisega püsib<br>fenüülalaniini tase<br>eesmärkväärtuste<br>piires |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1675649         | sekukinumab, 150mg<br>1ml        | L04AC10  | COSENTYX, süstelahus pen-<br>süstlis, 1ml 1TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel patsientidele,<br>kes vastavad Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus L40 diagnoosi<br>korral kehtivatele TNF-<br>alfa inhibiitori<br>hüvitamistingimustele<br>ning kes on saanud<br>haigekassa rahastusel<br>ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust<br>modifitseeriva<br>toimeainega, mis on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või<br>kellele on TNF-alfa<br>inhibiitori kasutamine<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1833960         | sekukinumab, 300mg<br>2ml        | L04AC10  | COSENTYX, süstelahus pen-<br>süstlis, 2ml 1TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel patsientidele,<br>kes vastavad Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus L40 diagnoosi<br>korral kehtivatele TNF-<br>alfa inhibiitori<br>hüvitamistingimustele<br>ning kes on saanud<br>haigekassa rahastusel<br>ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust<br>modifitseeriva<br>toimeainega, mis on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või<br>kellele on TNF-alfa<br>inhibiitori kasutamine<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1719031         | seleksipaag, 1000mcg             | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1719042         | seleksipaag, 1200mcg             | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1719053         | seleksipaag, 1400mcg             | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1719064         | seleksipaag, 1600mcg             | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1718973         | seleksipaag, 200mcg              | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1718984         | seleksipaag, 200mcg              | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>140TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1719008         | seleksipaag, 400mcg              | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1719019         | seleksipaag, 600mcg              | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1719020         | seleksipaag, 800mcg              | B01AC27  | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni<br>kombineeritud raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui haiguse<br>kontrolli all hoidmiseks<br>ei piisa<br>endoteliinireseptori<br>antagonistist (ERA) ja<br>5. tüüpi<br>fosfodiesteraasi (PDE-<br>5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1788509         | semaglutiid, 0,25mg<br>1annuses  | A10BJ06  | OZEMPIC, süstelahus pen-<br>süstlis, 4annust 1TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumisega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1788510         | semaglutiid, 0,5mg<br>1annuses   | A10BJ06  | OZEMPIC, süstelahus pen-<br>süstlis, 4annust 1TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumisega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1815892         | semaglutiid, 14mg                | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |                         |                  | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1788521         | semaglutiid, 1mg<br>1annuses     | A10BJ06  | OZEMPIC, süstelahus pen-<br>süstlis, 4annust 1TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumisega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1815825         | semaglutiid, 3mg                 | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK | Novo Nordisk A/S | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |
|                 |                                  |          |                         |                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1815869         | semaglutiid, 7mg                 | A10BJ06  | RYBELSUS, tablett, 30TK                           | Novo Nordisk A/S | 50               | E11-E11, E14-E14 |             |        |           |            | juhul kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | E11-E11, E14-E14 |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
| 1027066         | sertindool, 12mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S  | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |
| 1027077         | sertindool, 16mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1027088         | sertindool, 20mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S  | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1027055         | sertindool, 4mg                  | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | H. Lundbeck A/S           | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F20-F29                      | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1013746         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1160615         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | SERTRALINE LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1189762         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | ERSET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Rivopharm Limited         | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1669989         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | SERTRALINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK     | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1008638         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Upjohn EESV               | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1143100         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1160569         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRALINE LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1189841         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ERSET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Rivopharm Limited         | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1239218         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRALINE-TEVA 50 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |                              |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1669888         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRALINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                              |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
| 1831968         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | UAB "Lex ano"             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |                      |        |           |            |   |
| 1422425         | sevelameer, 800mg                | V03AE02  | REVELA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK            | Genzyme Europe B.V.       | 100              | N18-N18                      | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                              |                      |        |           |            |   |
| 1484984         | sevelameer, 800mg                | V03AE02  | SEVELAMER AUXILIA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 180TK | Auxilia Pharma OÜ         | 50               |                              |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18                      | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1221039         | sildenafil, 20mg                 | G04BE03  | REVATIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                | Upjohn EESV      | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |           |            |  |
| 1702987         | sildenafil, 20mg                 | G04BE03  | SILDENAFIL TEVA PHARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 90TK | Teva Pharma B.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1734117         | sildenafil, 20mg                 | G04BE03  | GRANPIDAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel |
| 1755378         | sildenafil, 20mg                 | G04BE03  | SILUNGO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK   | UAB Norameda                | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1080166         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Hexal AG                  | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
| 1594447         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1010260         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1080177         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Hexal AG                  | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1083956         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1594458         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
| 1621493         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                  | Hexal AG                  | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1083978         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1129700         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Hexal AG                      | 50               |   |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | N18-N18   |           |        |           |            |   |
| 1594469         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 100              | N18-N18   |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | I21-I22, Z45-Z45,<br>Z95-Z95, I65-I66,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63, I25-<br>I25, E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |            |   |
| 1809873         | siponimood, 0,25mg               | L04AA42  | MAYZENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | G35-G35   | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>sekundaarse<br>progresseeruva<br>hulgiskleroosi aktiivse<br>vormi, mida kinnitavad<br>ägenemiste esinemise<br>või piltagnostikal<br>ilmnev põletikuline<br>aktiivsus, raviks<br>täiskasvanud<br>patsientidele |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1809884         | siponimood, 0,25mg               | L04AA42  | MAYZENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | G35-G35          | Neuroloog   | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>sekundaarse<br>progresseeruva<br>hulgiskleroosi aktiivse<br>vormi, mida kinnitavad<br>ägenemiste esinemise<br>või piltagnostikal<br>ilmnev põletikuline<br>aktiivsus, raviks<br>täiskasvanud<br>patsientidele |
| 1809895         | siponimood, 2mg                  | L04AA42  | MAYZENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | G35-G35          | Neuroloog   | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>sekundaarse<br>progresseeruva<br>hulgiskleroosi aktiivse<br>vormi, mida kinnitavad<br>ägenemiste esinemise<br>või piltagnostikal<br>ilmnev põletikuline<br>aktiivsus, raviks<br>täiskasvanud<br>patsientidele |
| 1107739         | siroliimus, 1mg                  | L04AA10  | RAPAMUNE, kaetud tablett,<br>30TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG      | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | D18.1-D18.1      | Pulmonoloog |        |           |            | lümfangioleiomüomato<br>osi näidustusel   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1286568         | sitagliptiin, 100mg              | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 50               |                  |        |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus on patsientidele,<br>kelle ravi sitagliptiini<br>sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>patsientidele, kelle ravi<br>sitagliptiini sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1286445         | sitagliptiin, 25mg               | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>patsientidele, kelle ravi<br>sitagliptiini sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a. |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                  |        |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus on patsientidele,<br>kelle ravi sitagliptiini<br>sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1286502         | sitagliptiin, 50mg                         | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.                     | 50               |                  |                                    |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus on patsientidele,<br>kelle ravi sitagliptiini<br>sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a   |
|                 |  |          |   |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                    |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>patsientidele, kelle ravi<br>sitagliptiini sisaldavate<br>ravimpreparaatidega<br>on alustatud enne<br>01.01.2019.a. |
| 1725825         | sofosbuviiir+velpatasvii<br>r, 400mg+100mg | J05AP55  | EPCLUSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Gilead Sciences<br>Ireland Unlimited<br>Company | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | Soodustus kehtib<br>patsientidele, kelle ravi<br>sofosbuviiir +<br>velpatasviiir sisaldava<br>ravimpreparaadiga on<br>välja kirjutatud enne<br>01.10.2021.  |
| 1597440         | solifenatsiin, 10mg                        | G04BD08  | SOLIFENACIN PMCS 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Pro.med.cs Praha a.s.                           | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1686517         | solifenatsiin, 10mg                        | G04BD08  | TAMISTEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Medochemie Limited                              | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                          |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1597372         | solifenatsiin, 5mg               | G04BD08  | SOLIFENACIN PMCS 5MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Pro.med.cs Praha a.s.    | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1685932         | solifenatsiin, 5mg               | G04BD08  | TAMISTEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Medochemie Limited       | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1041185         | somatropiin, 12mg                | H01AC01  | GENOTROPIN, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1369009         | somatropiin, 3,3mg<br>1ml        | H01AC01  | OMNITROPE, süstelahus,<br>1.5ml 5TK                                | Sandoz GmbH              | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1022072         | somatropiin, 5,3mg               | H01AC01  | GENOTROPIN, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
| 1415528         | somatropiin, 5,83mg<br>1ml       | H01AC01  | SAIZEN 5,83 MG/ML,<br>süstelahus kolbampullis,<br>1.03ml 1TK       | Merck Serono S.p.A.      | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1369032         | somatropiin, 6,7mg<br>1ml        | H01AC01  | OMNITROPE, süstelahus,<br>1.5ml 1TK                                | Sandoz GmbH              | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |               |        |           |            |                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                          |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1415540         | somatropiin, 8mg 1ml             | H01AC01  | SAIZEN 8 MG/ML, süstelahus<br>kolbampullis, 1.5ml 1TK | Merck Serono S.p.A. | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1249938         | sorafeniib, 200mg                | L01EX02  | NEXAVAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Bayer AG        | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sorafeniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni, ku<br>i ravi alustamise<br>sorafeniibiga on<br>hinnanud konsiilium<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>hepatotsellulaarne<br>kartsinoom, patsiendi<br>üldseisund on hea<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi) ning<br>maksa funktsioon ei<br>ole oluliselt häiritud.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>sorafeniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2010.<br>a. |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1756852     | sorafeniib, 200mg             | L01EX02  | SORAFENIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK | Teva B.V.       | 100          | C22-C22  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja             | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1794359     | sorafeniib, 200mg             | L01EX02  | SORAFENIB SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100          | C22-C22  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-----------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1806791     | sorafeniib, 200mg             | L01EX02  | SORAFENIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK | Zentiva k.s.    | 100          | C22-C22  | Onkoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                                   |                           | 100              | C64-C64     | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
| 1034480         | sotalool, 80mg                   | C07AA07  | SOTAHEXAL 80 MG, tablett,<br>20TK | Hexal AG                  | 50               |             |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                           | 75               | I47-I49     |          |        |           |            |   |
| 1071863         | sotalool, 80mg                   | C07AA07  | SOTAHEXAL 80 MG, tablett,<br>50TK | Hexal AG                  | 50               |             |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                           | 75               | I47-I49     |          |        |           |            |   |
| 1001091         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK             | Orifarm Healthcare<br>A/S | 75               | I10-I13     |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                           | 75               | I50-I50     |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                           | 75               | I15-I15     |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                           | 50               |             |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                           | 100              | I27.0-I27.0 |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1689060         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
| 1689071         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
| 1000944         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK  | Orifarm Healthcare<br>A/S | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I10-I13                       |        |        |           |            |          |
| 1688946         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1688957         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
| 1001013         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK  | Orifarm Healthcare<br>A/S | 75               | I15-I15                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I10-I13                       |        |        |           |            |          |
| 1042018         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | VEROSPIRON, kõvakapsel,<br>30TK  | Gedeon Richter Plc.       | 75               | I15-I15                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I10-I13                       |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1071650         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 100TK   | Orifarm Healthcare<br>A/S | 75               | I15-I15                       |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I50-I50                       |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I10-I13                       |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |           |        |           |            |  |
| 1689004         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0                   |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |  |
| 1689015         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                               |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0                   |           |        |           |            |  |
| 1280056         | stiripentool, 250mg              | N03AX17  | DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK   | Biocodex                  | 100              | G40-G40                       | Neuroloog |        |           |            | koos klobasaami ja<br>valproaadiga<br>väikelapse raske<br>müokloonilise epilepsia<br>(SMEI, Dravet'<br>sündroom) korral, kui<br>kombinatsioonravi<br>klobasaami ja<br>valproaadiga on<br>osutunud ebapiisavaks<br>ning topiramaat ja<br>levetiratsetaam on<br>ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1280146         | stiripentool, 250mg              | N03AX17  | DIACOMIT, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 60TK | Biocodex        | 100              | G40-G40  | Neuroloog |        |           |            | koos klobasaami ja<br>valproaadiga<br>väikelapse raske<br>müokloonilise epilepsia<br>(SMEI, Dravet'<br>sündroom) korral, kui<br>kombinatsioonravi<br>klobasaami ja<br>valproaadiga on<br>osutunud ebapiisavaks<br>ning topiramaat ja<br>levetiratsetaam on<br>ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |
| 1280089         | stiripentool, 500mg              | N03AX17  | DIACOMIT, kõvakapsel, 60TK                       | Biocodex        | 100              | G40-G40  | Neuroloog |        |           |            | koos klobasaami ja<br>valproaadiga<br>väikelapse raske<br>müokloonilise epilepsia<br>(SMEI, Dravet'<br>sündroom) korral, kui<br>kombinatsioonravi<br>klobasaami ja<br>valproaadiga on<br>osutunud ebapiisavaks<br>ning topiramaat ja<br>levetiratsetaam on<br>ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos                                    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|--|----------|--|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1280113     | stiripentool, 500mg                        | N03AX17  | DIACOMIT, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK      | Biocodex                          | 100          | G40-G40                                     | Neuroloog                   |        |           |            | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet' sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1008818     | sulfametoksasool+trimetoprim, 40mg+8mg 1ml | J01EE01  | BACTRIM, siirup, 100ml 1TK                         | Eumedica Pharmaceuticals GmbH     | 50           |   |                             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 100          | Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24               | Infektsionist               |        |           |            |   |
| 1016086     | sulfametoksasool+trimetoprim, 800mg+160mg  | J01EE01  | BERLOCID, tablett, 20TK                            | Berlin-Chemie AG                  | 100          | Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24               | Infektsionist               |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 50           |   |                             |        |           |            |   |
| 1023455     | sulfasalasiin, 500mg                       | A07EC01  | SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK   | Pfizer Europe MA EEIG             | 75           | K51-K51, K50-K50                            | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 50           |   |                             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 75           | M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater      | esmane |           |            |   |
| 1705115     | sulpiriid, 100mg                           | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks                       | 100          | F20-F29                                     | Psühhiaater                 |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 50           |   |                             |        |           |            |   |
| 1705126     | sulpiriid, 200mg                           | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks                       | 100          | F20-F29                                     | Psühhiaater                 |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 50           |   |                             |        |           |            |   |
| 1705081     | sulpiriid, 50mg                            | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks                       | 50           |   |                             |        |           |            |   |
|             |  |          |  |                                   | 100          | F20-F29                                     | Psühhiaater                 |        |           |            |   |
| 1018482     | sultamitsilliin, 375mg                     | J01CR04  | UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK     | Pfizer Europe MA EEIG             | 50           |   |                             |        |           |            |   |
| 1139914     | sumatriptaan, 100mg                        | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 50           |   |                             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1139947         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234213         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | CINIE 100 MG, tablett, 6TK                            | Zentiva k.s.                         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234505         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | SUMATRIPTAN STADA,<br>tablett, 6TK                    | Stada Arzneimittel AG                | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1278053         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | SUMATRIPTAN ACTAVIS,<br>kaetud tablett, 6TK           | Actavis Group PTC ehf                | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1139880         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1139903         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234156         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | CINIE 50 MG, tablett, 6TK                             | Zentiva k.s.                         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1277995         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | SUMATRIPTAN ACTAVIS,<br>kaetud tablett, 6TK           | Actavis Group PTC ehf                | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353305         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1725263         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUNITINIB TEVA,<br>kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1759103         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUNITINIB SANDOZ,<br>kõvakapsel, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>proгноos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1776854         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUNITINIB MYLAN,<br>kõvakapsel, 28TK | Mylan Ireland Limited | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1803383         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUNITINIB ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1807792         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUNITINIB NORAMEDA,<br>kõvakapsel, 28TK | UAB Norameda    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1842397         | sunitiniib, 12,5mg               | L01EX01  | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353293         | sunitiniib, 25mg                 | L01EX01  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1842421         | sunitiniib, 25mg                 | L01EX01  | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353282         | sunitiniib, 50mg                 | L01EX01  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1725308         | sunitiniib, 50mg                 | L01EX01  | SUNITINIB TEVA,<br>kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1759169         | sunitiniib, 50mg                 | L01EX01  | SUNITINIB SANDOZ,<br>kõvakapsel, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1776876         | sunitiniib, 50mg                 | L01EX01  | SUNITINIB MYLAN,<br>kõvakapsel, 28TK | Mylan Ireland Limited | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1803653         | sunitiniib, 50mg                 | L01EX01  | SUNITINIB ZENTIVA,<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1807826         | sunitiniib, 50mg                 | L01EX01  | SUNITINIB NORAMEDA,<br>kõvakapsel, 28TK | UAB Norameda    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1842487         | sunitiniib, 50mg                      | L01EX01  | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
| 1113422         | zidovudiin, 10mg 1ml                  | J05AF01  | RETROVIR, suukaudne<br>lahus, 200ml 1TK                | Viiv Healthcare B.V.        | 50               |          | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega   |
| 1036460         | zidovudiin+lamivudiin,<br>300mg+150mg | J05AR01  | COMBIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Viiv Healthcare B.V.        | 50               |          | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005815         | zuklopentiksool, 10mg            | N05AF05  | CISORDINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | H. Lundbeck A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1006232         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml    | N05AF05  | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                 | H. Lundbeck A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1065226         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml    | N05AF05  | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 10TK                | H. Lundbeck A/S | 50               |  | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|------------|--|
| 1006322         | zuklopentiksool, 50mg<br>1ml     | N05AF05  | CISORDINOL-ACUTARD,<br>süstelahus, 1ml 10TK                    | H. Lundbeck A/S           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater  | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |  |        |           |            |  |
| 1679036         | tadalafiil, 20mg                 | G04BE08  | TADALAFIL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0  | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise või<br>päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               | I27.0-I27.0  | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1753703         | tafluprost, 0,015mg<br>1ml       | S01EE05  | TAFLOTAN, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK                             | Santen Oy                      | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui ravi jätkamine<br>teiste<br>glaukoomiravimitega<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud<br>bensalkooniumkloriidil<br>e tekkinud tõendatud<br>ülitundlikkuse või<br>olulise toksilise toime<br>tõttu silma eesmisele<br>osale  |
| 1179840         | takroliimus, 0,3mg 1g            | D11AH01  | PROTOPIC, salv, 30g 1TK  | LEO Pharma A/S                 | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1294646         | takroliimus, 0,5mg               | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |             |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1776618         | takroliimus, 0,5mg               | L04AD02  | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1661105         | takroliimus, 0,75mg              | L04AD02  | ENVARISUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | Chiesi Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1294680         | takroliimus, 1mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1661149         | takroliimus, 1mg                 | L04AD02  | ENVARUSUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Chiesi Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1776652         | takroliimus, 1mg                 | L04AD02  | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1179851         | takroliimus, 1mg 1g              | D11AH01  | PROTOPIC, salv, 30g 1TK  | LEO Pharma A/S                 | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1665277         | takroliimus, 1mg 1g              | D11AH01  | LEBSANAN, salv, 30g 1TK  | UAB Norameda                   | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1488337         | takroliimus, 3mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK   | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1776731         | takroliimus, 3mg                 | L04AD02  | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1661161         | takroliimus, 4mg                 | L04AD02  | ENVARISUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | Chiesi Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA >20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------------|--------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1294668     | takroliimus, 5mg              | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK   | Astellas Pharma Europe B.V.      | 100          | Z94-Z94, T86-T86 |            |        |           |            | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776775     | takroliimus, 5mg              | L04AD02  | DAILIPOINT, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d.      | 100          | Z94-Z94, T86-T86 |            |        |           |            | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1347230     | talidomiid, 50mg              | L04AX02  | THALIDOMIDE BMS, kõvakapsel, 28TK                                | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100          | C90.0-C90.0      | Hematoloog |        |           |            | ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüeloomi suukaudseks mono- või kombinatsioonraviks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                    |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|-----------------------------|
| 1015704         | tamoksifeen, 20mg                        | L02BA01  | TAMOXIFEN "EBEWE",<br>tablett, 30TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                          | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
|                 |  |          |   |   | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog |        |           |            | rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |  |          |   |   | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |                             |
|                 |  |          |   |   | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |                             |
| 1188143         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | FLOSIN 0,4MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK         | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1188378         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TAMSULOSIN AUXILIA,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK   | Auxilia Pharma OÜ                                       | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1188402         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TAMSULOSIN AUXILIA,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav kõvakapsel, 60TK   | Auxilia Pharma OÜ                                       | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1188480         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TAMSULOSIN LANNACHER,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | G.L. Pharma GmbH  | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1188659         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TAMSULOSIN STADA,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK    | Stada Arzneimittel AG                                   | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1195826         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | OMSAL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                 | Gedeon Richter Plc.                                     | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1436015         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TANYZ ERAS 0.4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK         | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1390463         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | COMBODART, kõvakapsel,<br>30TK  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited          | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1769609         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTASTERIDE/TAMSULOSI<br>N OLAINFARM, kõvakapsel,<br>30TK                         | JSC Olainfarm   | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1769632         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTASTERIDE/TAMSULOSI<br>N MYLAN, kõvakapsel, 30TK                                | Mylan Ireland Limited                                   | 50               |             |                          |        |           |            |                             |
| 1769744         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTROZEN, kõvakapsel,<br>30TK   | Zentiva k.s.  | 50               |             |                          |        |           |            |                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1771242         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTASTERIDE/TAMSULOSI<br>N ACCORD, kõvakapsel,<br>30TK  | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1771253         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTASTERIDE/TAMSULOSI<br>N ACCORD, kõvakapsel,<br>90TK  | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1776821         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTASTERIDE/TAMSULOSI<br>N TEVA, kõvakapsel, 30TK       | Teva B.V.                                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1782660         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | TADUSTA, kõvakapsel, 30TK                               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1785089         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | DUTASTERIDE/TAMSULOSI<br>N EXELTIS, kõvakapsel,<br>30TK | UAB "Exeltis Baltics"                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1046292         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | MICARDIS, tablett, 28TK                                 | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1395424         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | TELMISARTAN-<br>RATIOPHARM 40MG, tablett,<br>28TK       | Ratiopharm GmbH                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1430233         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | TELMISARTAN SANDOZ 40<br>MG, tablett, 28TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1482263         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | TOLURA, tablett, 30TK                                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1482274         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | TOLURA, tablett, 56TK                                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1046258         | telmisartaan, 80mg                       | C09CA07  | MICARDIS, tablett, 28TK                                 | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1395569         | telmisartaan, 80mg                       | C09CA07  | TELMISARTAN-<br>RATIOPHARM 80MG, tablett,<br>28TK       | Ratiopharm GmbH                            | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1430389         | telmisartaan, 80mg                       | C09CA07  | TELMISARTAN SANDOZ 80<br>MG, tablett, 28TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1482331         | telmisartaan, 80mg                       | C09CA07  | TOLURA, tablett, 30TK                                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1482342         | telmisartaan, 80mg                       | C09CA07  | TOLURA, tablett, 56TK                                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1499452         | telmisartaan+amlodipii<br>n, 80mg+10mg          | C09DB04  | TWYNSTA, tablett, 28TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1643161         | telmisartaan+amlodipii<br>n, 80mg+10mg          | C09DB04  | MIXOR, tablett, 28TK   | Zentiva k.s.                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1707049         | telmisartaan+amlodipii<br>n, 80mg+10mg          | C09DB04  | TELDIPIN, tablett, 28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1499384         | telmisartaan+amlodipii<br>n, 80mg+5mg           | C09DB04  | TWYNSTA, tablett, 28TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1643071         | telmisartaan+amlodipii<br>n, 80mg+5mg           | C09DB04  | MIXOR, tablett, 28TK   | Zentiva k.s.                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1706969         | telmisartaan+amlodipii<br>n, 80mg+5mg           | C09DB04  | TELDIPIN, tablett, 28TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1609613         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 40mg+12,5mg | C09DA07  | TOLUCOMBI, tablett, 56TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1114793         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | MICARDISPLUS, tablett,<br>28TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1566615         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | TELMISARTAN/HYDROCHL<br>OROTHIAZIDE TAD, tablett,<br>30TK              | TAD Pharma GmbH                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1566996         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | TEZEO HCT 80 MG/12,5 MG,<br>tablett, 28TK                              | Zentiva k.s.                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1567267         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | TELMISARTAN<br>/HYDROCHLOROTHIAZIDE<br>SANDOZ, kaetud tablett,<br>28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1609691         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | TOLUCOMBI, tablett, 56TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1612910         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | TELMISARTAN/HYDROCHL<br>OROTHIAZIDE TEVA<br>PHARMA, tablett, 28TK      | Teva B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1676954         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | TELMISARTAN/HYDROCHL<br>OROTHIAZIDE ACCORD,<br>tablett, 28TK           | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1367524         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07  | MICARDISPLUS, tablett,<br>28TK   | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                  |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |   |
| 1566705         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07  | TELMISARTAN/HYDROCHL<br>OROTHIAZIDE TAD, tablett,<br>30TK              | TAD Pharma GmbH                            | 50               |                  |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |   |
| 1567379         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07  | TELMISARTAN<br>/HYDROCHLOROTHIAZIDE<br>SANDOZ, kaetud tablett,<br>28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.             | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |  |        |           |            |   |
| 1609770         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07  | TOLUCOMBI, tablett, 56TK   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |  |        |           |            |   |
| 1613045         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07  | TELMISARTAN/HYDROCHL<br>OROTHIAZIDE TEVA<br>PHARMA, tablett, 28TK      | Teva B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |  |        |           |            |   |
| 1677045         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07  | TELMISARTAN/HYDROCHL<br>OROTHIAZIDE ACCORD,<br>tablett, 28TK           | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                  |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |   |
| 1458963         | temosolomiid, 100mg                           | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK                                  | Teva B.V.                                  | 50               |                  |  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 100              | C71-C71          | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog, Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1462115         | temosolomiid, 100mg                           | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 5TK                                | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | C71-C71          | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog, Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1534676         | temosolomiid, 100mg              | L01AX03  | BLASTOMAT 100 MG,<br>kõvakapsel, 5TK    | Alvogen Ipco S.a.r.l.       | 100              | C71-C71  | Onkoloog, Pediaater<br>– hematoloog-<br>onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |  |        |           |            |   |
| 1462137         | temosolomiid, 140mg              | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 5TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | C71-C71  | Onkoloog, Pediaater<br>– hematoloog-<br>onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1534698         | temosolomiid, 140mg              | L01AX03  | BLASTOMAT 140 MG,<br>kõvakapsel, 5TK    | Alvogen Ipco S.a.r.l.       | 50               |          |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | C71-C71  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog, Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1458941         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK   | Teva B.V.                   | 50               |          |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | C71-C71  | Pediaater –<br>hematoloog-<br>onkoloog, Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1462092         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 5TK                                     | Accord Healthcare<br>S.L.U.                     | 50               |             |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C71-C71     | Onkoloog, Pediaater<br>– hematoloog-<br>onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1534654         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | BLASTOMAT 20 MG,<br>kõvakapsel, 5TK   | Alvogen Ipco S.a.r.l.                           | 100              | C71-C71     | Onkoloog, Pediaater<br>– hematoloog-<br>onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |             |  |        |           |            |   |
| 1462171         | temosolomiid, 250mg              | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE ACCORD,<br>kõvakapsel, 5TK                                     | Accord Healthcare<br>S.L.U.                     | 100              | C71-C71     | Onkoloog, Pediaater<br>– hematoloog-<br>onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |             |  |        |           |            |   |
| 1736513         | tenofoviiralafenamiid,<br>25mg   | J05AF13  | VEMLIDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Gilead Sciences<br>Ireland Unlimited<br>Company | 100              | B18.0-B18.1 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist               |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>B-viirushepatiidi raviks   |
| 1734825         | tenofoviirdisoproksiil,<br>245mg | J05AF07  | TENOFOVIR DISOPROXIL<br>MYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited             | 100              | B18.0-B18.1 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog               |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>B-viirushepatiidi raviks   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1678541         | tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin,<br>245mg+200mg | J05AR03  | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK    | Teva B.V.       | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist |        |           |            | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
|                 |   |          |  |                 | 50               | Z29.2-Z29.2 | Infektsionist |        |           |            | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule  |
| 1732003         | tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin,<br>245mg+200mg | J05AR03  | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist |        |           |            | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
|                 |   |          |  |                 | 50               | Z29.2-Z29.2 | Infektsionist |        |           |            | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1735905         | tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg | J05AR03  | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK        | Mylan Pharmaceuticals Limited | 50               | Z29.2-Z29.2 | Infektsionist |        |           |            | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist |        |           |            | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1760217         | tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiin, 245mg+200mg | J05AR03  | EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL ACCORDPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Accord Healthcare B.V.        | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist |        |           |            | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
|                 |  |          |   |                               | 50               | Z29.2-Z29.2 | Infektsionist |        |           |            | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP) profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise vältimiseks HIV-negatiivsele isikule  |
| 1124031         | teofülliin, 200mg                                  | R03DA04  | RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK                          | Orion Corporation             | 75               | J45-J45     |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog   | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 50               |             |               |        |           |            |  |
| 1124042         | teofülliin, 300mg                                  | R03DA04  | RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK                          | Orion Corporation             | 75               | J45-J45     |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog   | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 50               |             |               |        |           |            |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                 | Soodus-tus % | Diagnoos                                   | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1158757     | terbinafiin, 250mg            | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK         | Sandoz Pharmaceuticals d.d.     | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1176319     | terbinafiin, 250mg            | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK                | Actavis Group PTC ehf           | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1176353     | terbinafiin, 250mg            | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 56TK                | Actavis Group PTC ehf           | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1245406     | terbinafiin, 250mg            | D01BA02  | TERBINAFINE OLAINFARM 250MG, tablett, 28TK       | JSC Olainfarm                   | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1681501     | terbinafiin, 250mg            | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK                | First Pharma OÜ                 | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1624092     | teriflunomiid, 14mg           | L04AA31  | AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK  | Sanofi-Aventis Groupe           | 100          | G35-G35                                    | Neuroloog                 | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva hulgiskleroosi raviks |
| 1022623     | testosteroon, 250mg 1ml       | G03BA03  | SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK                    | Aspen Pharma Trading Limited    | 100          | C00-D48                                    | Hematoloog, Onkoloog      |        |           |            |  |
|             |                               |          |  |                                 | 100          | E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98 | Günekoloog, Endokrinoloog |        |           |            |  |
|             |                               |          |  |                                 | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1169445     | testosteroon, 250mg 1ml       | G03BA03  | NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK                      | Bayer AG                        | 100          | C00-D48                                    | Hematoloog, Onkoloog      |        |           |            |  |
|             |                               |          |  |                                 | 100          | E29.1-E29.1, E89.5-E89.5, E23-E23, Q98-Q98 | Endokrinoloog, Günekoloog |        |           |            |  |
|             |                               |          |  |                                 | 50           |  |                           |        |           |            |  |
| 1343898     | tetrabenasiin, 25mg           | N07XX06  | TETMODIS, tablett, 112TK                         | AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH | 100          | G10-G10                                    | Neuroloog                 | esmane |           |            | hüperkineetiliste motoorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks   |
| 1436835     | tianeptiin, 12,5mg            | N06AX14  | SALYMBRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d.     | 50           |  |                           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1436846         | tianeptiin, 12,5mg                     | N06AX14  | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK               | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.         | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
| 1506585         | tikagreloor, 90mg                      | B01AC24  | BRILIQUE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK               | AstraZeneca AB                         | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25.2-I25.2 | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | müokardiinfarkti või<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt<br>kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel |
|                 |  |          |  |  | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
| 1038956         | timolool, 1mg 1g                       | S01ED01  | TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK   | Santen Oy                              | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1252976         | timolool+bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | GANFORT, silmatilgad, lahus,<br>3ml 1TK                              | Allergan<br>Pharmaceuticals<br>Ireland | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1720134         | timolool+bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | BIMATOPROST/TIMOLOL<br>TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml<br>1TK          | Teva B.V.                              | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1720145         | timolool+bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | BIMATOPROST/TIMOLOL<br>TEVA, silmatilgad, lahus, 3ml<br>3TK          | Teva B.V.                              | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
| 1720178         | timolool+bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | BIMATOPROST/TIMOLOL<br>MYLAN, silmatilgad, lahus,<br>3ml 1TK         | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited    | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
| 1801561         | timolool+bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | BIMATOPROST/TIMOLOL<br>ZENTIVA, silmatilgad, lahus,<br>3ml 1TK       | Zentiva k.s.                           | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1392207         | timolool+brinsolamiid,<br>5mg+10mg 1ml | S01ED83  | AZARGA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                         | Novartis Europharm<br>Limited          | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1799208         | timolool+brinsolamiid,<br>5mg+10mg 1ml | S01ED83  | BRINZOLAMIDE/TIMOLOL<br>ACCORD, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | Accord Healthcare<br>B.V.              | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1039799         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml  | S01ED80  | COSOPT, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                               | Santen Oy                              | 100              | H40-H42                          | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |  | 50               |                                  |                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1420243         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml  | S01ED80  | DORZOLAMIDE/TIMOLOL<br>ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK              | SIA Elvim                        | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
| 1755503         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml  | S01ED80  | VIZIDOR DUO, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                               | Bausch Health Ireland<br>Limited | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
| 1088254         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml | S01ED84  | XALACOM, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                                 | Upjohn EESV                      | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1445161         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml | S01ED84  | LATIRA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                                  | Ratiopharm GmbH                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1445172         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml | S01ED84  | LATIRA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 3TK                                  | Ratiopharm GmbH                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1791255         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml | S01ED84  | LATANOPROST/TIMOLOL<br>ELVIM, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK            | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1618141         | timolool+tafluprost,<br>5mg+15mcg 1ml  | S01ED85  | TAPTIQOM, silmatilgad, lahus<br>üheannuselises konteineris,<br>0.3ml 30TK | Santen Oy                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui ravi jätkamine<br>teiste<br>glaukoomiravimitega<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud<br>bensalkooniumkloriidil<br>e tekkinud tõendatud<br>ülitundlikkuse või<br>olulise toksilise toime<br>tõttu silma eesmisele<br>osale ning<br>monoteraapia<br>säilitusaine vaba<br>prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1243763         | timolool+travoprost,<br>5mg+40mcg 1ml  | S01ED81  | DUOTRAV, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                                 | Novartis Europharm<br>Limited    | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
| 1716522         | timolool+travoprost,<br>5mg+40mcg 1ml  | S01ED81  | TRAVOPROST/TIMOLOL<br>STADA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK             | Stada Arzneimittel AG            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                         | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|------------------------------------|----------|---|---|--------------|------------------|------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1716656     | timolool+travoprost, 5mg+40mcg 1ml | S01ED81  | TRAVOPROST/TIMOLOL MYLAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Mylan Pharmaceuticals Limited           | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 100          | H40-H42          | Oftalmoloog            | esmane |           |            |  |
| 1004375     | tioguaniiin, 40mg                  | L01BB03  | LANVIS, tablett, 25TK                                   | Aspen Pharma Trading Limited            | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
| 1111341     | tiokthape, 600mg                   | A16AX01  | THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Meda Pharma GmbH & Co. KG               | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
| 1303276     | tiokthape, 600mg                   | A16AX01  | THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Wörwag Pharma GmbH & Co. KG             | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
| 1511301     | tiotroopium, 2,5mcg 1annust        | R03BB04  | SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annust 1TK      | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75           | J43-J44          | Pulmonoloog            | esmane |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
| 1173822     | tisanidiin, 2mg                    | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                 | SIA Novartis Baltics                    | 75           | G82-G82, G81-G81 |                        |        |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
| 1839191     | tisanidiin, 2mg                    | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                 | UAB "Lex ano"                           | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 75           | G82-G82, G81-G81 |                        |        |           |            |  |
| 1865550     | tisanidiin, 2mg                    | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                 | UAB Ideal Trade Links                   | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 75           | G82-G82, G81-G81 |                        |        |           |            |  |
| 1211599     | tisanidiin, 4mg                    | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                 | SIA Novartis Baltics                    | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 75           | G82-G82, G81-G81 |                        |        |           |            |  |
| 1854952     | tisanidiin, 4mg                    | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                 | UAB Ideal Trade Links                   | 75           | G81-G81, G82-G82 |                        |        |           |            |  |
|             |                                    |          |   |   | 50           |                  |                        |        |           |            |  |
| 1553880     | tobramütsiin, 28mg                 | J01GB01  | TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK   | Mylan IRE Healthcare Limited            | 100          | E84-E84          | Pediaater, Pulmonoloog |        |           |            | Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1646827         | tobramütsiin, 300mg<br>5ml          | J01GB01  | TOBRAMYCIN VIA PHARMA,<br>nebuliseeritav lahus, 56TK         | UAB Via Pharma                | 100              | E84-E84                      | Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>põhjustatud kroonilise<br>kopsuinfektsiooni<br>supressiivseks raviks<br>tsüstilise fibroosiga<br>patsientidel |
| 1012543         | tobramütsiin, 3mg 1g                | S01AA12  | TOBREX, silmasalv, 3.5g 1TK                                  | SIA Novartis Baltics          | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 1150120         | tobramütsiin, 3mg 1ml               | S01AA12  | TOBREX 2X, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                    | SIA Novartis Baltics          | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 7000119         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PHLEXY-10 DRINK MIX ,<br>pulber, 20g N30                     | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                               | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 7000131         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMAID (ORANGE<br>FLAVOURED) pulber, pulber,<br>500g N4 | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                               | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 7000142         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMAID<br>(UNFLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4      | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                               | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 7000153         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMUM (ORANGE<br>FLAVOURED) pulber, pulber,<br>500g N4  | SHS International             | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
| 7000164         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMUM<br>(UNFLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4       | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                               | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 7000186         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | DUOCAL Supersoluble ,<br>pulber, 400 g                       | SHS                           | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                               | 50               |                              |                           |        |           |            |  |
| 7002504         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU-EXPRESS, pulber, 25g<br>N30                              | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
| 7002515         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU-GEL, pulber, 20g N30                                     | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |                           |        |           |            |  |
| 7002896         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU ANAMIX INFANT,<br>pulber, 400g                           | SHS International Ltd         | 100              | E70.1-E70.1, E70.0-<br>E70.0 |                           |        |           |            |  |
| 7017599         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | COMIDA PKU B Formula<br>Orange, pulber, 500g N1              | UAB Pharm House               | 100              | E70.1-E70.1, E70.0-<br>E70.0 |                           |        |           |            |  |
| 7017982         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | Milupa PKU 2-mix , pulber,<br>400g x 2                       | Nutricia Cuijk bv             | 100              | E70.0-E70.0, E70.1-<br>E70.1 |                           |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 7015777         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 10, suukaudne lahus,<br>62,5ml N60   | SHS International Ltd         | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7015766         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 20, suukaudne lahus,<br>125ml N30  | SHS International Ltd         | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7004922         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Squeezie, suukaudne<br>pasta, 85 g manustamisvalmis<br>toitainesegu kotikeses, ühes<br>karbis on 30 kotikest (2550 g) | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7017577         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | COMIDA PKU A Formula,<br>pulber, 400g N1  | UAB Pharm House               | 100              | E70.1-E70.1, E70.0-<br>E70.0 |           |        |           |            |   |
| 7015744         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 20, suukaudne lahus,<br>125ml N30   | SHS International Ltd         | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7015755         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 10, suukaudne lahus,<br>62,5ml N60  | SHS International Ltd         | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7017588         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | COMIDA PKU B Formula,<br>pulber, 500g N1  | UAB Pharm House               | 100              | E70.1-E70.1, E70.0-<br>E70.0 |           |        |           |            |   |
| 1371248         | tokofersolaan, 50mg<br>1ml          | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus,<br>60ml 1TK  | Recordati Rare<br>Diseases    | 100              | E84-E84, Q44-Q44             | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise<br>kolestaasi raviks kuni<br>18-aastastele<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri ühise)<br>otsuse alusel |
| 1430086         | tokofersolaan, 50mg<br>1ml          | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus,<br>20ml 1TK  | Recordati Rare<br>Diseases    | 100              | E84-E84, Q44-Q44             | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise<br>kolestaasi raviks kuni<br>18-aastastele<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri ühise)<br>otsuse alusel |
| 1284498         | tolterodiin, 2mg                    | G04BD07  | UROFLOW 2 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Zentiva k.s.                  | 50               |                              |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1795877         | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | UROFLOW 2 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | First Pharma OÜ            | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1503762         | tolterodiin, 4mg                 | G04BD07  | UROFLOW 4MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.               | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1076778         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
| 1309878         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK          | Orion Corporation          | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1456488         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ELVIM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK          | SIA Elvim                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1076846         | topiramaat, 200mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
| 1076688         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1309812         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK          | Orion Corporation          | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1456444         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ELVIM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK          | SIA Elvim                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
| 1076734         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | UAB "JOHNSON &<br>JOHNSON" | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1309834         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK          | Orion Corporation          | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |          |           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1456466         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ELVIM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK         | SIA Elvim   | 75               | G43-G43  |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1158050         | torasemiid, 100mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100<br>MG, tablett, 30TK                              | Hexal AG  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1771332         | torasemiid, 100mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100<br>MG, tablett, 30TK                              | First Pharma OÜ   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1843769         | torasemiid, 100mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100<br>MG, tablett, 30TK                              | UAB "Lex ano"   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1852512         | torasemiid, 100mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100<br>MG, tablett, 30TK                              | UAB Ideal Trade Links                                   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1032332         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK  | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1166015         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE TEVA, tablett,<br>30TK                                      | Teva Pharma B.V.  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1422717         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK                                     | Hexal AG  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1770892         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK                                     | First Pharma OÜ   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1032321         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TRIFAS 200 MG, tablett,<br>30TK  | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1158106         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 200<br>MG, tablett, 30TK                              | Hexal AG  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1854985         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 200<br>MG, tablett, 30TK                              | UAB Ideal Trade Links                                   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1861927         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 200<br>MG, tablett, 30TK                              | First Pharma OÜ   | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1165957         | torasemiid, 5mg                  | C03CA04  | TORASEMIDE TEVA, tablett,<br>30TK                                      | Teva Pharma B.V.  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1043525         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL KRKA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                               | 50               |          |           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1075665         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER<br>100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1174621         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | MABRON RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                | Medochemie Ltd            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085857         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER<br>150MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1174632         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | MABRON RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                | Medochemie Ltd            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1759743         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | OLTERON, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085879         | tramadool, 200mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER<br>200 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1174643         | tramadool, 200mg                 | N02AX02  | MABRON RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                | Medochemie Ltd            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1759822         | tramadool, 200mg                 | N02AX02  | OLTERON, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1015580         | tramadool, 50mg                  | N02AX02  | TRAMADOL KRKA,<br>kõvakapsel, 20TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032679         | tramadool, 50mg                  | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 20TK                      | G.L. Pharma GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1656952         | trametiniib, 0,5mg               | L01EE01  | MEKINIST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C43-C43          | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2<br>onkoloogi) otsuse<br>alusel BRAF V600<br>mutatsiooniga<br>kaugelearenenud<br>mitteresetseeritava või<br>metastaatilise (IIIc-IV<br>st) melanoomi raviks<br>juhul, kui patsiendi<br>üldseisund ECOG<br>kriteeriumide järgi on<br>0-1 ja 3-kuulise<br>intervalliga hinnatuna<br>püsib haigus vähemalt<br>stabiilsena (KT- või/ja<br>muu asjakohase<br>uuringu alusel<br>hinnatuna haiguse<br>progressiooni ei esine) |
| 1656985         | trametiniib, 2mg                 | L01EE01  | MEKINIST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C43-C43          | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2<br>onkoloogi) otsuse<br>alusel BRAF V600<br>mutatsiooniga<br>kaugelearenenud<br>mitteresetseeritava või<br>metastaatilise (IIIc-IV<br>st) melanoomi raviks<br>juhul, kui patsiendi<br>üldseisund ECOG<br>kriteeriumide järgi on<br>0-1 ja 3-kuulise<br>intervalliga hinnatuna<br>püsib haigus vähemalt<br>stabiilsena (KT- või/ja<br>muu asjakohase<br>uuringu alusel<br>hinnatuna haiguse<br>progressiooni ei esine) |
| 1074765         | trandolapriil, 2mg               | C09AA10  | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK                               | Mylan Healthcare SIA          | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|----------------------------------|------------------|------------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1327520         | trandolapriil, 4mg                      | C09AA10  | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK  | Mylan Healthcare SIA             | 50               |                  |  |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |  |
| 1233290         | trandolapriil+verapamiil<br>, 2mg+180mg | C09BB10  | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Mylan Healthcare SIA             | 50               |                  |  |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |  |
| 1377660         | trandolapriil+verapamiil<br>, 4mg+240mg | C09BB10  | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Mylan Healthcare SIA             | 50               |                  |  |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |  |        |           |            |  |
| 1083316         | traneksaamhape,<br>500mg                | B02AA02  | CYKLOKAPRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK       | Meda AB                          | 50               |                  |  |        |           |            |  |
| 1130454         | travoprost, 40mcg 1ml                   | S01EE04  | TRAVATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                      | Novartis Europharm<br>Limited    | 50               |                  |  |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                              | esmane |           |            |  |
| 1608027         | travoprost, 40mcg 1ml                   | S01EE04  | TRAVOPROST ZENTIVA,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK            | Zentiva k.s.                     | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                              | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 50               |                  |  |        |           |            |  |
| 1798050         | travoprost, 40mcg 1ml                   | S01EE04  | TRAVOPROST ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK              | SIA Elvim                        | 50               |                  |  |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                              | esmane |           |            |  |
| 1799433         | travoprost, 40mcg 1ml                   | S01EE04  | VIZITRAV, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                      | Bausch + Lomb Ireland<br>Limited | 50               |                  |  |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                              | esmane |           |            |  |
| 1186040         | treprostiniil, 1mg 1ml                  | B01AC21  | REMODULIN, infusioonilahus,<br>20ml 1TK                         | Ferrer Internacional<br>S.A.     | 100              | I27.0-I27.0      | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III või IV kl<br>idiopaatilise või päriliku<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>konsiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel patsiendile,<br>kellel muud<br>ravivõimalused on<br>ebapiisavad või<br>ravimvormi tõttu<br>sobimatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1186062         | treprostiniil, 2,5mg 1ml         | B01AC21  | REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK | Ferrer Internacional S.A. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater |        |           |            | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud |
| 1186073         | treprostiniil, 5mg 1ml           | B01AC21  | REMODULIN, infusioonilahus, 20ml 1TK | Ferrer Internacional S.A. | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pulmonoloog, Pediaater |        |           |            | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud |
| 1008425         | triamtsinoloon, 40mg 1ml         | H02AB08  | KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK   | KRKA, d.d., Novo mesto    | 50               |             |                                    |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1716319         | trifluridiin+tipiratsiil,<br>15mg+6,14mg | L01BC83  | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20  | Onkoloog |        |           |            | III ravireas kuni<br>haiguse<br>progressioonini<br>metastaatilise<br>kolorektaalvähiga<br>täiskasvanud<br>patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud<br>olemasolevate<br>ravimeetoditega<br>sealhulgas<br>fluoropürimidiini,<br>oksaliplatiini ja<br>irinotekaanipõhiste<br>kemoteraapiatega,<br>anti-VEGF raviga või<br>kellele need<br>ravimeetodid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |
| 1716331         | trifluridiin+tipiratsiil,<br>15mg+6,14mg | L01BC83  | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20  | Onkoloog |        |           |            | III ravireas kuni<br>haiguse<br>progressioonini<br>metastaatilise<br>kolorektaalvähiga<br>täiskasvanud<br>patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud<br>olemasolevate<br>ravimeetoditega<br>sealhulgas<br>fluoropürimidiini,<br>oksaliplatiini ja<br>irinotekaanipõhiste<br>kemoteraapiatega,<br>anti-VEGF raviga või<br>kellele need<br>ravimeetodid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1716342         | trifluridiin+tipiratsiil,<br>20mg+8,19mg | L01BC83  | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20  | Onkoloog |        |           |            | III ravireas kuni<br>haiguse<br>progressioonini<br>metastaatilise<br>kolorektaalvähiga<br>täiskasvanud<br>patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud<br>olemasolevate<br>ravimeetoditega<br>sealhulgas<br>fluoropürimidiini,<br>oksaliplatiini ja<br>irinotekaanipõhiste<br>kemoteraapiatega,<br>anti-VEGF raviga või<br>kellele need<br>ravimeetodid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |
| 1716364         | trifluridiin+tipiratsiil,<br>20mg+8,19mg | L01BC83  | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20  | Onkoloog |        |           |            | III ravireas kuni<br>haiguse<br>progressioonini<br>metastaatilise<br>kolorektaalvähiga<br>täiskasvanud<br>patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud<br>olemasolevate<br>ravimeetoditega<br>sealhulgas<br>fluoropürimidiini,<br>oksaliplatiini ja<br>irinotekaanipõhiste<br>kemoteraapiatega,<br>anti-VEGF raviga või<br>kellele need<br>ravimeetodid on<br>vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014422         | triheksüfenidüül, 2mg            | N04AA01  | CYCLODOL, tablett, 50TK  | AS Grindeks                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1109641         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | PREDUCTAL MR, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK               | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1293162         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | TRIMETAZIDINE TEVA<br>35MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK  | Teva Pharma B.V.            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1401411         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | TRIMETAZIDINE<br>RIVOPHARM, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Rivopharm Limited           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1016312         | trimetoprim, 100mg               | J01EA01  | TRIMETOP 100MG, tablett,<br>30TK   | Vitabalans Oy               | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1400421         | triptoreliin, 11,25mg            | L02AE04  | DIPHERELINE 11,25 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma    | 75               | E22.8-E22.8                  | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C61-C61                      | Onkoloog, Uroloog           |        |           |            | lokaalse või lokaalselt<br>levinud ja kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kokkuvõttes<br>kuni 2 aasta vältel |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |                              |                             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | N80-N80                      | Günekoloog                  |        |           |            | III-IV astme<br>endometrioosi<br>põdevatele<br>patsientidele  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                             |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1822968         | triptoreliin, 11,25mg            | L02AE04  | DIPHERELINE 11,25 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | First Pharma OÜ | 75               | N80-N80                      | Günekoloog                  |        |           |            | III-IV astme<br>endometrioosi<br>põdevatele<br>patsientidele   |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |                              |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                             |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | E22.8-E22.8                  | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C61-C61                      | Onkoloog, Uroloog           |        |           |            | lokaalse või lokaalselt<br>levinud kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kuni 2 aasta<br>vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1818604         | triptoreliin, 22,5mg             | L02AE04  | DIPHERELINE 22,5 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma    | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | C61-C61     | Uroloog, Onkoloog           |        |           |            | lokaalse või lokaalselt<br>levinud kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kuni 2 aasta<br>vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1040397         | triptoreliin, 3,75mg             | L02AE04  | DIPHERELINE 3,75 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma                     | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-<br>Z31.9 |                             |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise<br>ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste<br>osutamise<br>ettevalmistuseks  |
|                 |                                  |          |   |                                  | 75               | E22.8-E22.8                  | Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                  | 50               |                              |                             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                  | 100              | C61-C61                      | Onkoloog, Uroloog           |        |           |            | lokaalse või lokaalselt<br>levinud ja kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kokkuvõttes<br>kuni 2 aasta vältel |
|                 |                                  |          |   |                                  | 75               | N80-N80                      | Günekoloog                  |        |           |            | III-IV astme<br>endometrioosi<br>põdevatele<br>patsientidele  |
| 1007963         | tromantadiin, 1%                 | D06BB02  | VIRU-MERZ SEROL GEEL,<br>geel, 2g 1TK   | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH     | 50               |                              |                             |        |           |            |   |
| 1090189         | tropiumkloriid, 15mg             | G04BD09  | SPASMED 15, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Pro.med.cs Praha a.s.            | 50               |                              |                             |        |           |            |   |
| 1025064         | tsefadroksiil, 1g                | J01DB05  | DURACEF, lahustuv tablett,<br>10TK  | Bausch Health Ireland<br>Limited | 50               |                              |                             |        |           |            |   |
| 1027134         | tsefadroksiil, 500mg             | J01DB05  | DURACEF, kõvakapsel, 12TK   | Bausch Health Ireland<br>Limited | 50               |                              |                             |        |           |            |   |
| 1067318         | tsefadroksiil, 50mg 1ml          | J01DB05  | DURACEF, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 100ml<br>1TK   | Bausch Health Ireland<br>Limited | 50               |                              |                             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1068320         | tsefprosiil, 250mg               | J01DC10  | CEFZIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068375         | tsefprosiil, 500mg               | J01DC10  | CEFZIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1028506         | tsefprosiil, 50mg 1ml            | J01DC10  | CEFZIL, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 60ml<br>1TK     | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007110         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1438387         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | Medochemie Limited                    | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1659922         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1841307         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | UAB Ideal Trade Links                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1137350         | tsefuroksiim, 25mg 1ml           | J01DC02  | ZINNAT, suukaudse<br>suspensiooni graanulid,<br>100ml 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007143         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1287840         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK      | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1438398         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | Medochemie Limited                    | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1580947         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK     | Medochemie Limited                    | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1659988         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1660003         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1841318         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK            | UAB Ideal Trade Links         | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1073641         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel,<br>20TK                                   | Upjohn EESV                   | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1596719         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1596797         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto     | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1815443         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK  | First Pharma OÜ               | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1861365         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK  | UAB Ideal Trade Links         | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1684560         | tseritiniib, 150mg               | L01ED02  | ZYKADIA, kõvakapsel, 150TK                                      | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |           |            | anaplastilise<br>lümfoomkineaaspositiivs<br>e kaugelearenenud<br>varem ravimata<br>mitteväikerakk-<br>kopsuvähi raviks heas<br>üldseisundis (ECOG 0-<br>2) täiskasvanud<br>patsientidele |
| 1077836         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | ZYRTEC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | UCB Pharma Oy<br>Finland      | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1098918         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETIRIZIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf         | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1430750         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETRIX 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Vitabalans Oy                 | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1430772         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETRIX 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK     | Vitabalans Oy                 | 50               |          |          |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1022869         | tsetirisiin, 10mg 1ml            | R06AE07  | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK              | UCB Pharma Oy<br>Finland | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
| 1728637         | tsetirisiin, 10mg 1ml            | R06AE07  | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK              | Globalex Pharma OÜ       | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
| 1826580         | tsetirisiin, 10mg 1ml            | R06AE07  | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK              | UAB "Lex ano"            | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
| 1043356         | tsetroreliks, 0,25mg             | H01CC02  | CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK           | Merck Europe B.V.        | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                      |        |           | 41,00      | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks   |
| 1667370         | tsinakaltseet, 30mg              | H05BX01  | CINACALCET TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva B.V.                | 100              | N18-N18                  | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                          |                      |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1667538         | tsinakaltseet, 30mg              | H05BX01  | CINACALCET ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |          |                      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | N18-N18  | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärgkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1815656         | tsinakaltseet, 30mg              | H05BX01  | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18  | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärgkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                      |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1667572         | tsinakaltseet, 60mg              | H05BX01  | CINACALCET ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |          |                      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | N18-N18  | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärgkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1815689         | tsinakaltseet, 60mg              | H05BX01  | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärgkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |                      |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1667606         | tsinakaltseet, 90mg              | H05BX01  | CINACALCET ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.   | 50               |             |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | N18-N18     | Nefroloog, Pediaater           |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärgkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1815713         | tsinakaltseet, 90mg              | H05BX01  | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18     | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärgkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |             |                                |        |           |            |  |
| 1196388         | tsink, 25mg                      | A16AX05  | WILZIN, kõvakapsel, 250TK  | Recordati Rare<br>Diseases  | 100              | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1196377         | tsink, 50mg                      | A16AX05  | WILZIN, kõvakapsel, 250TK  | Recordati Rare<br>Diseases  | 100              | E83.0-E83.0 | Neuroloog,<br>Gastroenteroloog | esmane |           |            |  |
| 1005488         | tsiprofloksatsiin,<br>250mg      | J01MA02  | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | D60-D64     | Pediaater,<br>Hematoloog       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |             |                                |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042827         | tsiprofloksatsiin, 3mg<br>1ml    | S01AE03  | CILOXAN, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                                     | SIA Novartis Baltics           | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1005545         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                      | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | D60-D64                      | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | E84-E84                      | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1223929         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPROFLOXACIN SANDOZ<br>500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | D60-D64                      | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | E84-E84                      | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1500994         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPROFLOXACIN<br>OLAINFARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK    | JSC Olainfarm                  | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | D60-D64                      | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | E84-E84                      | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1218361         | tsitalopraam, 10mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK        | Teva Pharma B.V.               | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1083563         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALEC 20, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Zentiva k.s.                   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1112937         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CIRAL 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
| 1185409         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM ACTAVIS 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Actavis Group PTC ehf          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1218462         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 20MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK        | Teva Pharma B.V.               | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1443631         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Vitabalans Oy                  | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                               |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|--|
| 1218563         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 40MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3              | Psühhiaater                                     | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |   |        |           |            |  |
| 1443697         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04  | CITALOPRAM VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | Vitabalans Oy                | 50               |   |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3              | Psühhiaater                                     | esmane |           |            |  |
| 1021790         | tsüklofosfamiid, 50mg            | L01AA01  | ENDOXAN, kaetud tablett,<br>50TK                                     | Baxter Oncology<br>GmbH      | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog                         |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | N00-N08                                   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |  |
| 1123760         | tsüklopentolaat, 10mg<br>1ml     | S01FA04  | CYCLOGYL, silmatilgad,<br>lahus, 15ml 1TK                            | Alcon Farmaceutika<br>d.o.o. | 50               |   |   |        |           |            | silmahaiguste<br>ambulaatorseks raviks |
| 1008559         | tsüklosporiin, 100mg             | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK                               | SIA Novartis Baltics         | 75               | L50.1-L50.5, L50.8-<br>L50.9              |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | L20-L20                                   | Dermatoveneroloog                               |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35             | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | D46-D46                                   | Hematoloog                                      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | Z94-Z94, T86-T86                          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | L43-L43                                   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | L40-L40                                   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog,<br>Reumatoloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | D60-D64                                   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | N00-N08                                   | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1098840         | tsüklosporiin, 100mg             | L04AD01  | EQUORAL 100 MG,<br>pehmekapsel, 50TK | Teva B.V.       | 75               | L20-L20                       | Dermatoveneroloog                               |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 100              | D60-D64                       | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 75               | N00-N08                       | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 100              | D46-D46                       | Hematoloog                                      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 50               |                               |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 75               | L40-L40                       | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 75               | L50.1-L50.5, L50.8-<br>L50.9  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86              |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                      |                 | 75               | L43-L43                       | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1683097         | tsüklosporiin, 1mg 1ml           | S01XA18  | IKERVIS, silmatilgad,<br>emulsioon, 0.3ml 30TK | Santen Oy       | 75               | M35.0-M35.0,<br>H19.3-H19.3, H04.1-<br>H04.1, H11.1-H11.1 | Oftalmoloog |        |           |            | <p>raske kuiva silma sündroomiga patsientidele, kellel on vaatamata vähemalt kolm kuud kestnud ravile niisutavate tilkadega punktkeratopaatia või konjunktivi punktitaoline värvumine.</p> <p>Ravivastust hinnatakse peale kolme ravikuud alates esimese soodusretsepti kirjutamist ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult sarvkesta ja/või konjunktivi värvumine ravi mõjul oluliselt paranenud või subjektiivsed kaebused oluliselt vähenenud.</p> |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------|-------------------------------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1008526         | tsüklosporiin, 25mg              | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | SIA Novartis Baltics | 75               | L20-L20                       | Dermatoveneroloog                               |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 50               |                               |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L40-L40                       | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | D60-D64                       | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | D46-D46                       | Hematoloog                                      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L43-L43                       | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | Z94-Z94, T86-T86              |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | N00-N08                       | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | M05-M08, M30-<br>M35, M45-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L50.1-L50.5, L50.8-<br>L50.9  |   |        |           |            |          |
| 1008548         | tsüklosporiin, 50mg              | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | SIA Novartis Baltics | 100              | D60-D64                       | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | N00-N08                       | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L20-L20                       | Dermatoveneroloog                               |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L50.8-L50.9, L50.1-<br>L50.5  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L40-L40                       | Reumatoloog,<br>Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 50               |                               |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | L43-L43                       | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | D46-D46                       | Hematoloog                                      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | Z94-Z94, T86-T86              |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | M45-M46, M30-<br>M35, M05-M08 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1064124         | tsüproteroon, 50mg                  | G03HA01  | ANDROCUR, tablett, 50TK                                       | Bayer AG                          | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
|                 |                                     |          |   |                                   | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1014488         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01  | DIANE, kaetud tablett, 21TK                                   | Bayer AG                          | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1818288         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01  | DIANE, kaetud tablett, 21TK                                   | UAB Ideal Trade Links             | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1820179         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01  | DIANE, kaetud tablett, 21TK                                   | UAB "Lex ano"                     | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1557435         | ulipristaal, 5mg                    | G03XB02  | ESMYA, tablett, 28TK  | Gedeon Richter Plc.               | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                                   | 75               | D25-D25  | Günekoloog        |        |           |            | patsientidele, kes soovivad rasestuda või kellele on kirurgiline ravi vastunäidustatud ning kirurgilise ravi eelselt fibroomi mõõtmete vähendamiseks  |
| 1646940         | umeclidiniium, 55mcg 1annust        | R03BB07  | INCRUSE ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog       | esmane |           |            |   |
|                 |                                     |          |   |                                   | 50               |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1016985         | ursodeoksükoolhape,<br>250mg     | A05AA02  | URSOSAN, kõvakapsel, 50TK                 | Pro.med.cs Praha a.s.               | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 75               | K74-K74, K73-K73 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog  | esmane |           |            |  |
| 1709401         | ursodeoksükoolhape,<br>250mg     | A05AA02  | URSOGRIX, kõvakapsel,<br>50TK             | AS Grindeks                         | 75               | K74-K74, K73-K73 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog  | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
| 1462395         | ustekinumab, 90mg<br>1ml         | L04AC05  | STELARA, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 100              | L40-L40          | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            | eksperikomisjoni<br>otsusel patsientidele,<br>kes vastavad Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus L40 diagnoosi<br>korral kehtivatele TNF-<br>alfa inhibiitori<br>hüvitamistingimustele<br>ning kes on saanud<br>haigekassa rahastusel<br>ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust<br>modifitseeriva<br>toimeainega, mis on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või<br>kellele on TNF-alfa<br>inhibiitori kasutamine<br>vastunäidustatud.<br>Lisaks laieneb<br>soodustus<br>patsientidele, kelle ravi<br>ustekinumabiga on<br>haigekassa rahastusel<br>alustatud enne<br>01.01.2022 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1462407         | ustekinumab, 90mg<br>1ml         | L04AC05  | STELARA, süstelahus süstlis,<br>1ml 1TK                                      | Janssen-Cilag<br>International N.V.  | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            | ekspertkomisjoni<br>otsusel patsientidele,<br>kes vastavad Eesti<br>Haigekassa ravimite<br>loetelus L40 diagnoosi<br>korral kehtivatele TNF-<br>alfa inhibiitori<br>hüvitamistingimustele<br>ning kes on saanud<br>haigekassa rahastusel<br>ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust<br>modifitseeriva<br>toimeainega, mis on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või<br>kellele on TNF-alfa<br>inhibiitori kasutamine<br>vastunäidustatud.<br>Lisaks laieneb<br>soodustus<br>patsientidele, kelle ravi<br>ustekinumabiga on<br>haigekassa rahastusel<br>alustatud enne<br>01.01.2022 |
| 1301094         | valatsikloviir, 1000mg           | J05AB11  | VALACICLOVIR ACTAVIS<br>1000MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Actavis Group PTC ehf                | 50               |          |                                 |        |           |            |  |
| 1016301         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                        | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |                                 |        |           |            |  |
| 1300936         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALACICLOVIR ACTAVIS<br>500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK  | Actavis Group PTC ehf                | 50               |          |                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1369593         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALACICLOVIR ELVIM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK                 | SIA Elvim                    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1831003         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                            | UAB Ideal Trade Links        | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1043592         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | CONVULEX 150 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK                      | G.L. Pharma GmbH             | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1076419         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108246         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | ORFIRIL 150,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK         | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1043604         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | CONVULEX 300 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma GmbH             | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1077308         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 300 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1086555         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 300<br>mg, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Sanofi-Aventis Groupe        | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108257         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ORFIRIL 300,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK                               | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1076341         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 500 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1086544         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 500<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK            | Sanofi-Aventis Groupe          | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1224672         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 500MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1836109         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 500<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | UAB Ideal Trade Links | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | F11.4-F11.7, F60.3-<br>F60.3, F32.2-F32.3,<br>F15.4-F15.7, F13.4-<br>F13.7, F12.4-F12.7,<br>F20-F29, F16.4-<br>F16.7, F00-F09,<br>F70-F79, F10.4-<br>F10.7, F19.4-F19.7,<br>F30-F31, F18.4-<br>F18.7, F33.2-F33.3,<br>F17.4-F17.7, F14.4-<br>F14.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1043581         | valproehape, 50mg<br>1ml         | N03AG01  | CONVULEX, siirup, 100ml<br>1TK  | G.L. Pharma GmbH      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108268         | valproehape, 600mg               | N03AG01  | ORFIRIL 600,<br>gastroresistentne tablett,<br>50TK     | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1025536         | valproehape, 60mg<br>1ml         | N03AG01  | ORFIRIL SAFT, suukaudne<br>lahus, 250ml 1TK            | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1092844         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | SIA Novartis Baltics         | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1250378         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1250389         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1434495         | valsartaan, 160mg                              | C09CA03  | VALZAP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Zentiva k.s.              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1515057         | valsartaan, 160mg                              | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Medochemie Limited        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1515079         | valsartaan, 160mg                              | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Medochemie Limited        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1421233         | valsartaan, 320mg                              | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1250323         | valsartaan, 80mg                               | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1434473         | valsartaan, 80mg                               | C09CA03  | VALZAP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Zentiva k.s.              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1514854         | valsartaan, 80mg                               | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Medochemie Limited        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1514876         | valsartaan, 80mg                               | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Medochemie Limited        | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1675324         | valsartaan+amlodipiin,<br>160mg+10mg           | C09DB01  | WAMLOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |
| 1675234         | valsartaan+amlodipiin,<br>160mg+5mg            | C09DB01  | WAMLOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |
| 1324314         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |
| 1434518         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | VALZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Zentiva k.s.              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1324235         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+25mg   | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1457557         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 320mg+12,5mg | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1324156         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1434530         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | VALZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Zentiva k.s.              | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                           | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1704181         | valsartaan+sakubitriil,<br>102,8mg+97,2mg | C09DX04  | ENTRESTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Novartis Europharm<br>Limited | 75               | I50-I50  | Kardioloog, Sisearst | esmane |           |            | täiskasvanud<br>patsientidele, kes<br>vastavad kõigile<br>järgnevatele<br>kriteeriumitele: kellel<br>on vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF≤35%), kes<br>kuuluvad NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea, keda on eelnevalt<br>vähemalt 3 kuud<br>püsivalt ravitud<br>Euroopa ravijuhendi<br>järgse AKE-inhibiitori<br>või ARB<br>eesmärkannusega<br>(selle dokumenteeritud<br>talumatuse korral<br>vähemalt keskmise<br>annusega või<br>maksimaalselt talutava<br>annusega),<br>kombinatsioonis<br>maksimaalses<br>talutavas annuses<br>beetablokaatoriga ning<br>kellel kaksikravile<br>mineralokortikoidiretse<br>ptori antagonisti<br>lisamise järgselt<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1704147         | valsartaan+sakubitriil,<br>25,7mg+24,3mg | C09DX04  | ENTRESTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novartis Europharm<br>Limited | 75               | I50-I50  | Kardioloog, Sisearst | esmane |           |            | täiskasvanud<br>patsientidele, kes<br>vastavad kõigile<br>järgnevatele<br>kriteeriumitele: kellel<br>on vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=35%), kes<br>kuuluvad NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea, keda on eelnevalt<br>vähemalt 3 kuud<br>püsivalt ravitud<br>Euroopa ravijuhendi<br>järgse AKE-inhibiitori<br>või ARB<br>eesmärgannusega<br>(selle dokumenteeritud<br>talumatuse korral<br>vähemalt keskmise<br>annusega või<br>maksimaalselt talutava<br>annusega),<br>kombinatsioonis<br>maksimaalses<br>talutavas annuses<br>beetablokaatoriga ning<br>kellel kaksikravile<br>mineralokortikoidiretse<br>ptori antagonisti<br>lisamise järgselt<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1704169         | valsartaan+sakubitriil,<br>51,4mg+48,6mg | C09DX04  | ENTRESTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Novartis Europharm<br>Limited | 75               | I50-I50  | Sisearst, Kardioloog | esmane |           |            | täiskasvanud<br>patsientidele, kes<br>vastavad kõigile<br>järgnevatele<br>kriteeriumitele: kellel<br>on vähenenud vasaku<br>vatsakese<br>väljutusfraktsioon<br>(LVEF<=35%), kes<br>kuuluvad NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on<br>hea, keda on eelnevalt<br>vähemalt 3 kuud<br>püsivalt ravitud<br>Euroopa ravijuhendi<br>järgse AKE-inhibiitori<br>või ARB<br>eesmärkannusega<br>(selle dokumenteeritud<br>talumatuse korral<br>vähemalt keskmise<br>annusega või<br>maksimaalselt talutava<br>annusega),<br>kombinatsioonis<br>maksimaalses<br>talutavas annuses<br>beetablokaatoriga ning<br>kellel kaksikravile<br>mineralokortikoidiretse<br>ptori antagonisti<br>lisamise järgselt<br>südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt<br>püsivad või süvenevad |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008335         | varfariin, 3mg                   | B01AA03  | MAREVAN, tablett, 100TK          | Orion Corporation     | 100              | I80-I82, Z95.2-<br>Z95.2, I26-I26, T82-<br>T82, I67.6-I67.6,<br>I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 75               | I47-I49   |        |        |           |            |          |
| 1847831         | varfariin, 3mg                   | B01AA03  | MAREVAN, tablett, 100TK          | UAB Ideal Trade Links | 75               | I47-I49   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 100              | I80-I82, Z95.2-<br>Z95.2, I26-I26, T82-<br>T82, I67.6-I67.6,<br>I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1008368         | varfariin, 5mg                   | B01AA03  | MAREVAN FORTE, tablett,<br>100TK | Orion Corporation     | 75               | I47-I49   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 100              | I80-I82, Z95.2-<br>Z95.2, I26-I26, T82-<br>T82, I67.6-I67.6,<br>I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                  |                       | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1734421         | venetoklaks, 100mg               | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |           |            | kombinatsioonis<br>rituksimabiga<br>patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühte ravi.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020 ning<br>kombinatsioonis<br>obinutuzumabiga<br>eelnevalt ravimata<br>patsientidele, kellele<br>ravi fludarabiinil<br>baseeruvate<br>skeemidega on<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2022. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1734432         | venetoklaks, 100mg               | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |           |            | kombinatsioonis<br>rituksimabiga<br>patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühte ravi.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020 ning<br>kombinatsioonis<br>obinutuzumabiga<br>eelnevalt ravimata<br>patsientidele, kellele<br>ravi fludarabiinil<br>baseeruvate<br>skeemidega on<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2022. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1734443         | venetoklaks, 100mg               | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |           |            | kombinatsioonis<br>rituksimabiga<br>patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühte ravi.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020 ning<br>kombinatsioonis<br>obinutuzumabiga<br>eelnevalt ravimata<br>patsientidele, kellele<br>ravi fludarabiinil<br>baseeruvate<br>skeemidega on<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2022. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1734397         | venetoklaks, 10mg                | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |           |            | kombinatsioonis<br>rituksimabiga<br>patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühte ravi.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020 ning<br>kombinatsioonis<br>obinutuzumabiga<br>eelnevalt ravimata<br>patsientidele, kellele<br>ravi fludarabiinil<br>baseeruvate<br>skeemidega on<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2022. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1734410         | venetoklaks, 50mg                | L01XX52  | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 7TK  | AbbVie Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1                  | Hematoloog  |        |           |            | kombinatsioonis<br>rituksimabiga<br>patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud<br>vähemalt ühte ravi.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.07.2020 ning<br>kombinatsioonis<br>obinutuzumabiga<br>eelnevalt ravimata<br>patsientidele, kellele<br>ravi fludarabiinil<br>baseeruvate<br>skeemidega on<br>vastunäidustatud.<br>Soodustus kehtib<br>alates 5. ravinädalast<br>ega laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>venetoklaksiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 01.01.2022. |
| 1232468         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto           | 50               |                              |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1261741         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE<br>XR 150 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |                              |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1306325         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAGAMMA 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1316405         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ARGOFAN 150 SR,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK       | Zentiva k.s.                   | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
| 1435205         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXINE ELVIM,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 28TK | SIA Elvim                      | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1786833         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK           | First Pharma OÜ                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1839607         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK           | UAB Ideal Trade Links          | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1853805         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK           | UAB Ideal Trade Links          | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
| 1232266         | venlafaksiin, 37,5mg             | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |
| 1232367         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1261684         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE<br>XR 75 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd                 | 75               | G43-G43                      |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
| 1306246         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAGAMMA 75 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK                  | Wörwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |                          |        |           |            |          |
| 1316371         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ARGOFAN 75 SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                        | Zentiva k.s.                   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
| 1435182         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXINE ELVIM,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 28TK                 | SIA Elvim                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
| 1839551         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                           | UAB Ideal Trade Links          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
| 1853759         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                           | UAB Ideal Trade Links          | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | G43-G43                      |                          |        |           |            |          |
| 1073157         | verapamiil, 120mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD 120 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK               | Mylan Healthcare SIA           | 75               | I47-I49                      | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13, I15-I15             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
| 1073180         | verapamiil, 240mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK                      | Mylan Healthcare SIA           | 75               | I10-I13, I15-I15             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                              |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49                      | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073405         | verapamiil, 80mg                 | C08DA01  | VERAPAMIL- RATIOPHARM<br>80 MG, õhukese<br>polümeerikatttega tablett,<br>50TK | Ratiopharm GmbH                    | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | I47-I49          | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1552856         | VIII hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD02  | ADVATE, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                 | Takeda Manufacturing<br>Austria AG | 100              | D66-D66          | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            |          |
| 1762499         | VIII hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD02  | ADYNOVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                | Baxalta Innovations<br>GmbH        | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1783100         | VIII hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD02  | JIVI, süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                                   | Bayer AG                           | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1798577         | VIII hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD02  | ESPEROCT, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                               | Novo Nordisk A/S                   | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1799309         | VIII hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD02  | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                | CSL Behring GmbH                   | 100              | D66-D66          | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            |          |
| 1552867         | VIII hüübimisfaktor,<br>1500RÜ   | B02BD02  | ADVATE, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                 | Takeda Manufacturing<br>Austria AG | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1762501         | VIII hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD02  | ADYNOVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                | Baxalta Innovations<br>GmbH        | 100              | D66-D66          | Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            |          |
| 1783111         | VIII hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD02  | JIVI, süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                                   | Bayer AG                           | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1798601         | VIII hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD02  | ESPEROCT, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                               | Novo Nordisk A/S                   | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1799310         | VIII hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD02  | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                | CSL Behring GmbH                   | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1552834         | VIII hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD02  | ADVATE, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                 | Takeda Manufacturing<br>Austria AG | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1799286         | VIII hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD02  | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                | CSL Behring GmbH                   | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1783122         | VIII hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD02  | JIVI, süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK                                   | Bayer AG                           | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1552845         | VIII hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD02  | ADVATE, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                 | Takeda Manufacturing<br>Austria AG | 100              | D66-D66          | Hematoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|---|----------|--|-----------------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1762477     | VIII hüübimisfaktor, 500RÜ                            | B02BD02  | ADYNOVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                  | Baxalta Innovations GmbH          | 100          | D66-D66  | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |   |
| 1783098     | VIII hüübimisfaktor, 500RÜ                            | B02BD02  | JIVI, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                     | Bayer AG                          | 100          | D66-D66  | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |   |
| 1798566     | VIII hüübimisfaktor, 500RÜ                            | B02BD02  | ESPEROCT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                 | Novo Nordisk A/S                  | 100          | D66-D66  | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |   |
| 1799297     | VIII hüübimisfaktor, 500RÜ                            | B02BD02  | BERIATE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK      | CSL Behring GmbH                  | 100          | D66-D66  | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |   |
| 1632361     | vilanterool+flutikasoonf uroaat, 22mcg+184mcg 1annust | R03AK10  | RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 75           | J45-J45  |                       |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 50           |          |                       |        |           |            |   |
| 1632338     | vilanterool+flutikasoonf uroaat, 22mcg+92mcg 1annust  | R03AK10  | RELVAR ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 50           |          |                       |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J45-J45  |                       |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog           | esmane |           |            | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/ $\mu$ L ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasid ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
| 1649224     | vilanterool+umeclidini um, 22mcg+55mcg 1annuses       | R03AL03  | ANORO ELLIPTA, annustatud inhalatsioonipulber, 30annust 1TK  | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 50           |          |                       |        |           |            |   |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J43-J44  | Pulmonoloog           | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1756436         | vilanterool+umekliidiini<br>um+flutikasoonfuroaat,<br>22mcg+55mcg+92mcg<br>1annust | R03AL08  | TRELEGY ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 30annust<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |           |            | C-D staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel<br>eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on<br>>=100 rakku/µL ning<br>IKS/LABA või<br>LAMA/LABA<br>kaksikraviga on<br>esinevad vähemalt 1<br>hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine<br>viimase 12 kuu jooksul<br>või vähemalt 2<br>mõõdukat või<br>raskemat ägenemist<br>viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasisid<br>ravi antibiootikumide<br>või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
| 1316326         | vildagliptiin, 50mg  | A10BH02  | GALVUS, tablett, 60TK  | Novartis Europharm<br>Limited                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombineeritud raviks;<br>kombineeritud ravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |  |          |  |  | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1712438         | vildagliptiin, 50mg              | A10BH02  | SAXOTIN, tablett, 60TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                         |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1714160         | vildagliptiin, 50mg              | A10BH02  | DALMEVIN, tablett, 60TK | Medochemie Limited             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |                         |                                | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1729436         | vildagliptiin, 50mg                                      | A10BH02  | GLYPVILLO, tablett, 60TK                                    | KRKA, d.d., Novo mesto   | 50               |                                   |                       |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                          | 75               | E14-E14, E11-E11                  |                       |        |           |            | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1038091         | von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 375RÜ+500RÜ  | B02BD06  | IMMUNATE 500 RÜ/375 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK  | Baxalta Innovations GmbH | 100              | D68.0-D68.0, D68.4-D68.4, D66-D66 | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |   |
| 1349232         | von Willebrandi faktor+VIII hüübimisfaktor, 750RÜ+1000RÜ | B02BD06  | IMMUNATE 1000 RÜ/750 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH | 100              | D68.0-D68.0, D68.4-D68.4, D66-D66 | Pediaater, Hematoloog |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1107975         | vorikonasool, 200mg              | J02AC03  | VFEND, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | B44-B44   |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>invasiivse<br>seeninfektsiooni ravi<br>on alustatud haiglas   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-B48.8,<br>B37-B37 |        |        |           |            | väljakirjutamise õigus<br>kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks,<br>kui muud suukaudsed<br>seenevastased ravimid<br>on ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |
| 1561823         | vorikonasool, 200mg              | J02AC03  | VORICONAZOLE TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 14TK | Teva Pharma B.V.         | 100              | B44-B44   |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>invasiivse<br>seeninfektsiooni ravi<br>on alustatud haiglas   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-B48.8,<br>B37-B37 |        |        |           |            | väljakirjutamise õigus<br>kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks,<br>kui muud suukaudsed<br>seenevastased ravimid<br>on ebaefektiivsed või<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1615902         | vorikonasool, 200mg              | J02AC03  | VORICONAZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare S.L.U.                    | 100              | B44-B44  |                           |        |           |            | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on alustatud haiglas   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B48.8-B48.8, B37-B37     |                           |        |           |            | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1031746         | östradiool, 100mcg 1g            | G03CA03  | LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK                                | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |  |                           |        |           |            |   |
| 1380721         | östradiool, 10mcg                | G03CA03  | VAGIFEM, vaginaaltablett, 18TK                              | Novo Nordisk A/S                            | 50               |  |                           |        |           |            |   |
| 1794113         | östradiool, 10mcg                | G03CA03  | VAGIRUX, vaginaaltablett, 18TK                              | Gedeon Richter Plc.                         | 50               |  |                           |        |           |            |   |
| 1030442         | östradiool, 1mg                  | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Novo Nordisk A/S                            | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana   |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |  |                           |        |           |            |   |
| 1063415         | östradiool, 1mg 1g               | G03CA03  | DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK                       | Orion Corporation                           | 50               |  |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1030431         | östradiool, 2mg                        | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novo Nordisk A/S                                  | 50               |   |                              |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana        |
| 1684111         | östradiool, 2mg                        | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | First Pharma OÜ                                   | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana        |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1829752         | östradiool, 2mg                        | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB "Lex ano"                                     | 50               |   |                              |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | kui haigus on<br>diagnoositud enne 40.<br>eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta<br>vana |
| 1848393         | östradiool, 2mg                        | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | UAB Ideal Trade Links                             | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | kui haigus on<br>diagnoositud enne 40.<br>eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta<br>vana |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1031735         | östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g | G03CA80  | LINOLADIOL-H N, kreem,<br>25g 1TK                      | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1022634         | östriool, 500mcg                       | G03CA04  | OVESTIN, vaginaalsuposiit,<br>15TK                     | Aspen Pharma Trading<br>Limited                   | 50               |   |                              |        |           |            |   |