

2017. aasta eriarstiabi hinnatud nõudluses kasutatud võrdlus Maailmapanga analüüsiga

Eriarstiabis välditavad visiidid

2.tüüpi diabeet

Maailmapanga (MP) analüüsi kohaselt on ca 30% endokrinoloogia ambulatoorsetest ravijuhtudest Eestis seotud 2.tüüpi diabeediga (E11), nendest omakorda ca 20% eriarstiabis põhjendamatud. Diabeedihaigete jälgimine peaks MP soovitusel liikuma rohkem esmatasandile.

Tabel 1. Kasutuse näitajad eriarstiabis 2.tüüpi diabeedi ravijuhtudest 2015.

näitaja	isikuid	RJ	Ambulatoorsed vastuvõtud	Summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa osakaal (%)
E11 eriarstiabis	15 358	40 709	53 255	1 649 324	704 352	42.7
sh endokrinoloogias	79%	73%	75%	62%	73%	
sh sisehaigustes	8%	6%	7%	6%	5%	
E11 osakaal endokrinoloogias eriala mahust	28%	32%	30%	20%	28%	
E11 osakaal sisehaigustes eriala mahust	2%	3%	3%	2%	2%	
Kokku välditav maht 20%		-6 488	-8 694	-223 432	-110 288	
Endokrinoloogia		-5 967	-7 997	-203 382	-103 379	
Sisehaigused		-521	-697	-20 050	-6 909	

*FFS-teenusepõhine hind

Välditava teenuse maht on arvestatud 20% E11 põhidiagnoosiga juhtudest kahel peamisel erialal. Arvestatud on, et visiitidega vältimisega kaasneb ka seotud uuringute mahu langus samas proportsioonis. Teiste erialade mahust välditavust ei ole arvestatud (21% juhtude korral 32% summast).

Hüpertooniatõbi

Ligikaudu pooled ambulatoorsetest kardioloogia ravijuhtudest on seotud MP analüüsi kohaselt kõrgvererõhu tõvega (I10-I15) ja nendest ca 70% oleksid eriarsti tasemel välditavad ehk esmatasandil käsitletavad.

Tabel 2. Kasutuse näitajad eriarstiabis kõrgvererõhu tõvega ravijuhtudest 2015.

näitaja	isikuid	RJ	Ambulatoorseid vastuvõtud	Summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa 100% FFS	Ambulatoorsete vastuvõttude summa osakaal (%)
I10-I15 eriarstiabis	35 857	55 245	78 436	4 504 639	1 219 968	27.1
sh kardioloogias	79%	77%	75%	76%	72%	
sh sisehaigustes	13%	10%	11%	10%	10%	
I10-I15 osakaal kardioloogias eriala mahust	50%	46%	45%	47%	45%	
I10-I15 osakaal sisehaigustes eriala mahust	8%	7%	6%	8%	7%	
Kokku välditav maht 70%		-33 987	-47 453	-2 221 227	-695 599	
Kardioloogia		-29 926	-41 422	-1 961 411	-611 778	
Sisehaigused		-4 061	-6 031	-259 816	-83 821	

Välditava teenuse maht on arvestatud 70% I10-I15 põhidiagnoosiga juhtudest kahel peamisel erialal. Arvestatud on, et visiitidega vältimisega kaasneb ka seotud uuringute mahu langus, kuid väiksemas

proportsioonis (81% ulatuses RJKM-st). Teiste erialade mahust välditavust ei ole arvestatud (13% juhtude korral 14% summast).

Kokku 2.tüüpi diabeedi ja hüpertooniatõve haigusega välditavate visiitidega kaasnev mahu vähenemine (nõudluse vähenemine)

-56 147 ambulatoorset vastuvõttu ehk - 40 475 ravijuhtu summas - 2 444 658€ 2016. aasta hinnas.